

# MANVALE MEDICORVM.

SEU

ΣΥΝΑΞΙΣ

APHORISMORVM  
*Hippocratis, Prænotionum, Coactarum,  
& Prædictionum, secundum propriam  
morborum omnium nomenclaturam,  
Alphabetico digesta ordine.*

Labore & industria D. HONORATI  
BICAISII D. M. in celeberrima  
Aquensi Gallo-Prouinciæ Uni-  
uersit. Regia publici Pro-  
fess. primarij.



GENEVÆ,

Sumptibus Petri Chouët.

M. DC. LX.



# LECTORI

Beneuolo, S.

**S**PARSA passim Di-  
ui Hippocratis pla-  
cita (Lector claris-  
sime) ea qua potui  
industria redege, ut tanti viri  
doctrina, fervor aliquis accres-  
ceret. Scimus enim radiare in  
cælo Solem, à quo abstractus  
magnam sui luminis partem a-  
mitteret: scimus sydera in firma-



mento micantia, quæ si ab hoc  
extraherentur, fulgere desine-  
rent, sic varia principis nostri  
monita non elucerent, seu (ut  
verius dicam) incognita iacerent,  
nisi locum illis designassem. Ha-  
bes igitur in hoc precioso libello  
non confusè tanquam in lapidi-  
cinis, sed ordinatè ut in annu-  
lo aureo divites gemmas coacer-  
vatas, illum lege, illum fove,  
illum ama, si cupias magnus es-  
se medicus. Reclusit in scrinio  
lapillis ornato Homeri poemata  
Alexander, vellem ego ut in pe-  
ctoris tui abdita, vel (ut rectius  
loquar) in memoriae tue pene-  
tralia

tralia hunc includeres libellum.  
Hac præcipua de causa publi-  
cum feci ut fluxilem memoriam  
invarcm; meum feceram nisi  
quibus nihil unquam justè dene-  
go substraxissent amici. Quod  
si à te mea non probetur industria,  
sat erit, ut cum Poeta dicam,

Hæc si displicui fuerint  
solatia nobis,  
Hæc fuerint nobis præ-  
mia si placui.

Interim vale, dum alio pro-  
perat calamus, ut quæ in primo  
promisit opere exaret.

Ne prætereas moneo in ma-


serie alicujus quæsitæ, analogas  
inquirere literas seu consimilis  
naturæ titulos quales esse possunt,  
In sania, Delirium, Phreni-  
tis, &c.



MA

A

R



# MANVALE MEDICORVM,

SEU

ΣΥΝΑΕΙΣ

APHORISMORVM

Hippocratis, Prænotionum, Coac-  
rum, & Prædictionum, secundum  
propriam morborum omnium nomen-  
claturam, Alphabetico digesta ordine.

ABORSVS.



I mulieri geminos ferenti mam-  
mæ subito extenuentur aborsus  
sequitur, aph. 37. sec. 5.

Mulieri geminos ferenti si alte-  
ra mamma extenuetur, alterum aborsu edit,  
siquidem dextera mamma extenuata est ma-  
rem, si verò sinistra, foeminam abortione  
excludit, aphor. 38. sec. 5.

A 4



Quæ præter naturam tenues vterum gerunt, abortiunt donec habitiores evaserint aphor. 44. sec. 5.

Quæ verò medioeriter corpulentæ abortum faciunt secundo mense aut tertio sine occasione manifesta, iis cotyledones lentoris sunt plenæ, nec præ pondere foetum continere possunt, sed abruptis decidit. aph. 46. sec. 5.

Quæ ex partu & abortu copioso celeriter cum impetu feruntur, si subsistant molestiam exhibent, huiusmodi mulieribus rigor inimicus est, & alvi perturbatio, præcipue si præcordiorum dolore vexentur, 56. sec. 2. l. 2. co.

Ex abortione ubi alba de repente percurrunt, si rigor aliquis corripiat & ad femur impetus vnde prægnans fiat, tremor molestus subit, 54. sec. 2. l. 2. co.

Quæ foetum sunt perdituræ, iis mammæ extenuantur, contra verò duræ si fiant, dolor aut mammæ, aut coxas, aut oculos, aut genua fatigabit, nec abortiunt, aph. 53. sec. 5. Vide partum.

### ABSCESSVS.

In febribus abscessus qui primis iudicationibus non solvuntur, longitudinem morbi significant. aph. 51. sec. 4.

Considerandum in quibus speramus abscessus circa aures futuros, num ex capite doceant, an superiorum partium tenues sudores oboriantur.

oboriantur, aut novus insuper rigor, ac deinde num alvus affatim prorumpat, aut aliquo sopore detineantur. Videndum quoque num vrina dilutæ cum sublimibus quibusdam innatantibus albidis & quæ varia exalbescunt, & graveolent, abscessus ad aures excitent, ac fortè quidem quibus huiusmodi vrinae adsunt, iis crebra e naribus stillatio contingit, an & his quidem lingua lævis est ac minime aspera, 163. l. 2. sec. 2. co.

Graves atrium abscessus qui citra iudicationem sensim conquiescunt & dissipantur, damno sunt, 170. l. 1. sec. 2.

Vide Anginam, dolorem renum, vide febrium soporem.

### ACVTI.

In morbis acutis non omnino certæ sunt mortis aut salutis prædictiones, aph. 19. sec. 2.

Morbi acuti generantur intra dies quatuordecim, aph. 23. sec. 2.

In præcipiti morbo si partes externæ perfrigerentur, internæ verò vrantur ac sitis vrgeat, malum denunciatur, 115. sec. 2. l. 2. co.

In præcipiti morbo, capitis dolor, & præcordia revulsa, nisi sanguis ex naribus profusinat ad phernitidem deveniunt, 119. sec. 2. l. 2. co.

Vide bilem atram, crism, faciem.

### ALVVS.

Quibus in iuventute alvus est humecta iis in senectute siccat, quibus contra sicca



**A**  
astrictare juvenibus fuit, iis senibus hume-  
ta laxaue sit, aph. 20. sec. 2.

Alvi durities cum dolore, vna cum febris,  
horroris sensu insignibus, ac cibi fasti-  
dio, laborantibus, paululum humectata alvo,  
ad suppurationem non tendit, 640. sec. 2.  
l. 2. co.

Quibus alvus est humida juventam qui-  
dem agunt facilius quam qui eandem siccam  
habent, sed senectute difficilius defungun-  
tur; ipsis siquidem senescentibus fere rescis-  
cantur, aph. 21. sec. 3.

Vbi alvus intercepta est & arctè conclusa,  
parvaque & nigra caprarum stercorebus si-  
milia, nec nisi coacta emittit, hoc casu san-  
guis è naribus erumpens periculo est, sent. 47.  
l. 1. sec. 2. prædict.

Alvus circumtensa ex medici industria li-  
quida dimittens, celeriter intumescens, con-  
vulsionis significationem quandam præ se  
fert, quod & Aspasij filio contigit, in his no-  
vus subortus rigor perniciem facit, ex his  
casibus convulsione tentato ac inflato vbi  
diutius morbus traxerit, ex ore putrida & vi-  
rulenta prodeunt, 99. l. 1. sec. 2. præd.

Alvi fluxus, vide excrementa & crism.  
Alvi, vide dolorem juguli & præcordiorum.

Alvi durities cum dolore in febribus hor-  
roris sensu insignibus ac cibi fastidio labo-  
rantibus nisi paululum humectata alvo pur-  
gationem faciat, ad suppurationem tendit,

303. sec. 2. l. 2. co.

Eandem habet sententiam, 140. sec. 2. l. 2.  
co.

Alvus perturbata saluginosa demittens;  
vna cum febre non admodum torpore & so-  
pore oppressos consequitur, 641. l. 2. l. 2. c.

Alvi solutio quæ præter rationem accidit,  
cum voce tremula in his diutius perseveran-  
te perturbatione perniciem intentatur, 258. sec.  
2. l. 2. co.

Longo alvi profluvio laboranti sponte vo-  
mitus superveniens morbum solvit, aph. 13.  
sec. 6.

Mulieri vterum gerenti si alvus multum  
fluat, periculum est ne abortiat, aph. 34. sec. 3.

Biliosis alvus perturbata exigua reddens  
genituræ similia & mucosa, doloremque ad  
intum ventrem inferentia, urinæ quoque  
non facile prodeuntes, ad hydropem tendunt  
ex huiusmodi casibus, 455. sec. 2. l. 2. co.

### ANXIETAS.

In Anxietate laborantibus cum alvi tur-  
bulenta suppressione celeriter velut culicum  
punctura in cutem erumpunt & ad oculos  
lachrymosus abscessus procedit, 564. sec. 2.  
l. 2. co.

In Angore & pervigilio vexatis ad aures  
abscessus maxime obveniunt, 563. sec. 2. l. 2.  
co. vid.

### ANGINA.

Quibus ex Angina in pulmonem mali



conversio, ij intra dies septem moriuntur: si verò hos effugerint purulenti evadunt, aph. 10. sec. 5.

Anginae in quibus neque in collo, neque in faucibus quidquam apparet, sed quae vehementem suffocationem ac spirandi difficultatem adferunt, eodem aut tertio die necant, 363. sec. 2. l. 2. co.

Quae verò tumorem ac ruborem in collo capiunt, in reliquis quidem eodem modo se habent, verum diuturniores sunt, 364. sec. 2. l. 2. co.

Præcipue autem malum prerogatur, quibus non solum fauces, sed cervicem quoque & pectus una rubor occupat, maxime verò potest inde secunda valetudo contingere, si rubores ad interna minime revertantur, quod si evanescant neque in exteriores partes conversum sit tuberculum, neque plus facile & sine dolore exerceatur, aut aequè ista diebus iudicatoris contingant, perniciem denunciant. Ac fortasse etiam sappurati fiunt. Scilicet autem indicium est, ruborem & abscessus ad externas quam maxime partes vergere, 365. sec. 2. l. 2. co.

Quibus Angina ad pulmonem divertit, partim quidem intra septem dies pereunt, partim verò liberati pus intro colligunt, nisi pituitosa sursum educantur, 367. sec. 2. l. 2. co.

In Angina laborantibus, subarida sputa, gracilescentibus faucibus malum prænunciant,

oiant, 369. sec. 2. l. 2. co.

In Angina linguæ tumores absque vlla significatione evanescentes periculum denunciant. Quum etiam dolores citra evidentem causam dispartentes perniciem ostendant, 370. sec. 2. l. 2. co.

Angina laborantes nisi celeriter costa expuant perniciosè habent, 371. sec. 2. l. 2. co.

In Angina absque vlla significatione, resudantes in caput dolores cum febre periculum indicant, 372. sec. 2. l. 2. co.

In Angina laborantibus absque vlla significatione, delati ad crura dolores cum febre perniciosi, 373. sec. 2. l. 2. co.

In Angina laborantibus absque vlla significatione, gracilescentibus faucibus, dolor intensus ad pectus aut ad alvum progressus, purulentas dejectiones facit, alioqui autem tale quid solutionem præ se fert, 375. sec. 2. l. 2. co.

In Angina quæcunque conspicuum dolorem non produunt periculi plena sunt, quin etiam diuturni sunt, qui ad crura progrediuntur dolores ægreque ad pus deducuntur, 376. l. 2. l. 2. co.

Angina correpto si tumor appareat in collo bonum, foras enim morbus existit, aph. 37. sec. 6.

Ab Angina detento, tumor & rubor in pectore superveniens bonum, foras enim morbus vergit, aph. 59. sec. 7.



Augina gravissima quidem est & celerissime interimit, quæ neque in faucibus; neque in cervice quicquam conspicuum facit; plurimum verò dolorem exhibet & difficultatem spirandi, quæ erecta cervice obitur, inducit hæc enim eodem etiam die & secundo, & tertio, & quarto, strangulat, at quæ in feliquis quidem similiter dolorem exhibet, in faucibus vero tumorem ac rubores excitat, admodum quidem exitialis est, priore tamen longe diuturnior, cum non solum fauces, sed cervicem quoque rubor occupat, ex eaque præcipue evadunt, si cervicem & pectus robur detineat, neque ad interna erysipelas revertatur, quod si neque diebus indicatoriis dispareat erysipelas, neque tuberculum ad exteriorem sedem se verrat, neque pus rufissim rejiciat, facileque ac sine dolore habere videatur; mortem indicat aut ruboris reversionem, at securius est tumorem & ruborem ad externa converti, quod si ad pulmonem se verrat, dementiam excitat, & ex his nonnulli suppurati plerumque evadunt: gurgulio quam & tumor & rubor occupat non sine periculo rescatur aut perunditur, inflammationes enim & sanguinis profluvia ei succedunt. Verum talia ut extenuentur aliis rationibus eo tempore tentanda sunt, ubi verò rotum secretum fuerit, & summa gurgulionis pars maior & rotunda, superior autem tenuior extiterit, per id tempus manum admo-

admovere tutum est, ex l. prænot.

### APOPLEXIA.

Apoplexiam fortem nullo prorsus modo debilem ægrè curaveris, aph. 42. sec. 2.

Strangulati aut suffocati, nondum tamen mortui ad se non redeunt, quorum circa os collecta spuma apparuerit, aph. 43. sec. 2.

Apoplexia autem fit maxime à quadragésimo anno, ad sexagesimum, aph. 57. sec. 6.

### AQVA

Aqua quæ citò calefit, & citò refrigeratur, levissima, aph. 16. sec. 5.

### ATRA BILIS.

Febrium initio si atra bilis sursum aut deorsum prodeat lethale est, 68. li. 1.2. co. vide bilem, dysenteriam.

### AVSTER.

Vide tempus.

### AVTVMNVS.

Vide tempus.

### AQVILO.

Vide tempus.

### AVRIS.

Vide tinnitum, surditatem, tuberculum.

### ÆGROTARE.

Minus piruculosè ægotant quorum vel naturæ, vel ætati, vel consuetudini, vel tempori familiaris morbus est, quàm quibus nullo horum affinis cognatusque existit, aph. 34. sec. 2.

### ÆRVGINOSI.



Æruginosi non admodum ventrosi, aph. 71. sec. 5.

### ÆTAS.

Quod ad ætates verò pertinet, verè & prima ætate, pueri & his ætate proximi optimè degunt, valentque maximè, ætate verò & autumni ad alium vsque partem senes. Reliquo autumno & hyeme qui median ætatem agunt, aph. 18. sec. 3.

Secundùm ætates autem hi sunt morbi, parvis & nuper natis puerulis, oris vlcera, vomitiones, tussis, vigilie, pavores, vimbilici inflammationes, aurium humiditates, aph. 24. sec. 3.

Adventante dentitionis tempore, gingivarum pruritus, febres, convulsiones, alvi profluvia, maximè cum caninos edunt & iis præsertim qui crassissimi sunt, & qui albo sunt dura, aph. 35. sec. 3.

Ipsis verò grandiusculis tonsillarum inflammationes, vertebrae in occipitio introrsum luxationes, anhelationes, calculi, lumbrici rotundi, ascarides, verrucæ pensiles, satyriasmus, stranguriz, strumæ, & alia tubercula, præcipue verò ante dicta, aph. 26. sec. 3.

Grandioribus autem & ad pubertatem accedentibus, superiorum etiam morborum multi, & febres diuturniores potius, & ex naribus sanguinis fluxiones, aph. 27. sec. 3. vide morbum, v.

Quod ad ætates autem attinet, tubercula quidem

quidem suppurantur, atque eadem strumosa magna ex parte pueros exercent, facileque ex his levantur, at iisdem ubi paululum ætate processerint atque adoleverint, nascuntur quidem minùs ac difficiliùs tolluntur. Viris autem id genus tubercula non admodum fiunt, verum favi formidabiles & cancri abdit desertim, & ex pustulis noctu inquietantibus (quas *thanne nodæ* vocant) ulcera serpentina quos herpes nominant, donec annos sexaginta longè superarint. Senibus verò ex huiusmodi tuberculis nullum accidit, at cancri latentes, quique summa corporis infestant, fiunt, & ad mortem comitantur, ex locis difficiliùs sanantur alæ, ac laterum cavitates & femora, in his namque humores resident & recidiuæ fiunt, & ex 1.2. præd.

Ætas, æstus, æstuat, vide tempus, calor.

### BALBI.

Balbi longo alvi proflavio maximè corripiuntur, aph. 32. sec. 6.

### BILIS ATRA.

Morbis quibuscumque incipientibus si atra bilis suprà exierit, periculofum, aph. 22. sec. 4.

Quibus per morbos acutos, aut diuturnos aut vulnera, aut alium modum extenuatis, atra bilis aut velut sanguis niger subierit, postmodum moriuntur, aph. 23. sec. 4. vide atram bilem.

### BILIOSVS.

Vide alvum.



## BIBERE.

Quibus noctu bibendi est aviditas, iis obdormiscere bonum est, aph. 27. sec. 5.

## BVBO.

Ex bubone febres omnes malæ, præter ephemeræ, aph. 55. sec. 4.

## CAPVT ET CEREBRVM.

Quæ caput quodammodo concutiunt, cum intensa oculorum rubedine ac manifesto delirio, perniciem denunciant, neq; tamen hoc ad mortem comitatur, verum circa aures tumorem excitat, 163. sec. 2. l. 2. co.

Quæ caput concutiunt & aurium sonitus excitant, sanguinem è naribus profundunt aut mulieri menstrua deturbant, idque præsertim si ad spinam ardor consequatur, fortasse etiam difficultas intestinorum expectanda est, 167. sec. 2. l. 2. co.

Qui capite gravati ad sinaput dolorem sentiunt, per vigilio torquentur, iis sanguinis eruptionem fore spes est; tum vero præcipue, si aliquis contensionis sensus ad cervicem peringat, 168. sec. 2. l. 2. co.

Quibus concussum fuerit cerebrum, vel ex plaga doluerit, aut aliquo casu, his illico vox deficit, neque vident, neque audiunt, fereque intereunt, 194. sec. l. 2. co.

Quibus occasione aliqua cerebrum fuerit vehementer concussum, multos protinus fieri est necesse, aph. 58. sec. 7.

Quibus divisum est cerebrum, his febrem & bi-

& biliosum vomitum supervenire est necesse, aph. 50. sec. 6.

## CALVI.

Qui calvi fiunt, iis varices magni non fiunt, quibus verò calvis existentibus varices superveniunt, ij rursus capillati fiunt, aph. 34. sec. 6.

## CALCVLVM.

Calculo laborantes eo habitu constituti, ut ne urinariam fistulam calculus illabatur, promptè urinam reddunt, 472. f. 2. l. 2. co.

## CALIDVM.

Calidum frequentiore usu hæc invehit incommoda, carnis effecminationem, nervorum incontinentiam, animi torporem, profusiones sanguinis, animi deliquia, ad quæ quidem mors, aph. 16. sec. 5.

Calidum in quo ulcere pus movet, maximum securitatis præstat indicium, cutem emollit, extenuat, dolorem lenit, rigores, convulsiones, tetanos mitigat, capitis gravitatem solvit, ossibus fractis plurimum prodest, maxime si nudata sint, multoque magis si in capite. His etiam prodest quæ moriuntur aut ulcerantur à frigore. Herpetibus denique exedentibus, sedi, pudendo utero, velicæ: His omnibus calidum amicum & decretorium, frigidum inimicum & interimens, aph. 12. sec. 5.

## CALOR AVT FRIGVS.

Ex qua parte corporis in est calor aut frigus, ibi morbus, aph. 39. sec. 4.



Quando toto corpore mutationes acci-  
dunt, ut si corpus refrigeretur & vicissim ca-  
lescat, longitudinem morbi significat, aph. 41.  
sec. 5.

Relicti in præcordiis æstus cum febre, in  
qua totius corporis habitus perfrigeratur,  
malo sunt, idque præsertim si cum sudori-  
bus contingat, 7. sec. 2. l. 1. præd.

### CANCER.

Quibus occulti cancri adsunt, non curare  
melius, curari enim citius intereunt, non cu-  
rati verò longius vitam trahunt, aph. 38. sec. 6.

### CARUNCULA.

Vide urinam, dysenteriam, excrementa.

### CERVIX.

Cervix dura cum dolore, & maxillarum  
connexio, ac jugularium venarum palpitatio  
vehemens cum tendinum distensione perni-  
cium minatur, 161. sec. 2. l. 1. co.

### CIBVS.

Paulo peior, sed suavior cibus ac potus  
meliori quidem, at ingrato præferendus, aph.  
37. sec. 2.

Si quis febricitanti cibum præbeat, quem  
sano exhibet, valenti robur, ægrotanti mor-  
bus fit, aph. 55. sec. 7.

Si à morbo cibum adhibens quispiam vi-  
res non recipiat, copioso alimento corpus  
onerari indicat: si verò modicè epulanti  
idem eveniat, vacuatione indigere certum  
est, aph. 81. sec. 2.

Si à

Si à morbo bellè comedenti corpus non  
proficiat malum, aph. 31. sec. 2.

Qui adversa valetudine abundè initio co-  
munt, nec proficiunt, ij ferè tandem om-  
nes in cibi fastidium incidunt: contra qui ini-  
tio forti inedia usi cibum postea appetere in-  
cipiunt, valetudine facilius liberantur, aph.  
31. sec. 2.

Vide dysenteriam, lumborum dolores.

### CIRCUMVITYS.

Vide crisum, satietatem.

### COLLVM.

In febre detento si repente collum intor-  
queatur, ac vix deglutire queat, nullo exi-  
stente tumore mortiferum, aph. 35. sec. 4.

Collum neque converti, neque devorare  
posse plerumque lethale, 278. sec. 2. l. 2. co.

### COLOR FACIEI.

Frequens coloris cum calore mutatio bo-  
no est, 125. l. 2. l. 2. c.

Quibus juvenibus diu coloris fœdatio in  
est, non tamen continenter ad instar regii  
morbi, & viri, & femine capitis dolore  
constantur, & lapides ac terram edunt, aut  
profluvium per ora venarum sanguinem so-  
lita effundere patiuntur, hæmorrhoidas Græ-  
ci dicunt, ac colores cum virore pallidi diu-  
tius, absque vehemente regio morbo, cætera  
quidem eadem facere solent: verum præcor-  
diorum dolores eo magis vexant quam cæte-  
ra, neque tamen lapides aut terram edunt.

Qui verò diu pallidi faciem habent tumidam, eos certum est aut capitis, aut viscerum dolore laborare, aut sedem internam quodammodo male affectam esse: Magua autem ex parte ubi hæc adfuerint, non unum aliquod malum inesse videtur, sed interdum multa, aut etiam omnia, ex lib. 20. prædicto.

Si color alius ex alio oriatur longitudinem morbi significat, aph. 41. sec. 5.

### COLLIQVATIO.

Hepatico colliquatio cum raucedine magnum portendit, idque præcipue si cum quadam tussi contingat, 447. sec. 2. l. 2. co. vide respirationem.

### CONVALESCENTES.

Quibus in morbo conualescentibus pars aliqua laborat, eo abscessus fiunt, aph. 32. sec. 4. vide cibum.

### CONCVSSIO.

Vide cerebrum.

### CONSVETVDO.

Consuetudo longo tempore etiam si deteriora sint, insuetis minus molesta esse solent, quare ad insolita quoque facienda mutatio, aph. 50. sec. 2.

Præter consuetudinem aliquid facere, ut verbi gratia aliquid propensius curare, & magno studio eniti prius non consuetum, aut contra, pravam, ut delirio proximum, 47. sec. 2. l. 2. co.

Quotidianis laboribus affecti, etiam si in-

validi

validi sint aut senes, insuetis quamvis robustis & juvenibus, facilius consueta ferunt exercitia, aph. 49. sec. 2.

### CONVVLVSIO.

Convulsio ab helleboro lethalis, aph. 1. sec. 5.

Convulsio à vulnere perniciofa, aph. 2. sec. 5.

A copioso sanguinis fluxu singultus aut convulsio mala, aph. 3. sec. 5.

A purgatione immodica quam hypercathartism vocant convulsio aut singultus malum, aph. 4. sec. 5.

Qui tetano corripiuntur intra quatuor dies intereunt, si verò hos superauerint incolumes evadunt, aph. 6. sec. 5.

Convulsio vel à repletionem vel à vacuationem fit, ita verò & singultus, aph. 39. sec. 6.

Quibus in convulsionibus oculi intente splendent, his mens non constat & diutius morbum trahunt, 351. sec. 2. l. 2. co.

Quæ convulsionis in morem affligunt, cum alto stupore, quem catochum vocant, tubercula ad aures attollunt, 352. sec. 2. l. 2. co.

Convulsionem & nervorum distentionem succedens febris solvit, 354. sec. 2. l. 2. co.

Ex vulnere convulsio lethalis, 355. sec. 2. l. 2. co.

Convulsio febris succedens periculum denunciat, minimuma vere pueris, 356. sec. 2. l. 2. co.



Adultiores & qui septimum annum exceſſerunt, convulſione in febre non comprehenduntur, alioqui periculum denunciatur, 337. ſec. 2. l. 2. co.

Convulſionem ſolvit febris ſuccedens acuta, quæ prius non aderat, aut ſi prius adfuit ingravescens, conſert & urinæ vitreæ copioſus pertransitus, & alvi fluxio, & ſomnus, convulſiones autem de repente ortas febris ſolvit, ac alvi fluxus, 338. ſec. 2. l. 2. co.

Loquendi impotentia in convulſionibus multum perſeverans, malo eſt, quæ verò parum durat, aut linguæ ſyderationem, aut brachij, aut eorum quæ in dextra parte ſunt, denunciat, ſolvitur autem magna urinarum conſertim, ac derepente prodeuntium abundantia, 339. ſec. 2. l. 2. co.

In nervorum diſtentionibus, & iis quæ in poſteriorem partem ſiunt, diſſolutæ maxillæ mortem afferunt, quin etiam lethale eſt in poſteriorum partium diſtentione ſudare, & corpus diſſolvi, ac in eodem malo per nares revomere, aut ubi per initia vox defecta fuit, clamare aut nugari, poſtridie enim affuturam mortem ſignificat, 361. ſec. 2. l. 2. co.

Febres cum poſteriorum partium diſtentione, urinæ genitale ſemen referentes ſolvunt, 362. ſec. 2. l. 2. co.

Quibus tempora ſecantur, iis ex adverſa ſectionis parte convulſio ſit, 498. ſec. 2. l. 2. co.

Vulneri ſuccedens convulſio malo eſt, 506. ſec. 2. l. 2. co.

Con-

Convulſionem muliebria, ſi citra initia appareant, neque febris acceſſerit, ſolvunt, 531. ſec. 2. l. 2. co.

Turbulentæ & valde confidentes e ſomno exurrectiones, convulſiones minantur, præſertim vero ſi cum ſudore contingant, 112. l. 1. prædict. ſec. 2.

Quæ convulſiones in morem affligunt, cum alto ſtupore quem catochon vocant, abſceſſus ad aures excitant, 161. l. 1. prædict. ſec. 2. ¶ Convulſio cum tremore, corporis ſactatione, & implacitate, ac alto ſtupore quem catochon vocant, parvulorum circa aures obortorū abſceſſum ſpē facit, 162. l. 1. prædict. ſec. 2. ¶ Convulſio in febre ſuborta eadem die deſinens, bono eſt, 156. ſec. 2. l. 2. co. ¶ Convulſio in febre ſuborta, febrem primo die, aut poſtero, aut tertio ſinit, quod ſi horam quæ prehendit ſuperet, ac deſinat, malo eſt, 157. ſec. 2. l. 2. co.

In uteri ſtrangulatu non autem expertæ convulſiones faciles ſunt, 349. ſec. 2. l. 2. co.

Cum convulſionibus & ſudore febrienti, deſluentia ſputa minimè mala ſunt; his præterea alvi aliquantulum madeſcunt, ac fortaliſe aliquid ad articulos abſceſſurum ſperandum eſt, 350. ſec. 2. l. 2. co.

Propter ardores vehemens convulſio, aut tetanus, malum, aph. 13. ſec. 7.

Propter vigiliam convulſio, vel deſipientia, malum, aph. 18. ſec. 7.

A medicamenti potione convulſio mortifera, aph. 25. ſec. 5.

B

Quæ convulsioni in morem affligunt ea  
altum soporem (catochum vocant) inducunt,  
104. sec. 2. l. 2. co.

Spasmo aut tetano febris si accesserit mor-  
bum solvit, aph. 57. sec. 4.

Ex epoto helleboro convulsio exitum af-  
fert, 567. sec. 2. l. 2. co.

Vide calidum, dolorem lumborum, & fe-  
bres.

### CONTRARIA CONTRARIIS curari.

Qui à plenitudine sunt morbi, vacuatione  
curantur, ut qui ab inanitione proficiscun-  
tur, sanantur plenitudine, cæterorumque  
contraria sunt remedia, aph. 22. sec. 2.

Quæ præfrigerata sunt excalefacere oportet;  
præterea, quæ sanguinem profundunt  
aut brevi sunt profusura, aph. 19. sec. 5.

Est tamen ubi in tetano sine ulcere juveni  
bene carnosio ætate media, frigida larga per-  
fusio calorem revocat, calor verò hunc solvit,  
aph. 21. sec. 5.

Quoquo modo corpus moveatur, simul ac  
laborare cepit, quies statim lassitudinem le-  
vat, aph. 48. sec. 2.

### CONCIPERE.

Quæ præter naturam non concipiunt, iis  
uteri os ab omento comprimitur, itaque gra-  
vidari donec extendentur nequeunt, aph. 46.  
sec. 5.

At mulieres quamvis magis aut minus  
uterum

uterum gestare sint idoneæ hunc in modum  
æstimare licet, in primis quidem in formas  
intuendo, parvæ namque grandioribus in con-  
ceptum præstant, tenues crassius, candidè ru-  
bris, nigra liventibus. Præstant item quibus  
venæ extant; iis quibus minimè apparêt, quin  
etiam graviori natu exuberans carnis moles,  
malo est, mamma autem turgida & magnæ  
probantur; atque ista quidem visui sunt expo-  
sita. At sciscitari oportet num menstrua singu-  
lis mensibus appareant, & num satis idonea  
copia, & an boni sint coloris, æquali copia  
in singulis temporibus & ratis mensium die-  
bus effluant, quod quidem optimum est; locus  
verò conceptui idoneus, quem sanè uterum  
nominamus, sanus esse, & siccus, & mollis  
debet, at neque contractus, neque prolarus,  
neque ore distorto, aut compresso, aut di-  
ducto, etenim quidquid horum contigerit,  
conceptum fieri impedit. Mulieres igitur  
quæ concipere nequeunt & pallidæ videntur,  
absque febre neque aliqua causa in visceribus  
arctante, iis caput dolet, & menses malè ac  
incertè prodeunt, aut certè pauci, neque ex  
longo intervallo sic affectis apparent, & ute-  
ri purgatione indigent. At quæ tum bene co-  
loratæ sunt, tum bene carnosæ & pingues, &  
venas habent latentes, & doloris expertes  
sunt, hisque menstrua aut nullo modo pro-  
deunt aut pauca & sincera fluunt: in hujus-  
modi naturis difficillimè conceptus procura-



tur, quod si liberè apparentibus menstruis inculpatò sit corpore mulier, neque concipiat, locus in quo uterus continetur in causa excitandus est, quo minus foetus tollatur, aut etiam contractus est aut deductus; reliqua enim quæ hac contingere solent cum dolore & decoloratione, ac colloquatione sunt: quibus verò ulcus in utero ortum est, sive ex parte sive ex tuberculo aut aliqua quapiam causa, tunc febres & inguinum tumores obveniunt, illorumque locorum dolores: quod si parius purgamenta simul quoque restiterint, tum ea mala omnino sunt immoderata & diuturna acceduntque & præcordiorum dolores, & capitis: at verò ubi ulcus sanatum est, locus ille laxior ac durior necessario efficitur, & minus conceptui idoneus: Quod si ulcus sinistra taneum occupet, mulierque concipiat, aut ubi adhuc ulcus habet, aut postea ubi convaluit, eam marem potius enixuram spes est. Sed si ulcus dextra teneat, & mulier concipiat, foetus feminæ magis expectandus est: at si febris comprehendat eam quæ concipere nequit & tussicula detineat, querendum nunc utrum ulcus aliquod occupet, aut ex his malis quæ scripsimus aliud quidpiam, etenim ubi nil mali eo loco subesse constiterit, quod extenuationem aut conceptus impedimentum efficiat, sanguinis vomitione resoluti merus impendet, ei verò mulieri menstrua ex necessitate dispartuerunt.

Si ye-

Si verò febris sanguinis eruptione tollatur & menses appareant, concipiet: quod si ante sanguinis eruptionem alvus effusa fuerit, primum in modum, periculum est ne mulier ante sanguinis eruptionem intereat. At quæcumque se concepisse existimant, neque conceperunt & multis mensibus decipiuntur, quod menstrua non compareant, ac venter turgescere ac moveri videatur, ex capitis ac cervicis dolore præcordiorumque, & colla-ctantur, neque lac in ipsam in animi innascitur, nisi paucum quoddam & aquosum, cum verò ventris tumor cessat, lac facit, ac mollis evaserit, ex, nisi quid aliud etiam, concipient, quandoquidem affectio ista adurationem utero afferendam valet, adeo ut post hoc tempus concipiant: ex, verò quæ conceperunt doloribus istis non tentantur nisi consuetæ fuerint. His capitis dolores accedunt, & lac in mammis innascitur. Quæ autem longæ fluxiones exercent de capitis dolore, lumborum, & imi, ventris interroganda sunt, sciscitari quoque oportet num dentium stuporem sentiant, aut visus hebetudinem, aut aurium sonitum: at quæcumque jejuna multis diebus aliquantulum biliosa vomitione rejiciant, si neque uterum gerant, neque febre detinentur, interrogabis num lumbos retundos utrum etiam vomitu resoluant, id enim nisi fateantur ipsis ad salutem prædices, potissimum autem mulieres

E 3

in vadit hic morbus, deinde etiam virgines, reliquos verò homines minus, ex l. 2. sec. 3. præd.

Si scire velis an mulier concepit, dormitæ aquam mulsam potui dato, & si veneris tormina patiat, concepit, sin minus, non concepit, aph. 1. sec. 5.

### COXENDICVM MORBI.

De coxendicium autem doloribus sic existimandum est. Quibus senioribus, vehementissimi torpores adsunt & lumbi ac crura frigescent, nec pudendum erigere valent, alvulque non nisi coacta egerit; & muscosum alvi recrementum plurimum prodit, his maximè diuturnum fore ac prædicendum ex quo morbus cepit, annum ut minimum perseveraturum, juvamentumque non nisi aut vere aut ætate sperandum. At juvenibus quidem non minores dolores afferunt coxendicium morbi, sunt tamen breviores, etenim quadragesimo die liberantur. Quin nec vehementes torpores, neque crurum ac lumborum perfrictiones fiunt. Quos autem morbus iste in lumbis ac cruribus vexat, neque tamen adeo ut decumbere cogantur, animadvertere oportet: num aliquid uspiam in coxa concreseat, percontariq; num ad inguen dolor perveniat. Etenim si utraque adfuerint, morbus efficitur diuturnus. Percontandum quoque num sentiant torpores, & ad popliteum pertineat. Quo concessio rursus petendum num

per tibiæ ferantur ad primam summi pedis partem quæ tarsos dicitur, qui enim istorum bonam partem fatentur, his ipsis crus modò calidum, modò frigidum fieri rectè prædixeris. At quibus sic morbus, relictis partibus quæ ad lumbos sunt, intro vergit, eos bene sperare jubeto, quibus verò coxendicem & lumbos occupat & supra vergit, iis fore gravem prædicito. Quibus autem ad articulos dolores oriuntur & tumores, desinuntq; ne sine podagra, iis & magna viscera adesse comperies, & in urina quod subsidet album, ac si cui tempora attollentur, ea sæpe dolere scæbitur, & sibi nocturnos sudores contingere. Quod si neque tale quidquam in urina subsidet, neque sudores contingunt, metus est ne articuli claudicent, aut in his abscessus fiat, quem melicerida vocant, iis autem morbus iste contingit, quibus pueris aut juvenibus, ex naribus sanguinis fluor consuetus desit. Ex quibus percontari oportet num in juventute sanguinis fluxus contigerit, & num pungentes prurigines ipsis in pectore aut dorso insint, aut eadem contingant, quibus vehementes alvi dolores absque perturbatione adsunt, aut quibus per ora venarum quæ sunt in ano sanguis effunditur. Hinc namque istorum morborum origo petenda est. Quod si viris huiusmodi fœdus color appareat, num etiam capitis dolor adsit percontandi sunt, quod scæbuntur. Ex quibus qui



tra parte dolores sentiunt, iis vehementes dolores fiunt, idque vel maxime si in præcordiis ad hepar dolor restiterit, quibus malis confestim levat strepitus qui in ventre fit, ac ubi dolor conquievit, urina crassa & pallida redditur, atque hoc morbi genus neutiquam lethale est, sed valde diuturnum, at ubi jam morbus inveteraverit homines oculorum caligine vexat; percontrari igitur oportet, cum sanguis in juventute fluxerit aut oculorum caligatio contigerit aut urina pallida vacuata fuerit, aut intus excitari spiritus & supervenientes juvamentum attulerint, ista namque omnia fatebuntur ii, l. 2. sec. præd.

#### CRASSI.

Qui natura sunt valde crassi, breviora vita finiuntur quam qui graciles, aph. 44. sec. 2.

#### CRÉPITVS.

Vide status.

#### CHISIS.

Quibus crisis fit, nox quæ accessiones præcedit gravis, quæ subsequitur levior ferè solet existere, aph. 13. sec. 2.

Index septimi 4. sequentis septimanæ 8. initium, spectandus quoque est undecimus, siquidem is secundæ septimanæ quartus est. Rursumque decimus septimus spectandus, is enim à quarto decimo, 4 est & ab undecimo 7. aph. 24. sec. 2.

In præcipientibus morbis judicatio in qua expectanda est, 145. sec. 2.

Morbi

Morbi vero præcipientes & acuti, effluente ex naribus sanguine, judicatione absoluntur; idque die judicatorio, ac sudore copioso exoritur, urinaque purulenta ac vitrea affatim reddita, in qua quod subsidet, laudabile fit aut abscessu effata digno, & alvo mucosa & sanguinea deficiente ac deridente prorumpente, vomitionibusque non pravis sub judicationem contingentibus, 150. sec. 2. l. 2. co.

Quibus ex naribus fluxiones quæ 7. 9. aut 14. die contingunt, ut plurimum à febris vindicant. Eodem verò modo & biliosus atque fluxus, & qualis in intestinorum difficultate fieri assolet, ac genuum & coxendicium dolore, urinaque sub judicationem concocta, at verò in muliere mensium profluvium, 152. sec. 2. l. 2. co.

Non, si quid in morbis acutis fiat præter rationem levius, fidere oportet, nec turbari, si quid temerè gravius acciderit. Istiusmodi enim multa sunt incerta, nec durare diu, aut persistere solent, aph. 37. sec. 2.

Vide febres.

Februm judicationes iisdem numeratur diebus quibus & evadunt & moriuntur homines, nam & minimæ febres & quæ securissimis fulciuntur signis die 4. aut ante desinunt, maxime verò malignæ & quæ cum gravissimis signis fiunt, 4. vel potius interficiunt. Primus itaque earum insultus ad hunc modum desinit. Secundus ad 7. deducitur.

ad undecimum 4. ad 14. 5. ad decimum septimum. 6. ad vigesimum. Sic igitur circuitus ex acutissimis morbis per 4. facta accessione ad vigesimum terminantur. Neque verò horum quicquam integris diebus exactè numerari potest, cum neque annus etiam neque menses integris mensibus numerari soleant, post hæc autem eadem ratione, juxta eandem adjectionem, primus circuitus est, quatuor & triginta dierum, 2. 40. 3. 60. at inter horum initia perquam difficile est dignoscere quinam longo temporis spatio judicari debeant, quod simillima sint eorum principia. Verum à primo die advertere animum oportet, & pro singulorum quaternariorum additione considerationem adhibere, nec latebit quonam se vertat morbus. Quar-tanarum quoque conditio eundem servat ordinem: qui vero intra brevissimum spatium judicationem sunt subituri, facilius dignoscuntur, cum maxime inter se ab initio dissideant, qui cum ex morbo superfuturi sunt, facile spirant, dolore vacant, noctu dormiunt, aliaque securissima signa habent. At perituri difficultate spirandi vexantur, delirant, vigiliant, cæteraque pessima signa habent. His igitur sic se habentibus, de morbis ad indicationem tendentibus, tum ex tempore, tum ex utraque adjectione conjectura faciendæ est eandem quoque rationem & mulieribus indicationes ex parte contingunt. Capitis dolores

lores vehementer ac continenter cum febre, aliquo quidem ex signis accedente, admodum exitiale. Quod si sine signis hujusmodi dolor 20. diem superat, & febris detineat, sanguinis è naribus eruptionem aut alium quendam abscessum ad inferiores sedes suspectari oportet. Verum quo ad dolor recens fuerit, eodem modo sanguinis è naribus eruptionem aut suppurationem expectare convenit cum aliis, tum si dolor circa tempora & frontem affuerit, at sanguinis eruptio magis expectanda venit in his qui nondum quintum & trigessimum annum attigerunt, senioribus verò suppuratio, ex l. præm. f. 2.

Quæ perniciem minantur, ea si absque ulla significatione alleviant, mortis periculum denunciant, f. 2. l. 1. præd.

Quæ cum malignis signis allevamentum afferunt, & quæ cum bonis non remittunt molesta sunt & difficilia, 48. sec. 2. l. 2. co.

### CRV DITAS.

Vide Urinam.

### CVBITVS.

Vide dolores cubiti.

### CVTIS.

Cutis corporis squalida, & plus æquo sicca, malè affectæ alvi index est. In his præ-rubra caruncula ex alvo prodeunt, 617. sec. 2. l. 2. co.

DEMENTIA, SEV DESIPIENTIA & delirium.



Dementia in quibus aegri sunt tremuli aut aliquid investigantium more sensim contrahunt, aut palpent, phrenitum prænunciant, quin & ad suram dolores, in his mentem emoveat, 56. sec. 2. l. 2. co.

Propter plagam in capite acceptam, stupor aut desipientia malum, aph. 22. sec. 7.

Deliratio quæ cum visu sit tutior, quæ vero studio adhibito periculiosior, aph. 57. sec. 6.

Vehementes insanitæ cum vocis defectio-  
ne perniciem intendant, 254. sec. 1. l. 2. co.

Qui statim perturbantur sine ratione, per-  
vigilio torquentur, nigra & compacta ex al-  
vo demittunt, interdum sanguinem è nari-  
bus profundunt, 110. sec. 2. l. 2. co.

Quæ sensim fiunt mentis feroces emotio-  
nes, in ferinas evadunt, & convulsiones por-  
tendunt, 155. sec. 2. l. 2. co. Eadem sententia  
habetur, 85. sec. 2. l. 3. co.

Desipientia cum difficultate spirandi è su-  
dore lethalis est, quin etiam cum difficulta-  
te spirandi & singultu mortem adfert, 89. sec.  
2. l. 2. co.

Desipientia cum sopore, convulsiones mi-  
nantur, 84. sec. 2. l. 2. co.

In febribus vehementes emotiones cum  
taciturnitate, in eo cui vocis defectus non  
est, perniciem minantur, 70. sec. 2. l. 2. c.  
quæ brevi tempore durant feroces mentis  
alienationes, malæ sunt & in ferinas eva-  
dunt, 246. sect. 2. l. 2. co.

À sangui-

A sanguinis profluvio desipientia aut et-  
iam convulsio malum, aph. 2. sec. 7. vide in-  
saniam. Decubitus, vide jacere.

## DESTILLATIO.

Destillationes & gravedines coctionem  
in valde senibus non admittunt, aph. 40.  
sect. 2.

Destillationes in ventrem superiorem ad  
suppurationem perveniunt intra dies vigin-  
ti, aph. 38. sect. 7.

Dejectiones, vide excrementa.

## DENTES.

Dentium collisio aut stridor præter con-  
suetudinem à teneris contractam insaniam  
ac mortem denunciant: quod si jam deliran-  
ti istud accidat, prorsus exitiale est, quin &  
dentes resiccati perniciem denotat, 235. sec. 2.  
l. 2. co.

Dentis syderatio abscessum ad gingivas  
enatum solvit, 236. sec. 2. l. 2. co.

Ad dentis syderationem vehemens acce-  
dens febris cum delirio; mortem minatur:  
quod si surventur aegri, ulcera pus colligent,  
& ossa abscedent, 237. sec. 2. l. 2. co.

Dentium stridor quibus per sanitatem mi-  
nimè est consuetus periculum denunciat: sus-  
focatio in his valde prava, 48. sec. 2. l. 1.  
præd.

In febribus dentibus stridere quibus à pue-  
ro minimè est consuetum in insaniam & mor-  
tem significat ex l. prænot. Vide febres.

## DEGLVTIRE.

Potum agrè deglutienti cum spiritu tussiculoso eructatio quodammodo revulsa, intro convoluta, ventris dolorem denunciat: vitiosæ etiam sunt prærubræ dejectiones, æruginosæ 4 die apparentes, ac huiusmodi sanguinis profluvia soporem inducunt; in his casibus ex convulsione moriuntur, nigris ante prodeuntibus, 632. sec. 2. l. 2. co.

Vide collum.

## DYSENTERIA, SEV DIFFICULTAS intestinorum &amp; diarrhœa.

Si dysenteria laboranti veluti caruncula deiciantur, mortiferum, aph. 26. sect. 4.

In longis intestinorum difficultatibus cibi fastidium malum & cum febre pejus, aph. 3. sect. 6.

Intestinorum difficultate laborantibus, vomitio biliosa circa initia, malo est, 463. sect. 2. l. 2. co.

In gravi intestinorum difficultate quibus humor ad pus pervenit, quod summum infidet, exalbidum erit, & copiosum 464. sect. 2. l. 2. co.

Intestinorum difficultate laborantibus, aliquantulum rubræ, limosæ, & copiosæ dejectiones, in flammeo colore & prærubro perfusis solutæ insaniam suspectam faciunt, 465. sect. 2. l. 2. co.

Lienosis difficultas intestinorum non longa utilis, longa verò mala, ubi enim defluit si aquæ

si aquæ inter cutem, aut intestinorum lævitates oriuntur, mortem afferunt, 466. sect. 2. l. 2. co.

A diarrhœa dysenteria, aph. 75. sect. 7.

Dysenteria supervenit lienteria, aph. 76. sect. 7.

A sincera dejectione dysenteria, aph. 23. sect. 7.

Dysenteria si ab atra bile incipiat, exitiosa. aph. 24. sect. 4.

Quibus per diarrhœas spumosa sunt alvi excrementa, iis à capite fit defluxio, aphorism. 20. sect. 7.

## DISURIA.

Strangurium & disurium thoracis venæ sectione solvit, aph. 58. sect. 7.

## DOLOR.

Qui ab aliqua corporis parte dolentes, dolorem non sentiunt, iis mens ægrotat. aph. 6. sect. 2.

Ex duobus doloribus non eundem locum occupantibus, qui vehementior est, alterius sensum obscurat, aph. 46. sect. 2.

Dolores qui sine febre invadunt ne interficiunt quidem at plurimum diuturni sunt, multasque mutationes ac recursus habent, atque horum genera primum quidem in capitis doloribus spectantur, quorum quidam leves sunt, quidam etiam longè graviores virorum verò ea sic ineunda est ratio, quibus autem visus caligat & rubor quidam in ipsis



oculis fit, cum quadam frontis pruriginis, eos iuvat sanguis sua sponte aut ex necessitate profluens, atque hic modus simplex est. At quibus dolores capitis & frontis contingunt, tum ex ingentibus ventis, tum ex frigore post vehementem æstum nos gravedines potissimum quidem omnino liberant. Iuvant quoque & mucosæ pituitæ in naribus ortæ, præcipue quidem sponte fluentes, sin minus vi expressæ, gravedines verò in totum fiunt adeo ut tussis consequantur & sternutamenta ubi succedunt, neque dolores sedant, iis tubercula & coloris parvitates ex necessitate aderunt: quos verò dolores sine causa & diurni & totum caput occupantes jam gracile, & viribus exhaustos affligunt, in his attendendum morbum priore multo esse graviolem, quod si in cervicem & dorsum relicto capite dolor descendit, rursusque in caput recurrit, adhuc gravior existimandus est ac omnium maxime terret si à capite ad cervicem & dorsum pervenit, eos verò iuvati spes est si abscessus aliquis eruperit, aut pus tussis rejectum fuerit, aut sanguinem per ora venarum fundere sint soliti, aut pustula toto corpore pullularint, ex usu etiam est caput porrigine tentari, ex sec. 2. l. 2. prædict.

#### DOLOR CAPITIS.

Ex parte capitis posteriore laboranti regita in frontem excurrentes vena incisâ prodest, aph. 68. sec. 5.

Capite

Capite dolenti & vehementer laboranti, pus vel aqua vel sanguis per nares, aut os, aut aures effluens morbum solvit, aph. 10. sec. 6.

Qui capitis doloribus & aurium tinnitibus citra febrem tenebrosâ vertigine & vocis tarditate, manuumque stupore tentantur, in his aut syderationem aut morbum comitalem aut etiam oblivionem sperare convenit, 161. sec. 2. l. 2. co.

Ex capite dolentes, & alto stupore, quem catochum dicunt, detenti, ac delirantes cum alvi interceptione, ferociente intuitu floridi, in scapulis rigescunt ac posteriorum partium distentione tentantur, 162. sec. 2. l. 2. coac.

Quæ caput quodammodo concutiant, cum intensâ oculorum rubebine, ac manifesto delirio, perniciem denunciant, neque tamen hoc ad mortem comitatur, verum circa aures tumores excitat, 163. sec. 2. l. 2. co.

Dolor capitis cum sedis ac pudendorum dolore torporem ac impotentiam adfert, vocemque exolvit, neque ista molestiam exhibent, verum ex his somnolenti, ac singultuosi nono mense evadunt, & voce libera reddita in integrum restituuntur, 164. sec. 2. l. 2. co.

Qui capitis dolore vexantur ac alto stupore quem catochum vocant, cum dolore detinentur oculos habent prærubros, in his

sanguinis profluvium sperandum est, 166. sec. 2. l. 2. co.

Qui capite gravati, ad sinciput dolores sentiunt pervigilio torquentur, iis sanguinis eruptionem fore spes est, cum verò præsertim si aliquis tensionis sensus in cervice apparet, 135. sec. 2. l. 2. co.

In gravibus & acutis capitis doloribus, cum torpore & gravitatis sensu, proclives sunt convulsiones, 171. sec. 2. l. 2. co.

Ex capitis dolore liberat pus è naribus effluens, aut spura crassa, & inodora, liberat quoque & Ulcerum eruptio, interdum verò & somnus, & alvi fluxus, 172. sec. 2. l. 2. co.

Moderatus capitis dolor cum exhausta siti aut sudore febrem non solvenre, gingivarum abscessus, aut citra aures tubercula denunciat, nisi alvus erumpat, 173. sec. 2. l. 2. co.

Capitis dolor cum sopore & gravitatis sensu quodammodo convulsionem accersit, 174. sec. 2. l. 2. co.

Qui capitis dolore, siti, levi pervigilio detinentur, obscure loquuntur, ad motum impotentes, humefcente alvo, laetudine vexantur, in his fortasse infania metuenda est, 175. sec. 2. l. 2. co.

Qui capite dolent cum levi aliqua surditate, manuum tremore, cervicis dolore, nigricantes reddentes urinas & densas, ij si nigra vomitione refuderint, perniciosè habere sciendi sunt. 176. sec. 2. l. 2. co.

Quibus ex posteriore parte ossibus fractis, capitis dolor inest vehemens, & crassa è naribus fluxio, malo est, si dolore autem ad oculum suborto, vigore corripuntur, qui etiam ossium ad tempora effracturæ, convulsiones accersere solent, 118. sect. 2. l. 2. co.

In vterum gestantibus capitis dolores qui cum sopore, à gravitate & convulsione fiunt, vt plurimum malo sunt, 527. sect. 2. l. 2. co.

In vterum gerentibus capitis dolores cum sopore & gravitate malo sunt, fortesque huiusmodi naturæ vna etiam convulsionibus sint obnoxie, 534. sect. 2. l. 2. co.

Quibus absque febre & coloris fœditate frequens adest verticis ac temporum dolor, si planè nullus alius fuerit faciei abscessus aut vocis gravitas, aut dentium dolor, iis sanguis è naribus profluit, etsi alioqui sani videntur, iis tamen aut lienem tumidum, aut caput dolere, aut splendicans quiddam ante oculos obversari comperies; magna verò ex parte vna caput & lien hunc in modum se habere videntur, sec. 2. l. 2. præd.

Vide abscessum, gravidam, orum.

## DOLOR IUGVLI

& Cervicis.

Dolores sensim ingravescentes, si ad jugulum & superiores partes transeant, perniciem minantur, 70. sec. 2. l. 2. co.

Cervicis cubitorumque dolores, convulsiones minantur ex facie autem ad fauces.



procedunt, 270. sec. 2. l. 2. co.

Cervicis dolor in omni quidem febre malignum, in his verò pessimum in quibus etiam vehementis insaniam merus est, 273. sec. 2. l. 2. co.

Quibus capitis & Cervicis dolor, actotius corporis impotentia quædam cum tremore adest, ab his sanguinis eruptio liberat, fortasse ista dissolvuntur, verum interim vesicæ interceptuntur, 170. sec. 2. l. 2. co.

Ex Cervicis dolore cum sopore & sædore inflata alvus siquidem ex medici industria siquida demittat cum aliqua proluxu, deinde quæ biliosa non sunt resistent, huiusmodi asservata diuturniorem morbum efficient, in his animadvertendum est num proluxus alvi non biliosæ benigniores sint ac statuosum tumori conducunt, 98. sec. 2. l. 1. præd.

#### DOLOR LUMBORVM.

In intenso lumborum dolore, & alvi subductione, largiore sumpto veratrum, spumiosum crebra vomitio prodest, 310. sec. 2. l. 2. co.

Quibus lumborum dolor in caput recurrit & manus torpore affectæ, ac oris ventriculi dolorem sentiunt, aut aurium sonitus, ij liberaliter sanguinem profundunt, sed ex his alvus effunditur & mentis perturbatione ut plurimum tentantur, 308. sec. 2. l. 2. co.

Ex lumborum dolore, liberales sunt & argæ sanguinis fluxiones, 307. sec. 2. l. 2. co.

Lum-

Lumborum dolores, sanguinis profluvium excitant, 306. sec. 2. l. 2. co.

Diuturni lumborum dolores, qui cum febre ad tertianæ naturam propius accedente ingravescent, sanguinis grumosi successuri spem faciunt, 305. sect. 2. l. 2. co.

Quibus lumborum dolor in caput & manus recurrit, & torpore affecti oris ventriculi dolorem sentiunt, tenuibus ac serosis humoribus abundant, ij liberaliter sanguinem profundunt. At verò his cum mentis perturbationibus effunditur, 139. sect. 2. l. 1. præd.

Lumbis dolentibus si oris ventriculi dolor accesserit futura per hæmorrhoidas evacuationis signum est, ac fortè etiam præcessisse significat, 130. sect. 2. l. 2. co.

Lumborum dolores diuturni qui sensim sunt circum præcordia involuti, cum febre & ciborum fastidio, si intensum capitis dolorem advehunt, non sine convulsionis specie celeriter interfunt, 110. sect. 2. l. 1. præd.

Si lumborum dolor diu detinet cum aestu implacido, tenui sudore circa caput & thoracem oborto, pernicies denunciat: nam plerumque ij tremuli evadunt, & vox velut in rigore conspicuo tremula existit, 42. sect. 2. l. 1. præd.

Qui lumborum & lateris dolore absque ulla occasione tentantur, ii in morbum regium incidunt, 313. sect. 2. l. 2. co.

Lumborum dolor cum æstu implacido & anxio, malum significat, 323. sect. 2. l. 2. co.

Lumborum dolor absque causa manifesta crebrò invadens, morbi malignitatem indicat, 322. sect. 2. l. 2. co.

Considerandum est in lumborum dolore conflictatis & anxietate citra vomitum & paulisper ferociter desipientibus ægris; num nigra per secessum proditura sint, 319. sect. 2. l. 2. co.

Lumborum oris & ventriculi dolor, cum forti seratione convulsionem quodammodo suspectam facit, 320. sect. 2. l. 2. co.

Qui lumborum dolore conflictantur, ii malè habent num his tremores fiunt, & maculae rubentes quales in tibiis, cum rigore, 318. sect. 2. l. 2. co.

Lumborum ac tenuioris intestini, diurni dolores & circum præcordia labores, in ægris una cum febre cibum fastidientibus, eos dolor intensus ad caput progressus non sine convulsionis specie celeriter interficit, 117. sect. 1. 2. co.

Lumborum dolores ad os ventriculi recursantes cum febre, horrore, si tenuia & aquosa vomitione rejecerint, delirarint, voce defecti sint, ii post nigrorum vomitionem moriuntur, 316. sect. 2. l. 2. co.

Dolentibus lumbis si oris ventriculi dolor accesserit, futuræ per hæmorrhoidas vomitionis signum est, aut etiam præcessisse significat,

gnificat, 302. sect. 2. l. 2. co.

Quæ ex lumbis in cervicem & caput redundantia levis syderationis more, resolutionis sensum inducunt, convulsionem ac mentis emotionem minantur. Videndum est num talia convulsionibus solvantur aut in hujusmodi habentibus alvi malè habeant, atque eadem diutius perseverent, 313. sect. 2. l. 2. co.

Ex recursatione doloris in lumbis, oculorum percussio, aut distortio mala est, 314. sect. 2. l. 2. co.

Lumborum atque inferiorum partium dolores quibus etiam febris accedit, si relictis inferioribus septum transversum appetant, tum verò præsertim exitio sunt si aliquod periculosum signum accesserit: quod si reliquorum signorum nullum periculum ostenderit, fururæ suppurationis metus est, 108. sect. 2. l. 2. co.

Lumborum & capitis ac oris ventriculi dolor cum forti excreatione convulsionem suspectam facit, 106. sect. 2. l. 1. præd.

### DOLOR VENTRIS.

Dolores ventris sublimes leviores, non sublimes fortiores, aph. 7. sect. 6.

Oris ventriculi dolores cum intestinorum cruciati interaneorum animalia dejiciunt, 285. sect. 2. l. 2. co.

Oris ventriculi dolor seniori crebrò adveniens, repentiæ mortem denunciat, 286. sect. 2. l. 2. co.



Ventris dolor à partu, in his purulenta expurgat, 520. sec. 2. l. 2. co.

Quibus inter ventriculū & septum transversum pituita concluditur; & dolorem adfert in alterutrum ventrem viam non habens iis per venas in vesicam pituita morbi fit solutio, aph. 54. sec. 7.

Oris ventriculi dolor ac præcordiorum pulsus cum febre, in qua totius corporis habitus perfrigeratur, malum denunciant; idque præsertim si cum tenuibus sudoribus contingunt, 283. sec. 2. l. 2. c.

A diuturno partium ad ventrem attinentium dolore, suppuratio, aph. 22. sec. 7.

Vide alvum, dolorem lumborum, præcordiorum.

### DOLORES PRÆCORDIORUM.

Ex præcordiorum doloribus, alvus aliquantulum viscida paulatim transmittens stercoracea pauca effundit & fortassis sanguinem profundit, 292. sec. 2. l. 2. co.

Ingruentes ad præcordia dolores, cum pravi sunt, tum verò si alvos profundant, deteriores autem si parvo tempore fiant, quin & inde suborta ad aures tubercula, aliaque suppurationes malignitatem præ se ferunt, 274. sec. 2. l. 2. co.

Quos de repente absque febre, præcordiorum aut oris ventriculi dolor, aut crurum & inferiorum partium affligit, alvusque intumescit,

mescit, venæ sectio aut alvi fluxus solutionem adest, his febricitate noxium est: Nam & longæ & vehementes febres subnascuntur, ac tuties, & spirandi difficultas atque singultus fiunt quibus in solutionem spectantibus vehemens coarum dolor, aut crurum aut purulenta spuratio, aut oculorum orbitas succedit, 294. sec. 2. l. 2. co.

Qui præcordiorum doloribus, oris ventriculi, jecoris ac earum quæ sunt circa umbilicum partium conficiuntur, ementa alvi dejectione liberantur, secus autem moriuntur, 295. sec. 2. l. 2. c.

Præcordiorum dolores in febre agro fam nequeunte si absque sudore solvantur, malum indicant, his ad coxendices dolores decumbunt, 297. sec. 2. l. 2. co.

Præcordiorum dolores in febribus cum loquendi impotentia, si sudore non solvantur maligni sunt, in his dolores ad coxendices cum ardenti febre, atque alvus affatim prorumpens, perniciem ostendant, 30. sec. 2. l. 1. præd.

Dolores in febre in præcordia affilientes, sine sudore soluti maligni sunt, in his dolores ad coxendices cum ardenti febre, atque alvus affatim erumpens perniciem ostendant, 209. sec. 2. l. 2. co.

Anxietate vexatis præcordiis oborta ad aures tubercula mortem afferunt, 302. l. 2. co.

Vide dolorem ventriculi, febres.

## DOLOR FAUCIVM.

Vbi fauces dolent, aut pustularum eruptiones oriuntur in corpore, excrementa spectare oportet, nam si biliosa fuerint, vna corpus ægrotat; si verò sanorum excrementis similia, tutò corpus alere poteris, aph. 15. sec. 2.

Faucium gracilium dolores suffocantes convulsionem minantur, tum verò præcipuè si à capite originem ducunt, quale quid Thra-synontis consobrinæ contigit, 104 sec. 2. l. 1. præd.

Vbi fauces in morbis acutis dolent, graciles sunt parvæ & suffocantur, atque vbi os hiarit non promptè adduci ac claudi possit, mentis emotionem portendi oportet, ex his phrenitis, perniciofa est, 11. sec. 2. l. 1. præd.

Vehementes faucium dolores aurium tubercula & convulsiones excitant, itemque cervicis, ac colli dolores, 268. sec. 2. l. 2. co.

Vehementer dolentes fauces absque tumore, cum labore & molestia, præceps exitium minantur, 265. sec. 2. l. 2. co.

Fauces gracilium præfocantes dolores vbi ex capitis dolore ortum duxerint, convulsiones adferunt, 262. sec. 2. l. 2. co.

Fauces exulceratæ cum febre, grave aliquid portendunt, at si aliud aliquod etiam signum adfuerit, ex his quæ ante præva esse censuimus ægrum in periculo versari denuncian-dum est, pag. 55. sec. 2. l. 1. præd.

DO.

## DOLOR AVRIS.

Auris intensus dolor cum febre acuta, ac cæteris aliquanto gravioribus signis, juvenes quidem intra 7. diem aut etiam celerius cum delirio necat, nisi puris copia ex aure, aut sanguis ex naribus effluat, aut aliud quoddam laudabile signum extiterit, ætate autem proveciores tardius, aut minus tollit, nam & in his aures antè suppurant, & delirium minimè infestat, sed & in hac ætate multis morbus revertitur, ac proinde interficere solet, 189. sec. 2. l. 2. co.

Auris dolor acutus cum febre continua & vehementi gravis, periculum enim delirii ac mortis ægro adfert. Cùm igitur hic modus sit lubricus, celeriter à primo die ad omnia signa animum adhibere oportet. Moriantur autem ex hoc morbo, juniores quidem 7. die aut citius, senes verò multò tardius. Nam & febres & deliria minus eis suboriuntur, auresq; eam ob causam suppuratio præoccupat, verum his quidem ætatibus succedentis morbi reversiones plurimos interficiunt, juniores verò priusquam aures suppurent, intereunt: quandoquidem si pus album ex aure fluxerit, juniorem superfuturum spes est, l. 1. sec. 2. prænot.

## DOLOR LATERIS.

Doloribus lateris & pectoris, cæteratumque partium ægri an multum differant, discernendum est, aph. 5. sec. 6.

C 2



In dolore lateris, sanguinis è naribus stil-  
lacio mala est 405. sec. 2. l. 2. co.

Lateris dolor cum biliosis sputis temerè ac  
præter rationem evanescens, ægros in vehe-  
mentem & furiosam mentis emotionem agit  
27. sec. 2. l. 1. prædic.

Vide pleuritidem, & febres.

### DOLOR DORSI.

Qui ex dorsi dolore initia ducunt ægritu-  
dines, diffiiles, 309. sec. 2. l. 2. co.

### DOLOR COXÆ.

Quibus longo coxendicum dolore confi-  
ctis, femoris summum coxa excidit, tur-  
fi. q; recidit, iis mucosa ibidem parva col-  
ligitur, aph. 59. sec. 6.

Quibus diuturno dolore ischiadico laxa-  
tis femoris caput coxa excidit, iis femur con-  
tabescit & claudicant nisi vrantur, aph. 60.  
sec. 6.

De coxendicum autem doloribus sic exi-  
stimandum est, quibus senioribus vehemen-  
tissimi torpores adsunt, & lumbi ac crura fri-  
gescunt, nec pudendum erigere valent, al-  
vumque non nisi coacta egerit, & mucosum  
alvi retrementum, plurimum prodit, his ma-  
ximè diuturnum fore, ac prædicendum ex  
quo morbus cœpit, annum ut minimum per-  
sureratum, juvenumque non nisi aut  
verè aut ætate sperandum. At juvenibus qui-  
dem non minores dolores afferunt coxendi-  
cum morbi, sunt tamen breviores: etenim

40. die

40 die liberantur, quin nec vehementes tor-  
pores, neque crurum, ac lumborum perfu-  
siones sunt: quos autem morbus iste, in  
lumbis & cruribus vexat, neque tamen adeò  
ut decumbere cogantur, animadvertere oportet,  
num aliquid vispiam in coxa concreseat,  
percontantque, num ad inguen dolor perve-  
niat: etenim si utraque adfuerint, morbus  
efficitur diuturnus, percontandum quoque  
num femur torpores sentiat & ad poplitem  
peringat, quo concessio rursus petendum  
num per tibiā ferantur ad primam summi  
pedis partem, quæ tarsos dicitur, qui enim  
istorum bonam partem fateantur, his ipsis crus  
modo calidum modo frigidum fieri rectè  
prædixeris; at quibus hic morbus relictis  
partibus quæ ad lumbos sunt, infra vergit,  
eos bene sperare iubeto: quibus vero coxen-  
dices & lumbos occupat, & supra vergit, illi  
gravem fore prædicio: quibus autem ad ar-  
ticulos dolores oriuntur & tumores, des-  
cuntque sine pedagra, iis & magna viscera  
adesse compenies, in vrina quod subidet al-  
bum ac si cui tempora attollentur, ea sæpe  
dolere fatebitur, & sibi nocturnos sudores  
contingere. Quod si neque tale quicquam  
in vrina subidet, neque sudores contingunt,  
mors est, ne articuli claudicent, aut in his  
abscissus fiat, melicerida vocant. Iis autem  
morbus iste contingit, quibus pueris aut ju-  
venibus ex naribus sanguinis fluor consue-

tus defuit, ex quibus percontari oportet num in iuventute sanguinis fluxus contigerit, & num pungentes prurigines ipsis in pectore aut dorso infint; aut eadem contingunt quibus vehementes alvi dolores absque perturbatione adsunt, aut quibus per ora venarum quæ sunt in ano sanguis effunditur, hinc rânque istorum morborum origo petenda est. Quod si viris hujusmodi fœdus color appareat, num etiam capitis dolor adsit percunctandi sunt, quod fatebuntur. Ex quibus qui ventris dextra parte dolores sentiunt, iis vehementes dolores fiunt, idque vel maxime si in præcordiis ad hepar dolor restiterit, quibus malis confestim levat strepitus qui in ventre fit, ac vbi dolor conquievit, vrina crassa, & pallida redditur. Atque hoc morbi genus neutiquam lethale est, sed valde diuturnum, at vbi jam morbus inveteravit, homines oculorum caligine vexat. Percontari igitur oportet num sanguis in iuventute fluxerit, aut oculorum caligatio contigerit, aut vrina pallida vacuata fuerit, aut intus incitati spiritus & supervenientes, juventum attulerint. Ista namque omnia fatebuntur, pag. ult. l.2. sec.2. præd.

Vide anginam, & coxendicium morbos.

### DOLORES RENV. M.

Si quibus verò è renibus laborantibus, præter supradicta signa, dolores etiam circa spinæ musculos fiant, si quidem ad loca ex-

teriora

teriora sentiantur, foras abscessum quoque fore expecta: si verò ad interiora magis vergant, introrsus etiam abscessum futurum potius sperandum est, aph.36. sec.7.

Derepente obortus renum dolor cum vrinæ suppressione, calculorum aut vrinæ crassæ mictionem indicat, 389. sec.2. l.2. co.

### DOLORES SEDIS.

In longis periculis sedis dolor mortem affert, 71. sec.2. l.2. co.

Vide dolores capitis.

### DOLORES PECTORIS.

Dolor in pectore fixus cum torpore suborta febre malum indicat, atque celeriter mortem opperunt, 315. sec.2. l.2. co.

### DOLORES PULMONVM.

Quæ ad pulmonem aut præcordia dolores faciunt, si in pus vertantur, malum denotat, 216. sec.2. l.2. co.

Dolores in locis hujusmodi de pulmonibus loquitur, qui neque ad expuitionem, neque ad venæ sectionem aut victus rationem desinunt, ad suppurationem tendunt, 294. sec.2. l.2. co.

Vide spurum.

### DOLORES VMBILICI.

Dolores circa umbilicum cum palpitacione, mentis quidem alienatione significationem quandam præbent: at iis sub iudicationem conferta & crebra pituita cum dolore prodit, 300. sec.2. l.2. co.



Supra umbilicum labor, ac lumborum dolor qui remediis non cedit, in hydropem siccum definit; 304. l.2. co.

Dolores circa umbilicum cum palpatione, mentis quidem alienatæ significationem quandam præbent, sub iudicationem verò his plurimus & creberrimus cum singulari contentione prodit; & ad suram dolores in his mentis alienationem indicant, 36. sec.2. l.1. prædict.

### DOLOR IECORIS.

Quibus hepar dolet, cum oris ventriculi dolore, sopore, rigore, ij alvo exturbata cum corporis extenuatione, ciborum fastidio, multis tenuibus sudoribus diffuunt, & pusculenta per alvum demittant, 448. sec.2. l.2. co.

Quibus jecur dum repente vehementer dolet, iis febris succedens remedio est, 446. l.2. l.2. co.

Vide jecur.

### DOLOR VTERI ET durtices.

Vterinæ ventris durtices cum dolore cæteram perniciem denunciant, 528. sec.2. l.2. co.

### DOLOR MAMMARVM.

Quæcumque mammarum dolore & febribus vexantur, eas sanguinis concretis spuitio non feculenta dolore liberat, 553. sec.2. l.2. co.

DO:

### DOLORES HVMERI.

Humerorum verò dolores, qui ad manus tendunt torpore, ac dolores exhibent, abcedas certe non consequuntur, at bilis aut a venatione sanguinis. Vos autem qui in humeris perduntur, & ad manus pertingunt, peris aut ita bilis vultu, & venatione, quoniam hec membra est ratio. Quis quidem sonans & extenuos venatione, nigram bilis effluor in guttate oportet. At dicitur, si in humeris, si in faciem color subruber aut niger antea non visus suboritur, per spiritum potius credituros spes est. Præterea etiam animadvertendum, pedes tumoribus infestantur. Hoc enim dubitatum est signum, hic autem morbus vris vehementissimus accidit à 40. anno ad 60. quam aratam etiam coarctatam dolores præcipue vexant, sec.2. l.2. prædicto.

### DOLOR CUBITI ET CERVICIS.

Cubiti cervicisque dolores convulsionem minantur, ex facie autem præcedunt ista, fauciumque sonitus crebri cum salivatione, iis sudores in somnis bono sunt, nempe ex dolore levati plurimos consentaneum est, quibus si dolores invadunt inferiores partes proinde in his ex sopore aliquid convulsionis periculum impendere nemini mirum videri debet, 116. l.1. sec.2. prædicto.

Quæ in cubitis adscissa sunt, præcipue cum

inflammatione ad suppurationem sectionum  
& ad unctionem perveniunt, 102. l. 2. sec. 2.  
prædic.

Dormire, vide somnum.

### ELLEBORVS.

Elleborus perniciosus sanas carnes habentibus, convulsionem enim ingenerat, aph. 6. sec. 4.

Epoto veratro rubra spumantia, pauca vomitione rejicere juvat. Duritias tamen facit, & magnas puris intus collectiones eximit: qui vero italia vomitione refundunt, pectoris præcipue dolore constistantur, & in rigoribus crebro & tenuiter exsulant, testes in tumorem sublatos habent, quo in casu subindurigent & graciles evadunt, 520. sec. 2. l. 2. co.

Vide convulsionem, dolorem lumborum, purgationem.

### EMPHY.

Qui ex pleuritide empyi fiunt; si à rupture empyematis intra dies 40. repurgentur, liberantur, alioqui transeunt in tabem, aph. 73. sec. 4.

Si empyi cum uruntur, aut secantur, purum & album pus efflunt, evadunt: si vero suberuentum, fœculentumque, & fœtidum, pereunt, aph. 4. sect. 7: vide hydrops.

Vide pus, pleuritides, pulmones.

### EPILEPSTA.

Epilepsia laborantes pueros, cum loci vitiosus, tum maxime ætatis mutatio liberat, aph. 49. sect. 2.

Epilepsia ante pubertatem a motionem recipit, post 15. annum ferè comitatur ad mortem usque, aph. 7. sec. 5.

Ex morbo sacro, quem convitalem dicunt, ægerimè emergunt, quibuscum una à puero increfcit morbus, & in virilem ætatem simul adolescit, deinde quibus ætate florente ortus est, nempe post annum quintum & vigesimum, ad quadragesimum quintum usque quos deinceps consequuntur, quibus morbus accidit, neque ante in corporis partibus aliquis venientis mali sensus est, quibus neque ex capite initium ducere videtur, aut latere, aut manu, aut pede, iis facilius sanantur. Hæc autem inter se differunt, ex his namque molestissimi sunt qui à capite originem trahunt, deinde ex latere, qui verò à manibus, ac pedibus, præcipue sanitatem recuperant. His autem minum admonere medicum oportet, qui rectè curationis rationem tenuerit, ubi juvenes fuerint, & laboribus dediti, nisi secuti mens male sit affecta, aut quis attonitus fuerit. Ejusmodi namque vehementes mentis emotiones nihil conducunt, reliquæ verò omnes, naturæ emotiones, quæ ad inferna tendunt, probantur; longæque optimæ hoc loco censendæ sunt, quæ maxime cruentæ. At senes qui corripit cœperunt præcipue moriuntur, ac nisi pereant celerimè, sua sponte servantur, minimeque à medicis juvantur, 98. præd. lib. 2.



## ERYSIPELAS.

Erysipelas foris intrò converti malum, intrus verò foras existere bonum, aph.2. sec.6.

Si prægñanti fiat, in utero erysipelas, perniciolum est, aph.43. sec.3.

Ab ossis nudatione erysipelas, malum, aph.19. sec.7.

Ab erysipelate putredo, aut suppuratio, malum, aph.20. sec.7.

Erysipelas verò foris quidem extare utile, intro autem vergere lethale; cuius quidem rei indicium est cum rubore evanescente, pectus gravatur, & ægrius spiritum trahit æger, 66. sec.2. co.

Vide anginam.

## EVNUCHI:

Eunuchi podagra non laborant, nec calvi fiunt, apho.28. sect.6.

## EVACUATIO.

Athletarum plenior corporis habitus, si ad summum plenitudinis gradum perductus lubricus est, neque idem permanere aut consistere potest, cum verò non consistat nec jam possit in melius proficere superest ut recidat in deterius, quamobrem plenior illa corporis habituudo hand cunctanter est solvenda, quò corpus novæ nutritionis initium capiat, non tamen vacuando usque eo pergi velim, ut vasa in se penitus confidant; hinc enim tutum non est, sed quatenus natura ferat, & eousque progredi oportet: sic & extremæ

extremæ vacationes periculosæ; contraque repletiones extremæ si fuerint similiter periculosæ, aphor.3. sect.1.

Quæ educere oportet quoquo maxime vergere videbuntur ducere, viis ac locis utiliter eò convenientibus, aph.21. sect.1.

Quæ vacuantur, multitudine metienda non sunt, sed si quæ oportet vacuentur, & facile ferant, atque ubi ad animi deliquium educere convenit, faciendam, si ægrotus par esse possit, aph.23. sec.1.

In turbationibus alvi, & vomitibus quæ sponte fiunt, si qualia oportet purgentur, confert & facile ferunt, sin minus, contra fit, sic & vasorum depletio, si qualem fieri oportet, fiat, confert & facile ferunt, sin minus contra accidit; proinde & regionis, & temporis, habenda est ratio; pro quibus talia vacuari debent necne, aph.2. sec.1.

Incipientibus morbis, si quid movendum videtur, move, vigentibus autem quiescere multò præstat, aph.29. sec.2.

Semel multum, & repente, vel vacuare; vel replere, vel calefacere; vel refrigerare; vel alio quovis modo corpus movere periculosum; omne siquidem nimium naturæ inimicum; paulatim verò quod fit tutum, cum alias tum maxime ab uno ad aliud facienda est mutatio.

Quibus venæ sectio aut purgatio prodest, his verò secunda est vena aut purgatio impetranda, aph.47. sec.6.

Quibus sanguinem è venis detrahere conducit, iis vere secunda est vena; aph. 53. sec. 7.

Vide purgationem.

### EXCREMENTA ALVI.

Excrementa alvi nigra, sanguini atro similia sponte euntia, siue cum febre, siue citra febrem pessima; & quanto ipsorum colores peiores fuerint plures, eo deteriora: à medicamentis autem talia exigi, melius est, idque quanto ipsorum plus fuerint colores, aph. 21. sect. 4.

Tenuis ex alvo absque mordacitatis sensu prodeuntes, dejectiones, ei qui sibi bene constat, malum portendunt, velut nonnunquam jecinoroso contingit, 78. l. i. præd.

Ex ventre quæ prodeunt sublivescencia, & turbulenta, urinæ etiam tenues, ac dilutæ suspectæ sunt, 108. l. i. præd. sect. 2.

Quæ inter se non coherent, sed faciliè dissolvuntur, & aliquantulum friabilia sunt, alvi recrementa liquida, cum summi totius corporis perfrictione, non sine febre improbanda sunt; ac præter hæc, si rigores vesicam, & ventrem, cum dolore invadunt, proinde in his ex sopore aliquod convulsionis periculum impendere, nemini mirum videri debet, 116. sec. 2. l. i. præd.

Frequentes desidendi labores, pauca aliquantulum flava, glutinosa excrementa; cum paucis alvi recrementis, præcordiorum & lateris dolores, morbum regium prænuntiant: animad-

animadvertendum verò num ex istorum superpressione ii exolvantur, aut fortasse sanguinem profundant. In his lumborum tensio & dolores, sanguinis erupturi fidem faciunt, 146. sec. 2. l. i. præd.

In alvi recrementis quæ cum torminibus deiciuntur, sedimentum limosum, & sublividum malo est. Ac fortasse quidem ad præcordia dextra dolor adest: & in his viris exolvuntur; videndum num abscessus ad aures paulò post cum dolore excitentur: in his omnibus alvus affatim prorumpens periculum intentat, 156. sec. 1. l. i. præd.

Alvo stercora nigra demittente, si sopor appareat, tubercula ad aures excitat, 166. sec. 2. l. i. præd.

Seccessus verò necesse est his qui defatigantur, dum parvo cibo aut potu contenti sunt, exiguos, & duros procedere, siue quotidie, siue tertio quoque aut quarto die, aut longiore ex intervallo prodeant, tuncque metus est ne febris aut alvi profluvium prehendant: quibus tamen peiores sunt dejectiones omnes, quæ tam sunt liquidæ, ut in exitu figuratæ esse nequeant, frequentem verò ibum sumentibus, ac multum defatigatis, mollem in transitu dejectionem, siccam esse oportet, e h. si pro negotiorum copiam pro defatigatione ratione respondere, sumpta autem ratione horum rationum, his quidem qui minime defatigati sunt, horum: his verò qui



plurimum defatigantur paucae dejectiones prodeunt, si sani sint & proba victus ratione utantur; (ea namque ad hæc conferre existimandum est) at liquidiore dejectiones, quæ citra febrem & die septima aut citius iudicio terminantur vitiles, si semel vniuersæ affiant; neque repetant, quod si febris accesserit, alviq; profluvia repetant, si diu perseverent omnino vitiosa sive biliosa fuerint, sive pituitosa, sive cruda, egentque singula propria victus ratione tum medicatione, pag. 94. sect. 2. lib. 2. præd.

Alvi dejectio optima est, si mollis est & consistat, coque tempore, quo per sanitatem deijci solet, copia verò ciborum ingestorum rationi responderit, talis enim exitus inferiorem alvum bene valere declarat, at liquida alvi egestio ex vñ est si neque stridet, neque crebro, neque ex brevibus intervallis excutitur: frequens enim desidendi labor ægrum fatigat, etque insomnia adfert. Quod si assatum & sæpe deijcitur, periculum est ne animus deficiat. Verum pro ingestorum ciborum copia, his aut rer interdiu & nocturn semel, deijci debet, plus tamen prima luce pro hominis consuetudine. Crassiorem autem fieri dejectionem oportet, morbo aut iudicationem procedente, sit etiam subfusca; neque admodum graveolens, lumbricos quoque prodire rotundos cum alvi excretionem, morbo in iudicationem tendente expedit.

In om-

In omni verò morbo ventrem mollem esse, & mediocriter extumescere convenit; at valde aquosum aut album, aut ex viridi pallidum, aut vehementer rubrum, aut spumans deijci, hæc omnia mala sunt. Præter hæc quoque malum est, quod exiguum, glutinosum, candidum, ex viridi subpallidum, & leve existit. His verò magis lethalia sunt, nigra, aut pingua, aut livida, aut æruginosa, aut foetida. Varia autem his quidem sunt diuturniora, nihilo tamen minus exitiaria. Huiusmodi sunt strigmentosa, biliosa, cruenta, porracea, & nigra, modo simul inter se mixta, modò per vices prodeuntia. Flatum autem sine sonitu quidem & crepitu exire optimum. Præstat tamen cum strepitu prodire, quam istis revolvat qui eo modo prodit, ægrum aliquo dolore vexari, aut delirare indicat, nisi æger sua sponte hoc modo flatum emisit, & præcordiorum dolores & tumores, recentes quidem & sine inflammatione murmur solvit, circa præcordia extortum, idque porissimum si cum stercore vrina, & flatu prodierit, aliqui vbi ipsum per se transmissum fuerit, juvat, idque magis si ad inferiores sedes descenderit, 48. sect. 2. præd.

Quibus prodeunte egestionem biliosa, ad pectus morius ac amaritudo sentitur, ij malè habere iudicantur, 43. sect. 2. l. 2. co.

In pluribus graveolentibus dejectionibus cum febre acuta, præcordiorum contentione,

ex longo intervallo oborta ad aures tubercula mortem adferunt, 201. sect. 1. l. 2. coac.

A sanguinis eruptione nigrorum per album egestio, malo est. Quin & prærubra & æruginosa dejectiones damno sunt, quibus ejusmodi sanguinis eruptiones 4. die contingunt, tandem sopore & convulsione confictati, moriuntur prægressis nigris dejectionibus & ventre in tumorem sublato, 330. sect. 1. l. 2. coac.

Alvi recrementum optimum est molle, constans, aliquatenus fulvum, nec admodum graveolens, eoque tempore quo per secundam valetudinem dejici solet excretum; copia verò ingestis cibis respondens. Crassum autem fieri oportet in judicationem eunte morbo, utile quoque quod lumbricos teretes ad judicationem exire cogit, 901. sect. 2. coac.

In præcipitibus malis spumans & circumbiliosum excrementum, malo est, malum quoque, & exactè candicans: adhuc verò deterius farinæ molitæ instar & stercorosum, præter hæc sopor malo est, & cruenta alvi dejectio, ac immoderata vaporum inanitio, 602. sect. 2. coac.

Vbi alvus modicè intercepta, nigra stercoribus caprarum similia, nec nisi coactè demittit, hoc casu nasus erumpens malo est, 603. sect. 2. coac.

Alvi recrementum glutinosum, syncerum, aut album in vitio est. Vitiosum quoque quod

quod abundè fermentatum est, & aliquantulum pituitosum, prævum etiam cum ex his quæ densata feruntur; quod subsidet aliquantulum livescit, purulentum ac biliosum est, 604. sect. 2. co.

Sanguis splendidus alvo per secessum reiectus, malo est, præsertimque si dolor aliquis adsit, 605. sect. 2. coac.

Spumans & bile obductum alvi excrementum vitio est, iis verò præcipuè quos antea lumborum dolor, aut desipientia vexarit, fortèque dolores etiam iis adsunt, 607. sect. 2. co.

Tenue alvi recrementum & spumans, in quo quod subsidet aqueum est, & ex pallido virescens, malo est. Malum quoque purulentum, nigrum etiam, cruentum malum, cum febre atque aliàs. Vitiosum quoque varium abundè coloratum alvi excrementum, eoque deterius quo colore formidandum magis, præterquam in medicamento potione, tunc namque periculo vacat, copia non exuperans, friabilis quoque mollis in febre alvi secessus, vitio est. Vitiosus quoque siccus, qui faciliè dissolvitur nec coheret, decolor idque præcipuè si alvum humectat, lethalis verò si nigra antea prodierint, 608. sect. 2. co.

Liquidum alvi recrementum & brevibus intervallis cumulatam malo est, partim namque vitium & insomnium, partim verò exolutionem pariet, 609. sect. 2. co.



Perliquidum aliquantulum friabile alvi recrementum cum tummi totius corporis perfrictione, non sine febre, vitiosum est. Rigores præterea vesicam & alvum corripunt. Valde verò aquosa dejectio in præcipitibus malis non desinens, malo est, atque eo magis, si sitis vacuitatem fecerit, 610. *sect. 2. co.*

Prærubrum in alvi profluvio, excrementum vitio est. Viridum etiam admodum ex viridi pallescens, aut albicans, aut spumans, aut aquosum. Item malum est quod exiguum glutinosum, laeve, & ex viridi subpallidum, pessima quoque dejectio liquida in torpore & torpore detentis. *letha* verò est etiam multum sanguinem glutinosum ex alvo effluere, itemque candidum & liquidum excrementum, cum alvi tumore, 611. *sect. 2. co.*

Alvi excrementum nigrum, velut sanguis, & cum febre, & sine febre, malo est, mala item quæcunque varia, & quæ bile abunde sunt saturata, 612. *sect. 2. coac.*

Alvi recrementa quæ in spumosa & syncera desinunt, omnibus quidem ingravescentis mali significationem præbent, convulsione verò tentatis vel maxime in hujusmodi casibus ad aures ruberula eriri solent, at quæ perliquida, ac rursus consistentia, syncera, stercoracea, morbi longitudinem denunciant, prærubrum verò, in febre delirium, candidans autem stercorosum, in morbo regio molestiam exhibet, ac liquidum etiam ubi

ubi resederit ruborem adeptum, 613. *sect. 2. coac.*

Sanguinem effudentibus glutinosum alvi recrementum maculis nigris distinctum, malignitatem denotat, præcipueque exalbidis, 614. *sect. 2. co.*

Alvus perturbata cum frequenti desidendi labore maxillas intendit, rubores etiam faciei solvit, 616. *sect. 2. co.*

Exacte candidans alvi recrementum in febre, nullam bonam judicationem denunciat, 615. *sect. 2. co.*

Stercoracea alvi egestio cum tensione alvum male affectam denunciat, pituitosa verò repente cum oris ventriculi dolore, intestinorum difficultatem & fortasse etiam lumborum dolorem: in talibus alvus circumtensa ex necessitate liquida demittens, celeriter intumescens quandam convulsions significationem præse fert; in his novus subinde rigor periculum creat, 617. *sect. 2. co.*

Quibus nigra per alvum secedunt ij tenuibus & frigidis sudoribus distillant, 618. *sect. 2. co.*

Quibus circa initia alvus turbatur urinæ autem sunt paucæ, temporis progressu alvus quidem resiccat. Urina verò tenuis si abundat, his abscessus ad articulos fiunt, 619. *sect. 2. co.*

Frequentes desidendi labores rigorem adferant, & quibus alvi recrementum vitiosum,

est, id maximam molestiam exhibet si 4. die initium fecerit, 620. sect. 2. co.

Frequentes & ex parvis intervallis desistendi labores, aliquantulum glutinosa excernentes cum paucis stercoraceis, præcordiorum & lateris dolore, morbum regium prænunciant; animadvertendum autem num ex istorum suppressione ij cum virore pallefcant, eos verò etiam existimo sanguinem profundere, hos quoque lumborum dolores affligunt, & his sanguinem profundeutibus, sanguis splendidus prodit, cum sopore & capitis dolore subinde incalescere, perniciem denunciat, 621. sec. 2. coac.

Glutinosa, biliosa dejectiones, magis quodammodo abscessus juxta aures excitant, 622. sec. 2. co.

Quibus faciei incendium & intensus rubor solvitur & gravcolens est alvi egestio, redundans & subrubra; in his insania metus est, 624. sec. 2. coac.

In biliosa alvo, molli stercoracea egerente, apparentes astus tumorem ad aures excitant, 626. sec. 2. co.

Biliosas alvi dejectiones surditas, & surditatem biliosa alvi dejectio sedat, 627. sect. 2. coac.

Exitialis est dejectio pinguis & nigra, ac livida cum odoris gravitate, itemque biliosa simile quiddam lentium aut cicerum lomento continens, aut veluti bene florulentos sanguinis

guinis grumos, & infantium egestionem odore referens, ac varia, eidemque diu perseverans, talis etiam fuerit cruenta, strigmentosa, biliosa, nigra, viridis, & simul & per vices excreta. Exitialis quoque quæcunque prodeundo ægri sensum fallit, 611. sec. 2. co.

Vitiosa etiam sunt, prærubra dejectiones, æruginosæ, 4. die apparentes, ac hujusmodi sanguinis profusio soporem inducunt. In his casibus ex convulsione moriuntur, nigris ante prodeutibus, 632. sec. 2. co.

Quibus nigra per alvum secedunt ii tenuibus & frigidis sudoribus disfluunt, 633. sect. 2. coac.

In iis qui longo tempore consumpti sunt, temeraria & quæ præter rationem sunt alvi exclusiones, vnà cum vocis defectione tremula, perniciem denuntiant, 934. sec. 2. co.

Tenuis nigrorum dejectiones horrorem inducentes, in talibus meliores, tales præcipue juvant ætatem quæ vigorem antecedit, 635. sec. 2. co.

Quibus cum alvi perturbatione sub iudicationem morbus ingravescit, iis nigra per alvum prodeunt, 637. sec. 2. co.

Ex futuro ventris affectu vomentibus, biliosis cibum averfantibus, copiosus sudor abortus cum repentina virium impotentia, lethalis, 638. sec. 2. co.

Vbi alvus humecta est, ægri lassitudine, capitis dolore, siti, insomnia torquentur, in



prærubro colore libertatis insaniam metueret oportet, si spirandi difficultas adfuerit: quos etiam ex virore pallescentes, facili spiratio iuvat, alvo subinde prorumpentes 642. sec. 2. co.

Æstuosæ dejectiones, & cum contentione procedentes, malè affectam alvum prænuntiant, 643. sec. 2. co.

In biliosis perturbata alvus, pauca crebro reddens, & cum paucis mucosis distentionem facientia, oborto circa tenue intestinum dolore, nec facile prodeunte vrina, ex his calibus in aquam inter cutem tendit, 644. sec. 2. co.

Qui æstum sentiunt, & prægressis dejectionibus, tenuibus sudoribus disfluunt, iis febris ingravescit, 646. sect. 2. co.

In humecta alvo perfrictio cum sudore, vitiosa, 647. sect. 2. coac.

Humefcente alvo sanguis ex gingivis effluens, lethalis, 648. sect. 2. co.

Alvi recrementum purum succedens, febre acutem solvit cum sudore, 649. sec. 2. co.

Alvi prærubra proluvia, cum in omnibus quidem morbis, tum verò vel maximè in prædictis, malo est, 2. sec. lib. 2. præd.

In biliosis & sinceris dejectionibus, spumosa efflorescentia malo est, iis præsertim quos antea lumborum dolor ac desipientia vexavit, 21, sec. 2. l. i. præd.

In his

In his leves, & per intervalla lateris dolores, delirium significant, 22. sec. 2. l. i. præd.

Alvi recrementa, si in spumosa, & sincera desinant, mali incrementum significat, 50. sec. 2. l. i. præd.

In gravibus malis, & biliosis, exactè candicantes, spumantes, & circumbiliosæ egestiones malo sunt, 53. sec. 2. l. i. præd.

Vide dysenteriam, lenteriam.

### EXCREATIONES.

Excreationes in febribus non intermittentibus lividæ, cruentæ, foetidæ, biliosæ, omnes malæ. Commodè tamen si prodeunt bonæ: sed eadem quoque est eorum, quæ per alvum & vrinas excernuntur ratio, si quid verò quod non juvet per hæc loca excernatur, malum. aph. 47. sec. 4.

### EXTENUATIO.

In quovis morbo partes ad umbilicum & imum ventrem attinentes crassiores esse præstat: harum siquidem extenuatio & rabes mala, sed ad inferiores quoque purgationes parum tuta, aphor. 35. sec. 2.

Vide tabem, bilem etiam.

### FACIES.

Bene colorata facies teretica, ac superciliosa, perniciem intentat, 49. sec. 2. l. i. præd.

Facies ex tumida depressa, ac vox levior, ac remissior evadens, spiritus quoque rarior, ac levior, postera die remissionem fore de-

nūnciat. 211. sec. 2. co.

Faciei corruptela lethalis est, minus tamen si ob pervigilium aut inedia, aut alvi perturbationem contingat; nam quæ ex his causis orta est corruptelæ species; vna die aut nocte in integrum restituitur, hujusmodi autem faciei hæ notæ sunt, oculi concavi, nares acutæ, collapsa tempora, frigida aures contractæ quæ, cutis dura, color pallidus, aut niger. Ad hæc quoque livescens palpebra, aut labrum, aut nasus mortem in propinquo esse significat, 213. s. 2. co.

Bene colorata facies cum sudoribus diutiuscentibus absque febre, vetusta stercora subesse, aut inordinatam victus rationem præ se fert, 214. sec. 2. co.

In morbis autem acutis imprimis quidem ægroti facies sit in consideratione adhibenda, siue benevolentium præcipueque sui ipsius similis, ita enim optima existimanda, quæ verò ab eo plurimum recedit, gravissimum periculum portendit. Qualis fuerit natus acutus, oculi concavi, collapsa tempora, aures frigida & contractæ, imisque suis fibris inversæ, cutis circa frontem dura, inversa & resiccata, & totius faciei color ex viridi pallidus, aut etiam niger, aut lividus, aut plumbeus. Itaque si præ initia morbi ejusmodi facies fuerit, neque adhuc ex aliis signis conjicere poteris, interroga convenit, num ægrotus vigilaverit, aut alvus admodum

modum liquida fuerit, aut enim inedia aliqua oppresserit. Quod si quid horum fateatur, minus formidandum esse existimandum. At si nihil horum præcessisse dixerit, neque intra prædictum tempus ad pristinum statum redierit, in propinquo mortem esse sciendum est. Si verò vetustiore jam morbo, aut triduo, aut quadriduo, talis facies exierit, inquirenda ea sunt de quibus a mea præceptum ex corpore & oculis in considerationem adhibenda, ex l. præd.

### FAUCES.

Quibus ad fauces irritamenta sunt, his moderata aurium tubercula excitantur, 264. sec. 2. coac.

Fauces leviter exasperatæ, & alvus inanibus excretionibus sit paræ, frontis dolores in ægris palpitantibus & more investigantium sensim correctantibus. aut dolore affectis, si quæ ex his incrementa, molestiam exhibent, 267. sec. 2. co.

Vbi fauces dolent, aut pustulatum eruptiones oriuntur in corpore, excrementa multiplice oportet, nam si biliola fuerint vob corpus ægroti: si verò sanorum excrementa similia tutò corpus alere poteris, aphor. 15. sec. 2.

Vide prægn.

### FAMES.

Fame dominante vacandum est à labore, aph. 16. sec. 2.

Famem thorexis solvit, aph. 21. sec. 2.



## FEBRES.

Febricitantibus non omnino leviter corpus sibi constare, nec minui, aut etiam plus æquo colliquefieri, malum. Hoc siquidem virium inbecillitatem, illud morbi diuturnitatem significat, aph. 28. sec. 2.

Febricitantibus si sexto die rigores fiant, judicium habent difficilem, aph. 29. sec. 4.

Æstivæ quartanæ, plerumque brevès, autumnales longæ, & inter eas maximè quæ ad hyemem usque pertinent, aph. 25. sec. 2.

Quibus accessiones fiunt, quacunque hora febris dimiserit, eadem si postero die repetat, judicatu difficilis esse solet, aph. 30. sec. 4.

Qui per febres laetitudinem sentiunt, iis ad articulos, & juxta maxillas potissimum abcessus fiunt, aph. 31. sec. 4.

Febres quæ tertio quoque die vehementius affligentes non intermittunt, periculosiores: quoquo modo autem intermiserint, periculum abesse significant, aph. 41. sec. 4.

Tertiana exquisita septenis ad summum circuitibus terminatur, aph. 59. sec. 4.

Si febre ardente laboranti rigor superveniat, solutio fit, aph. 57. sec. 4.

Febricitantem nisi diebus imparibus febris reliquerit, solet reverti, aph. 61. sec. 4.

Quibus in febribus sexto die rigores repetunt, eodem die solvuntur, aph. 63. sec. 4.

In febribus circa ventriculum vehemens ætus, & cordis motus, malum, aph. 65. sec. 4.

In acy-

In acutis febribus convulsiones, & circa viscera vehementes dolores, malum. aphor. 66. sect. 4.

In febribus per somnum pavores aut convulsiones malum portendent, aph. 67. sec. 4.

Convulsioni febrem accedere satius est, quàm febrî convulsionem, aph. 26. sect. 2.

Qui quartana corripitur, non admodum convulsionibus tentantur; si verò prius tentati fuerint, superveniente quartana liberantur, aph. 70. sec. 5.

Quibus in febribus ardentibus tremores, æstus solvuntur, aph. 26. sec. 6.

Si febris sit non ex bile orta, multa aqua calida capiti superfusa, febrem solvit, aph. 42. sec. 7.

In febre convulsio, manuum quæ ac pedum dolores malignum quiddam prænunciant: malignus quoque ex femore doloris impetus, sed & neque genuum dolor probari potest: quin & surarum quoque dolores maligni sunt, ac mentis emotio, tum verò præcipue, si sablime quid in urina innatet, 30. sect. 2. l. 2. co.

Ex præcordiorum dolore obortæ febres, malæ quæ sunt, in his profundus ac altus sopor: pessimus, 31. sec. 2. l. 2. co.

Qui in febre non intermittente tenues & crebri exudant, cum præcordiorum distentione, si ut plurimum malignè habent, atque in iis dolores in humeri caput ac jugulum af-

fixi parvi sunt, 32. sec. 2. l. 2. co.

Febres quæ proximè ad tertianarum naturam accedunt cum incontinenti corporis mutatione, malignæ sunt, 32. sec. 2. l. 2. co.

In febre mutum esse, malo est, 34. sec. 2. l. 2. co.

Febres ad tertianarum naturam accedentes, vage & errantes, ubi in dies partes transiunt, molitionem exhibent, 37. sec. 2. l. 2. co.

In febribus vage errantibus, dicitur, statum non habere, 37. sec. 2. l. 2. co.

Febres ad tertianarum naturam accedentes cum tumore & corpore obveniunt, eos laesit dolor accedens cum levi partis alicujus syderatione necat, 60. sec. 2. l. 2. co.

Quibus cum febre lateris dolore accedente, et usquequosla multabile permixta transmittens alienationem adfert, deinde vero cibos aver autur, & sudoribus distillant, cum bene colorata facie, ac humefcente alvo, & dolor alicuius oris ventriculi succedit, ii diutius morbum trahentes pulmonum vitii laborantium more intereunt, 67. sec. 2. l. 2. co.

Judicationis cessationes in febribus, temporis quidem longinquitatem, non tamen perniciem inducunt, 74. sec. 2. l. 2. co.

Ex vehementibus doloribus obortæ febres, diuturnæ, 75. sec. 2. l. 2. co.

Qui accessione correpti, postero die gravius habent, iis malum denunciatur, 78. l. 2. l. 2. co.

Quibus

Quibus tertio die accessio subsistit & 4. in gravem exitum, malum denunciatur, ac metus est ne in justum di. accessiones phrenitim inducant, 79. l. 2. l. 2. co.

Febres 2. alio die quàm judicatorio desinent recidivam metuere oportet, 80. sec. 2. l. 2. co.

Qui circa initia tenuiter febricitantes, ad judicationem cum capitis pulsatione, & urina tenui ingravescent, eos mentis emotione et insuper pervigilio corrumpi, nihil mirandum est, 81. sec. 2. l. 2. co.

In cathelethoribus & suspirosis, febris postea acuta cum præcordiorum contensione perfurgetur, magnam circa aures expectare tumorem oportet, 107. sec. 2. l. 2. co.

In pueris febris acuta cum alvi suppressione & pervigilio, calces veluti jactare, ac colorem mutare, & ruborem contrahere, convellere minatur, 109. sec. 2. l. 2. co.

Qui per accessiones transiunt, & exundant, ii malignè habere judicandi sunt, sec. 2. l. 2. co.

Febres assidue, quæ 3. quoque die intendunt, ex periculum inducunt, 116. sec. 2. l. 2. co.

Si quibus aliquando febris intermiserit, periculum abesse significat, 117. sec. 2. l. 2. co.

In febribus longis, aut tubercula, aut ad articulos dolores præsentant, quos neque tam cito emere fieri existimandum est, 118. sec. 2. l. 2. co.

D 4

Febres lipyriæ, non nisi per choleram effusa bile solvantur, 120. sec. 2. l. 2. co.

Qui in febribus tertianis ingravescent dolores tertianarum naturam assumunt, & sanguinis grumos per secessum egerunt, 122. sec. 2. l. 2. co.

In febribus, venæ quæ est in cervice pulsatio & dolorem ad intestinorum difficultatem inducit, 124. sec. 2. l. 2. co.

Si venæ temporum in febribus pulsant & facies bene habita fuerit, absque præcordiorum mollitie, longum fore sperare oportet, qui nec sine liberali sanguinis ex naribus profusione, aut si igitur, aut convulsione, aut coxendiculi dolore desinet, 128. sec. 2. l. 2. co.

Alvus in febre ardente affatim prorumpens, mortis periculum adfert, 129. sec. 2. l. 2. co.

Febris ardens ex laborioso ventris dolore, perniciem minatur, 130. sec. 2. co.

In febre ardente laborantibus, si aurium sonitus cum visus hebetudine & ad nares gravitate accesserit, nisi sanguis ex naribus profluat, furiosa & vehemens mentis emotio metuenda est, 131. sec. 2. l. 2. co.

In febribus ardentibus tremores, delirio solvantur, 132. sec. 2. l. 2. co.

In febre ardente laborantibus cum aliqua corporis perfrictione, egestionibus aquæ similibus, & crebris, oculis periculum attenditur, tum verò præcipue, si alto stupore, quem catochon

catochon vocant, detineantur, 134. sec. 2. l. 2. co.

Febrem ardentem succedens rigor solvit, 135. sec. 2. l. 2. co.

Febres ardentes quæ recurrere solent, quatuor diebus de se significationem exhibent, deinde exudant in multis die 7. 11. 136. sec. 2. l. 2. co.

De febre ardente laborantibus dies 14. aut allevando, aut perimendo deveniunt, 137. l. 2. co.

Ex febre ardente, nisi qui circa autem fit abscessus suppuret, non admodum liberantur, 138. sec. 2. l. 2. co.

Quos febris detinet calidæ faciei rubore, & capitis vehementi dolore, in iis si venæ pulsant, sanguinis fluxus plerumque expectandus est; quos verò stomachi fastidia vexant, cum oris ventriculi morsu; & crebra spuatione, iis vomitio ad futura est: quibus autem ructus adsunt, flatu, ventu, sopitus cum inflatione, iis alvus exorbatur, 142. sec. 2. l. 2. co.

In febribus non intermittentibus, si partes externæ algeant, & internæ urantur, & sitiunt, lethale, aph. 48. sec. 4.

Quibus febribus assidua diutius cum securitate trahitur, si neque ex dolore, neque ex inflammatione, neque ex alia ulla manifesta causa contingat, in iis abscessum cum dolore & tumore, præcipueque ad inferiores partes



spirare oportet: maxime autem in his expectare abscessus oportet, qui trigessimum annum superarunt: cum vero in his considerandi sunt abscessus, ubi febris vigessimum diem præterierit, maioribus autem natu minus accidunt: si febres longo tempore detinent: quæ vero febres intermittunt incertoque ætate, ordine præcedant, ex autumno præcipue in quatuordecim, ferè transeunt, idque in his maxime qui trigessimum annum superarunt: per hyemem vero abscessus potius accidunt & rarius cessant, minusque recurrunt, 143. sec. 2. l. 2. co.

Quæcumque febris ex adverso respondet, nisi abscessum faciant, malignitatem denunciant, 145. sec. 2. l. 2. co.

Febres quæ neque diebus criticis, neque post apparentes solutionis notas dimittunt, repetere solent, 146. sec. 2. l. 2. co.

In febribus ex glandularum tumoribus dolores, morbi diuturnitatem prænunciant, 73. sec. 2. l. 2. co.

Tertiana exacta 5. aut 7. ad summum non circuitu terminatur, 148. sec. 2. l. 2. co.

Febricitare incipientibus, sanguinis stillationes cum sternutatione accedentes, & quod in urina desidet album 4. die visum, septimo solutionem afferre denunciat, 149. sec. 2. l. 2. co.

Qui per febres tenuiter exundant, cum capitis dolore, & alvo intercepra, ad convulsiones

siones proni sunt, 154. sec. 2. l. 2. co.

Qui per febres intermittentes, inæqualiter incalecentes, a vomu habent statibus dissentionem, paucæ transmittentem, his post judicationem lumborum dolore orto alvi præcipuum; qui autem ad manus contactum emarcescunt, torpore siti, ac corporis inconvalescenti iustissime vexantur, si alvo intercepra gravati exsolvantur. Interdum vero etiam præcedit in pedibus ambusta eadem convalescent, 150. sec. 2. l. 2. co.

Hyeme quantæ ferè in morbos acutos transeunt, 159. sec. 2. l. 2. co.

In febre acuta continens capitis dolor, cum gravibus aliis signis mortem minatur, quod si neque alia præterea signa mala sunt, & viginti dies superat aut sanguis ex naribus, aut puris effluxum, aut abscessus ad inferiores corporis partes denunciat, præcipue quidem in his qui nondum 35. annum attigerunt, fluxiones, in senioribus vero abscessus sperare convenit: si vero dolor vehemens circa frontem ac tempora affligat, fluxiones expectanda sunt, 160. sec. 2. l. 2. co.

Febrim initio si atra bilis sursum aut deorsum prodeat, lethale, 168. sec. 2. co.

Ex præcipitis morbis in febribus ardentibus maxime tubercula ad aures exoritur, ac nisi judicatorie solvantur & maturescant, aut sanguis e naribus profluxerit, aut crallum sedimentum urina acceperit, ægros intem-

munt. Prius verò huiusmodi tumores sub-  
dant ac conquiescunt, sed & insuper febres  
ipsas in considerationem adhibere convenit,  
num intendantur aut remittant, atque ita de  
tota re sententiam ferre. 207. sect. 2. l. 2. co.

Qui in febribus ad tactum nullam ardoris  
sentiam præ se ferunt, phrenitici sunt, idque  
magis si sanguis fluxerit, 128. sec. 2. l. 2. co.

In febre cum sudore, vocis & capitis do-  
lore, defectiones, si per se resolvuntur ægri,  
ac præter voluntatem excrementa demittan-  
tur, malumque remitti videantur, diuturni  
morbi metus est; in his subinde obortus ri-  
gor damnari non debet 253. sec. 2. l. 2. co.

Quibus ex rigore febris cum lassitudinis  
sensu adest, in his muliebrum profluvium  
expectare oportet. Quod si cervicis dolor  
prehenderit, sanguinis è naribus eruptionem  
fore spes est. 555. sec. 2. l. 2. co.

In febre ardente si tintillus aurium cum-  
visus habitudine fiant, & ad nares accedat  
gravitatis sensus, furiosa mentis emotio in-  
dicatur, 132. sec. 2. præd.

Febres quæ soporem lassitudinemve, in-  
ducunt, aut in quibus caligant ægri, insom-  
nia ac tenuibus sudoribus vexantur, malignæ  
sunt, 74. sect. 2. præd.

In febribus ardentibus cum aliqua summi  
corporis perficiatione, ac egestionibus aquæ  
similibus, & crebris, oculorum perversio, &  
distensio, malum significat, tum verò præ-  
cipue

cipue (si alto quodam stupore quem cat-  
ochon vocant) deprehensi detineantur, 81.  
sect. 2. præd.

Febribus & lassitudinis sensu detento, cum  
oculorum perversione, rigor perniciem mi-  
natur: atque in huiusmodi calibus soporari  
malum denunciant, 89. sec. 2. l. 2. præd.

Præcordiorum dolores in febribus cum  
loquendi impotentia, si sudore non solvan-  
tur, maligni sunt: in his dolores ad coxen-  
dices cum ardente febre atque alvus assatim  
prorumpens, perniciem ostentant. 90. l. 2.  
sec. 2. præd.

Quibus cum febribus voces post judica-  
tionem deficiunt, si tremore & sopore cor-  
repti intereunt, 91. sec. 2. l. 2. præd.

In febre cum sudoribus, vocis & capitis  
dolore defectiones; si per se resolvantur  
ægri, ac præter voluntatem excrementa de-  
mittunt, malumque remitti videatur, diutur-  
niorem morbum metuere oportet, in his  
novus subortus rigor damnandus non est,  
49. sec. 2. l. 2. præd.

Febricitanti cum sudore spura defluentia  
levia sunt & minime maligna, in quibus vi-  
dendum est num ad aliquos dies alvi ma-  
descant, quod equidem reor, animadverten-  
dum quoque est num his ad articulos aliquid  
abscessurum speres, 128. sec. 2. l. 1. præd.

Quibus ex rigore febres adsunt, cum las-  
situdinis sensu in iis muliebrum profluvium

expectare oportet, quod si cervicis dolor prehenderit, sanguinis è naribus eruptionem fore spes est, 142. sect. 2. l. 2. præd.

Si febris 3. quoque die vehementiores fiant nec intermittant, periculosa: quoquo modo autem intermiserint, periculo vacare significatur, aph. 62. sec. 7.

Quibus febres longæ, his tubercula in articulis aut labores fiunt, aph. 63. sec. 7.

In febribus non intermittentibus, si externa frigeant, interna vrantur, & febris adfit, est mortiferum, aph. 72. sec. 7.

In febre non intermittente si labrum, aut nasus, sicut oculus, aut supercilium pervertatur, si non videat, si non audiat, quidquid horum ægro debili acciderit, in propinquo mors, aph. 73. sec. 7. eandem. repetit sententiam 49. sec. 4.

Quibus per febres circa dentes lentor quidam obaascitur, iis vehementiores sunt febres, aph. 53. sec. 4.

Quibus per febres aures obsurduerint, iis sanguis è naribus profluens, aut perturbata alvus, solvit morbum, aph. 60. sec. 4.

Quibus febres cessant neque apparentibus signis solutionis, neque diebus judicatoriis, iis recidiva expectanda est: in longa febre, salutariter tamen affecto ægro, si neque ob inflammationem aliquam, neque ob ullam aliam evidentem occasionem dolor detinet, in hoc abscessus cum tumore, aut dolore ad articu-

atticulum aliquem expectandus maximèque in inferioribus locis: magis tamen & breviori tempore contingere solent huiusmodi abscessus iis qui trigessimum annum non attigerunt, at statim in considerationem adhibenda sunt quæ ad abscessum spectant, si vitra 20. diem febris detinet, quæ tamen per longiores febres senioribus minùs contingunt: huiusmodi autem abscessum expectate convenit si febris continua fuerit, in quartana verò firmari debere; ubi inermiserit & errabundum in modumprehendit, & ita ad autumnum deducatur. Ut verò abscessus oriuntur in his qui triginta annis minores sunt, ita quartanæ potius annum agentibus trigessimum, aut senioribus. Scire autem convenit abscessus hyeme magis contingere, & tardius desinere, & minùs interò recurrere; si quis in febre non lethali dixerit caput dolere, aut tenebrosus quiddam ante oculos obversari, si etiam oris ventriculi morsus accesserit, biliosa vomitio aderit: quod si quoque rigor subortus fuerit, & inferiores præcordiorum partes frigidas habuerit, adhuc citiùs vomitio aderit. Si verò sub id tempus biberit quidpiam aut edierit, id quàm celerimè evomitur. Inter hos autem quibus 1. die dolor cœpit. 11. 4. & 5. die potissimum affliguntur, at 7. liberantur; quin etiam eorum plerique 3. die dolore vexari incipiunt, conflistantur autem maximè 5. ve-



rūm 9. aut 11. periculo defunguntur. Quā-  
verò 5. die dolore affligi cōperint, & reli-  
qua pro ratione prioribus respondeant, ad 14.  
diem iudicatur morbus. Ista autem viris quī-  
dem & mulieribus, in tertianis præcipuē  
contingunt. Iunioribus verò cū in ipsīs,  
rūm etiam magis in febribus peraffligis &  
legitimis tertianis. At quibus per huiusmo-  
di febrem caput dolet, & pro tenebris ante  
oculos apparentibus visus hebetudo conti-  
git, vibrantesque splendores observari vi-  
dentur, & pro oris ventriculi morfu, in præ-  
cordiis dextra aut sinistra parte contentio-  
quādam, neque cum dolore, neque cum in-  
flammatione suboritur, iis pro vomitu san-  
guinem ē naribus profūxurum expectandum  
est, potiūs tamen eo casu in juvenibus san-  
guinis fluorem expectato: iis verò qui 30 an-  
num attingunt & senioribus minis, & in his  
vomitiones expectabis. Pueris convulsionēs  
accidunt, si febris acuta fuerit, si venter non  
deiciat, si vigilant, perterreantur, plorēt  
assidue & color immutetur, & ex viridi pal-  
lidus, aut lividus aut rubor contrahatur.  
Hæc autem pueris quidem recens natis ad  
septimum annum vsque promptissimè adve-  
niunt. At grandiores pueri & viri non adeo  
per febres convulsionibus prehenduntur, ni-  
si vehementissimum & pessimum quoddam  
signum, ex his quæ in phrenitide fieri solent  
aduerit. Morituros autem & superfuturos

UENA

tum pueros, tum alios ex omnibus signis  
conicies, velut in singulis singula descripta  
sunt, qui verò superfuturos ex morbo, & mo-  
rituros, eōsq̃ue quibus pluribus diebus &  
quibus paucioribus perseverabit morbus,  
rectè prænoscere volet vires, excrementa  
& conditionem morborum vulgariter graf-  
fantium considerare debet, pag. 56. sec. 2.  
prænotio.

Febres acutas cum mentis perturbatione,  
in oris ventriculi dolore non bilioso, insania  
solvit, 550. sec. 2. l. 2. co.

In febribus ex glandularum tumoribus  
dolores, morbi diurnitatem prænantiant,  
73. sec. 2. l. 2. co.

Vide crism, convulsionem, lumborum  
dolores, tubercula, hæmorrhagiam, excre-  
menta, hypochondria.

#### FISTULA.

Ex fistulis maximè molestiam adferunt,  
quæ in cartilaginosis aut carne vacuis locis  
fieri solent, cava sunt, & longius excurrunt,  
assidueque manant, & in quarum osculo ca-  
runcula inest: facilius autem curantur, quæ  
in mollibus & carnosissimis locis, & non nervo-  
sis oriuntur, 511. sec. 2. l. 2. co.

#### FLATUS.

Flatum verò absque crepitu aut sono emit-  
ti, inter optima signa est; præstat tamen cum  
strepitu prodire quàm illic revolvī: quan-  
quam hoc pacto prodians dolorem & deli-

denunciat, nisi sua sponte id æger fecerit & fluxum emiserit, 465. sec. 2. l. 2. co.

Vide excrementa.

### FLUXIO.

In utero gerentibus saluberrimæ ad fluxiones malum denunciant, 537. sec. 1. l. 2. co.

Pregnantibus fluxiones cum serpentibus oris ulceribus, malo sunt, hæc convulsionibus, exolutionibus, postea perfrictionibus tentare celeriter calefiunt, 539. sec. 2. l. 2. co.

### FRIGIDUM.

Caput, pedes, manus esse frigidas, ventre & lateribus calentibus, mali morbi signum est, optimum vero totum corpus, æquè calidum & molle esse, 492. sec. 2. l. 2. co.

Si per sanitatem hycmis tempore lumborum frigiditas & gravitas levi ex occasione orta sit, & alvi sit pressio, superiore ventre probè officio suo fungente, coxendicium, vel tenax dolor, urina stillatio fortè expectanda est, 487. sec. 2. l. 2. co.

Frigidum vero convulsionibus, tetanos, nigrores, & rigores febiles adfert, aph. 17. sec. 5.

Frigidum inimicum ossibus, dentibus, nervis, cerebro, dorso, medullæ; calidum vero amicum, aph. 18. sec. 5.

Quæ perfrigerata sunt excalefacere oportet, præterea quæ sanguinem profundant, aut brevis sunt profutura, aph. 19. sec. 5.

Præ-

Frigidum ulceribus mordax, cutem obdurat, tororem insuppurabilem facit, nigrorem inducit, rigores febiles, convulsionibus & tetanos creat, aph. 20. sec. 5.

Frigido vero his utendum, unde fluit, aut si nimis est sanguis, non quidem eodem loco, sed ad ea loca unde influit admoto: & si quæ partium inflammationes aut æstus agros ad rubrum sanguinemve colorem transierint recenti effusione sanguine, illis adhaerens adhaerito, nam inveteratus nigrescit. Erysipelas etiam non ulcerum juvat: si quidem exulceratum lædit, aph. 23. sec. 5.

### FRIGIDA.

Frigida veluti nix & glacies pectori inimica, sales movent, venarum ruptiones & distillationes efficiunt, aph. 14. sec. 5.

In morbis acutis frigus partium extremarum, malum, aph. 1. sect. 7.

Vide calidum & calorem.

### GENERANDI IMPOTENTIA.

Quæ frigidos & densos locos habent, utero non concipiunt, & quæ præhumidos habent, gravidari nequeant: exstinguitur enim in ipsis genitura, & quæ sicciores & æstuosos: nam alimenti defectu, semen corrumpitur, quæ vero ex utraque oppositione moderatam naturam sunt locorum temperationem, cæ fecunditate valent, aph. 62. sec. 5.

Par est de maribus ratio, aut enim propter corporis raritatem spiritus foras dissipatur,

ira ut genituram ejaculari nequeant : aut propter densitatem humor foras non profilit ; aut propter frigiditatem non incenditur : ut eo loci coacervari possit : aut propter caliditatem hoc idem ipsum usu venit, aph. 63. sec. 5.

## GIBBI.

Qui gibbi ex asthma aut tussi ante pubertatem sunt, statim moriuntur, aph. 46. sec. 6.

## GINGIVÆ.

Sanguis ex gingivis cum humecta alvo profluens, perniciem minatur, 241. sect. 2. l. 2. co.

Vide excrementum.

## GRAVIDA.

Mares dextra uteri parte, feminae sinistra magis gestantur, aph. 48. sec. 5.

Mulier gravida si marem gerit, coloratior est; si feminam, discolor, aph. 42. sec. 5.

Vterum gerentibus præcordiorum dolor malum denunciat, his etiam alvi euntes & rigore subinde corripitur, malo est. Venter si limosa expurger, in hujusmodi levius malum indicat, quæ ex his faciles partus habent, ex postea vehementer anguntur, 525. sec. 2. l. 2. co.

Quibus prægnantibus tibi opportunis faciei rubor exoritur, hunc distillationes è naribus anteverunt, 524. sec. 2. l. 2. co.

In uterum gerentibus capitis dolores cum sopore & gravitate malo sunt; forteque hujusmodi-

jusmodi naturæ unâ etiam convulsionibus quibusdam sunt obnoxie, 534. sec. 2. l. 2. co.

Prægnantibus fluxiones cum serpentibus oris ulceribus, malo sunt; hæ convulsionibus, exolutionibus, postea perfrictionibus tentare, celeriter calefiunt. Quin etiam prægnantibus molestiam, exhibent, qui circa tenue intestinum contingunt tumores, quales circa extremas uteri osculi oras, in rectæ cervicis spirationis difficultate detentis, eveniunt, quin etiam fortassis hujusmodi tumores, gemellorum partum prænunciant, aut fortè convulsiones, tumores hujusmodi indicant, 539. sec. 2. l. 2. co.

Vide dolores capitis, & fluxiones, prægnantem.

## GRAVITAS.

Ægrum quoque facile converti oportet, & dum surgit levem esse; at gravitas quæ totum corpus, vel manus ac pedes premit, vitiosa est. Quod si cum gravitate digiti quoque ac ungues lividi fiant, in propinquo mors est. at si omnino nigrescant minus quam liventes, periculum portendunt; verum tunc reliqua consideranda sunt, etenim si facile morbum sustinet æger, & aliud quiddam ex his quæ securitatem pollicentur se prodit, morbus in abscissum vergit, & denigratæ corporis partes decidunt, 495. sec. 2. l. 2. co.

Vide jacere.



## HÆMORRAGIA.

Qui statis temporibus sanguinem fundunt, si sicculosi sint, neque sanguinem profuderint, comitali morbo pereunt, 345. sec. 2. l. 2. coac. idem repetit, 131. lib. 2. sec. 2. prædict.

Vbi sanguis ex naribus effluxit, totius corporis perfrictio cum tenuibus sudoribus, morbi malignitatem denunciat, 342. sec. 2. l. 2. co. idem repetit, 126. l. 1. sec. 2. prædict.

Sanguinis è naribus stillationes, quæ undecimo die contingunt, molestiam afferunt, tum verò præsertim si bis sanguis stillarit, aut rursus nares stillare cœperint, 337. sec. 2. l. 2. coac. idem repetit, 148. l. 1. prædict.

In copiosa sanguinis fluxione aut singultus aut convulsio, malum denunciat, 339. sec. 2. l. 2. co.

Diuturnis in morbis parvæ apparentes sanguinis è naribus fluxiones, perniciem ostentant, 341. sec. 2. l. 2. co.

Qui suppressa alvo sanguinem ex naribus fundunt, & unâ cum sanguinis profluvio subinde rigent, iis alvus infirmorum levitate laborat & adurescit, aut tenues lumbrici ascarides dicti infestant aut utrumque, 344. sec. 2. l. 2. coac. idem repetit, 138. lib. 1. prædict. sec. 2.

Large sanguinis ex naribus eruptiones, per vim suppressæ interdum convulsiones denunciant, unde liberat venæ sectio 336. sec. 2. l. 2. co.

Qui-

Quibus cum sorditate, & torpore, paucus è naribus sanguis stillat, nonnihil molestiæ exhibet, iis vomitus & alvi perturbatio confertur, 335. sec. 2. l. 2. coac.

Quæ magnæ sunt in principiis sanguinis eruptiones, dum ægri vires recolligunt, alvos effundunt 335. sec. 2. l. 2. coac.

Ex sanguinis eruptionibus, vehementes diæ judicatoria obvenientes perfrictiones, pessimæ, 326. coac. idem repetit, 134. l. 1. sec. 2. prædict.

Sanguinis ex parte adversa profluvium malum est, velut si in lienis tumore ex dextra nare effluat, & circa præcordia idem spectari oportere existimandum est, 327. sec. 2. l. 2. coac.

Qui ex vulnere subinde rigentes sanguine profundunt, ii malignè habent, ac inter loquendum repente moriuntur, 328. sec. 2. l. 2. coac. idem repetit, 18. l. 1. prædict. sec. 2.

Quibus quinto die liberales sanguinis profusiones contingunt, & sexto novo oborto rigore corripuntur, septimo perfrictionibus tentati celeriter recalescent, iis alvi malè afficiuntur, 325. sec. 2. l. 2. coac.

Quibus sanguinis eruptiones perseverant, in iis temporis progressu alvus malè afficitur, nisi urina concocta prodierit, ac fortassis tale aliquid urina diluta denunciat, 332. sec. 2. l. 2. coac.

Mulierî menstruis præter naturam defi-

cientibus sanguis è naribus profluens bono est, aph. 33. sect. 5.

Sanguinis è naribus fluxus, in febre ardente 4. die obveniens, malo est, nisi aliud quidpiam bene ceciderit, quòd si die 5. contingat, minus adfert periculi, 133. sec. 2. l. 2. coac.

Quibus per febres sanguis aliunde effluerit largiter, iis dum sese recolligunt, alvi humescentes effunduntur, 133. sec. 2. l. 2. coac.

Quæ ex parte adversa & præpostere fiunt sanguinis eruptiones, malo sunt, velut in lienis tumore, si ex nare dextra effluat. Quòd circa præcordia eodem modò se habere expectandum est. Majus autem malum denunciat, si cum tenui circa frontem sudore istud contingat, 125. l. 1. sec. 2. præd.

Quibus sanguinis fluxus diu perseveraverit, in his temporis processu alvus malè habet, nisi urinae concoctionem præ se ferant, 133. l. 1. sec. 2. præd.

Quibus pauca sanguinis è naribus stillatio cum surditate & torpore obveniens, molestiam quandam exhibet, iis vomitio, & alvi perturbatio confert, 141. sec. 2. l. 1. præd.

Larga, vehemens & multa sanguinis è naribus eruptio, interdum ad convulsiones deducit, ex quo venæ sectio liberat, 145. l. 1. præd.

Liberalium ab initio sanguinis eruptionum cursum rigor sistit, 150. sec. 2. l. 2.

Quibus

Quibus per febres sanguinis undecumque exuperit copia, convalescentibus ventres humectantur, aph. 27. sec. 4.

A forti in ulceribus pulsu, hæmorrhagia malum, aph. 21. sec. 7.

Vide alvum; crissum, desipientiam, dolorem capitis & lumborum febres & excrementa.

### HEMORRHOIDES.

Melancholicis, & nephriticis, hæmorrhoides supervenientes bono sunt, aph. 11. sec. 6.

Diuturnas curanti hæmorrhoidas nisi vna quæpiam servetur, periculum aquæ inter ceterum vel tabis impendet, aph. 12. sect. 6.

Vide colorem, melancholiam, sopores & hydropes.

### HERPES.

Vide ætatem.

### HORRORES.

Crebri ex dorso horrores subinde locum commutantes graves sunt & difficiles. Laboriosam quippe urinae suppressionem minantur, his tenuiter exudare pessimum, & sec. 2. l. 2. co.

A sudore horror non bonum, aph. 4. sec. 7.

Qui subinde inhorrescunt, ex capite laborantes, tenuiter exudantes, ii malignè habent, 12. sec. 2. l. 2. co.

Qui subinde inhorrescunt, sæpe tenui sudore corripiuntur, difficili morbo laborant.

E

13. sect. 2. l. 2. coac.

Qui per sanitatem crebriù inhorrescunt, ii ex sanguinis fluxu purulenti evadunt, 16. l. 2. l. 2. co.

Vbi horror in malis subinde incidit cum difficultate spirandi, tabes denunciatur, 17. l. 2. l. 2. co.

Qui subinde inhorrescunt, ac incontinenti corporis jactatione, cum lassitudinis sensu & lumborum dolore conficiantur, iis alvi effunduntur, 19. sec. 2. l. 2. co.

Quibus vbi inhorruerint, judicatorij simul sudores contingunt, posttridie verò si horror repetierit & temerè pervigilent, iis fortè sanguinem erupturum sperare oportet, 24. sect. 2. l. 2. co.

Horror, anxietudo, oscitatio, vinum pariaque portione epotum solvit, aph. 56. sec. 7.

Horroris & lassitudinis sensus, capitis gravitas cum cervicis dolore, muliebres purgationes deiciunt, quòd si quid hujusmodi circa judicationem cum tussicula contingit, subinde tignorem adfert, 348. sec. 2. l. 2. co.

Vide febres lassitudinem.

### HVMIDA CORPORA.

Corporibus humida carne præditis præferenda fames est: nam fames siccatur corpora, aph. 59. sec. 7.

### HVMERI.

Vide dolores humerorum.

### HYEMS.

### HYEMS.

Vide tempus.

### HYSTERICA PASSIO.

In mulieribus, quæ uteri suffocationibus tentantur, idque sine febre, faciles convulsiones, quales quid etiam Doreadi contigit, 554. l. 2. sec. 2. co.

Mulieres quæ ab utero promptè strangulantur, idque sine febre, in convulsiones propense sunt, 119. in præd.

Mulieri hysterica, aut difficulter parienti, sternutamentum superveniens, bonum, aph. 35. sec. 5.

Vide convulsionem.

### HYDROPS.

Aqua inter cutem quæ ex acuto morbo coepit, molestiam ac perniciem adfert. Oritur verò ferè & à laterum inanitate, vel à jecore, sed vbi à laterum inanitate ortum contrahit, pedum tumor, & alvi diuturnus fluor consequitur, qui neque ventrem emollit, neque lumborum auxilium tumorem solvit, at quibus è jecore aqua inter cutem proficiatur, ii promptè etiam tussi vexantur, pedes intumescunt, & alvus non nisi dura & ægrè perdit, tumoresque modò dextra, modò sinistra parte oriuntur, ac rursus desinunt, 452. sec. 2. l. 2. co.

In hydrope sicca vrina stillatim effluens malum denunciat, mala quoque est quæ exigua habet sedimenta, 453. sec. 2. lib. 2. co.



Hydropicis succedentes morbi comitialis  
offensiones, perniciem adferunt, pravis in-  
vicem succedentibus signis; & alvos hume-  
stant; 454. sec. 2. l. 2. co.

Aqua inter cutem laboranti cum febre  
vrina pauca, & conturbata, perniciem de-  
notat; 456. sec. 2. l. 2. co.

Aqua inter cutem initio aquosum alvi  
profluvium absque cruditate exortum, mor-  
bum solvit; 457. sec. 2. l. 2. co.

Vbi hydrops siccus de se significationem  
præbet, tormina ad tenue intestinum incum-  
bentia malum denunciant; 458. sec. 2. l. 2. co.

Ex aqua inter cutem morbus comitialis  
perniciem adfert; 459. sec. 2. l. 2. co.

Aqua inter cutem quæ curationi cessit,  
vbi recurrit, spem tollit; 460. sec. 2. l. 2. co.

Aqua inter cutem laboranti, aqua quæ in  
venis est, ad alvum erumpente solvitur mor-  
bus; 461. sec. 2. l. 2. co.

Quos ex aliqua ægritudine hydrops cir-  
cumvenit, iis alvi resiccata caprinis sterco-  
ribus similia deiciunt, cum mucosa cliqua-  
tione, neque laudabili vrina, præcordiorum  
autem distentiones, ventris dolores ac ru-  
mores, & circa laterum inanitates ac spinæ  
musculos dolores incidunt, febres quoque  
sitis & tussis sicca comitantur, & ad morio-  
nes spirandi molestia; & crurum gravitas  
cibos etiam averlantur, paucisque sumptis  
expleantur; 481. sec. 2. l. 2. co.

Aqu

Aqua inter cutem vitio, cui leucophleg-  
matis nomen est, laborantes, alvi proflu-  
vium sedat, animi abjectiones cum silentio  
& ab hominibus solitudines ferè eos confu-  
ciunt; 482. sec. 2. l. 2. co.

Hydrope detentis, si aqua è venis in ven-  
trem confluerit, solvitur morbus; aph. 14.  
sec. 6.

Quicumque empyi, aut hydropici, vrun-  
tur aut secantur, si pus aut aqua vniuersim  
effluerit, omnino moriuntur; aph. 27. sec. 6.

Hydropicis, tussis si superveniat, malum;  
aph. 35. sec. 6.

Quibus jecur aqua repletum eruperit in  
omentum; his venter aqua expletur atque  
moriuntur; aph. 55. sec. 7.

Qui aqua inter cutem detentus est, & ser-  
vari vult, cum robustis visceribus & conten-  
tis viribus esse convenit, simulque suapte  
natura facile concoquere, ac bene ispirare, si-  
ne dolore esse, totumque corpus aqualiter  
calere, neque extremis partibus esse colli-  
quesfactum. Præstat namque potius extrema  
tumefacta esse, etsi optimum est nihil ho-  
rum adesse. Verum tum mollia, tum graci-  
lia, extrema esse oportet, ventrem contactu  
mollem. At neque tussim neque sitim ad-  
esse convenit, neque linguam, cum alias  
tum ne à somno quidem, quod admodum  
fieri assolet, inarescere. cibos autem suavitè  
assumere, ac vbi quis abundè comederit, ni-

E. 3.

hil affligi. Ventrem quoque medicamentis quidem celeriter moveri, alias vero mollior & figurata excernere, vrisam in transitu pro instituta victus ratione, & vinorum mutatione, mutationem sentire. Defatigationem facile sustinere nec lassitudine sentire, atque sic quidem in totum hominem se gerere optimum, ut quam securissimè convalescat. Sin minus, horum ut plurima habeat, sic enim spes forte ut evadat, in quo verò nihil horum inest, sed contraria sublequuntur, in eo spem tolli animadvertendum est. Et cui ex his quæ in aqua inter cutem laborante probavimus, pauca affuerint, parum relictum esse spei: at ne in his cui multus sanguis supra infraque proruperit, prætereaque febris accesserit, aqua impletur, magnus metus est: & huius generis aqua intercutis brevissimi est temporis & inter inevitabiles numeranda, idque alteri denunciare oportet. Quibus autem tumores magni suborti desinunt, rursusque assurgunt, hi potius superiunt quam qui ex sanguinis eruptione complentur. Fallunt tamen ægros huiusmodi hydropes, cum eos relictis medicis in exitum præcipitent, pag. 95. lib. 1. sect. 2. præd.

Si leucophlegmatia detento fortis diarrhoea supervenerit, morbum solvit, aph. 29. sec. 7.

Si hydropicum tussis habeat, desperatus est.

est, aphor. 47. sect. 7.

Aqua inter cutem quæ ex acutis morbis oritur, mala; nam neque febris liberat, vehementesque dolores excitat, & lethalis est. Oritur autem ferè ex laterum inanitate, & lumbis partiumque ex jecore; quibus igitur ex laterum inanitate & lumbis initia ducuntur, his pedes intumescunt, & longa alvi profusio deriunt, quæ neque dolores ex laterum inanitate ac lumbis tollunt, neque ventrem molliorem efficiunt. At quibus à jecore aqua inter cutem ortum ducit, his tussis, & tussendi cupiditas adest. Sed nihil effatu dignum expuunt, pedesque intumescunt, ac venter non nisi dura ægreque egerit, & circa alvum tumores fiunt, qui partim dextra, partim sinistra parte oriuntur, & desinunt. Caput autem & manus, & pedes frigere, venter, & lateribus calentibus, malum denunciat. At corpus totum æqualiter calidum esse, ac molle, optimum, ægrium quoque facile converti oportet, & cum sese attollit levem esse, quod si gravis esse videatur, cum reliquo corpore, tum manibus & pedibus, maiori cum periculo est, præter gravitatem verò si vngues, & digiti livescant, mors confestim expectanda est. At omnino nigri tum digiti, tum pedes, minus quam liventes perniciosi sunt: sed alia quoque signa in considerationem adhibenda: etenim si facile malum ferri videatur, & præter hæc

aliud quoddam ex salutaribus signis adfuerit, morbum ad abscessum converti sperandum, ita ut æger quidem morbo superesse, & partes corporis denigrata decidere debeant. Testes autem & pudenda ubi furium contrahuntur vehementes, dolores & mortis periculum denunciant, 47. præno.

Albæ pituitæ aqua intercus supervenit, aph. 74. sec. 7.

Qui aqua inter cutem detentus est, & servari vult, cum robustis visceribus & contentis viribus esse convenit, simulque suapte natura facile concoquere, ac bene spirare, sine dolore esse, totumque corpus æqualiter calere, neque extremis partibus esse colligatum. Præstat namque extrema potius tumefacta esse, etsi optimum est nihil horum adesse. Verum tum mollia, tum gracilia extrema esse oportet, ventrem contactu mollem. At neque tussim neque sitim adesse convenit, neque linguam, cum alias, tum ne à somno quidem, quod admodum fieri assolet, inarefcere, cibos autem suaviter assumere, at ubi quis abundè comederit, nihil affligi. Ventrem quoque medicamentis quidem celeriter moveri, alias verò mollia & figurata excernere, urinam in transitu pro instituta victus ratione, & vinorum mutatione mutationem sentire, defatigationem facile sustinere, nec lassitudinem sentire, atque sic quidem in totum hominem se gerere optimum

timuni, ut quam securissimè convalescat. Siminibus horum ut plurima habeat, sic enim spem fore ut evadat. In quo verò nihil horum inest, sed contraria subsequantur, in eo spem tolli animadvertendum est, & cui ex his quæ in aqua inter eum laborante probavimus, pauca affuerint, parum relictum est spei. At ne in his quibus multus sanguis supra infraque præterperit, prætereaque febribus accesserint, aqua impletur, magnus metus est, & huius generis aqua intercus brevissimi est temporis, & inter inevitabiles numeranda, idque alteri denunciare oportet: quibus autem tumores magni suborti desinunt, rursusque assurgunt, hi potius supersunt quam qui ex sanguinis eruptione complentur: tollunt tamen ægros huiusmodi hydropes cum eos reliquis medicis in exitum præcipiunt, 96. præno.

### HYPOCHONDRIA

seu præcordia.

Præcordia in tumorem sublata, omnibus quidem mala sunt; præsertim verò his, qui ex longo intervallo tabidi existunt, 442. l. 2. l. 2. co.

Ex his qui cum pernicio consumpti sunt, nonnulli ante mortem subinde rigoribus corripiuntur, 443. sec. 2. l. 2. co.

Præcordia optima quidem quæ dolore vacent, mollia sunt & æqualia, tum dextra, tum sinistra parte, in cula verò, aut dolentia,



aut intenta, aut inæqualiter affecta dextra parte ad sinistram, hæc omnia animadvertenda sunt. Quod si etiam pulsus in præcordiis insint, perturbationem aut delirium indicant. Verùm etiam eorum oculos intueri oportet: si namque oculi crebriù moveantur, infania expectanda est. At tumor in præcordiis durus & dolens, pessimus quidem ubi tota præcordia occuparit, sin verò altera parte sit, minori cum periculo sinistra, hujusmodi autem tumores circa principia quidem mortem brevi tempore significant. Quod si neque intra vigesimum diem febris quiescat, neque tumor subsidat, ad suppurationem revertitur: his autem primo circuitu etiam sanguinis è naribus fluxus contingit, valdeque juvat: verùm eos interrogare oportet, num capite dolent, aut obrusam oculorum faciem sentiant. Quod si quid ex his acciderit, eo rem tendere sciendum, in junioribus rariù neque dum 35. annum attingentibus sanguinis eruptio magis expectanda est. Molles autem tumores & doloris expertes digitisque cedentes, longiores indicationes faciunt, illisque minus graves sunt. Quod si intra dies sexaginta, neque febris cesset, neque tumor subsidat, fore suppurationem hoc loco, & reliquo ventre eodem modo significat. Itaque tumores dolentes, duri & magni, periculum mortis intra paucos dies affore significant. Molles verò & minimè dolentes quique

quique digito pressi cedunt, illis diuturniores esse solent, ac ventris tumores minimè abscedere nati sunt, quàm qui in præcordiis oriuntur, minimè verò qui infra umbilicum in pus vertuntur, sed ex superioribus locis sanguinis eruptio magis expectanda est. Longorum verò omnium in his regionibus tumorum suppurationes in considerationem adhibendæ. Suppurationum autem quæ inde proveniunt, ea observatio facienda est, quæ quidem foràs vertantur, optimæ sunt, ubi parvæ sunt. At quàm maximè foràs feruntur, & in acutum tendunt, ac pessimæ verò quæ magnæ sunt, & late minimeque in mucronem attolluntur, quæ intro erumpuntur optimæ, ubi nihil cum externa sede communicant, in sese contrahuntur, nullo dolore afficiunt, totaque regio externa unius coloris apparet, pus verò optimum est album & æquale & læve & quàm minimùm graveolens: huic autem contrarium pessimum pus, 47. sec. 2. præf.

Ex alvi suppressione sublata præcordia, malum denunciant; præcipuè verò in his, qui ex longo intervallo contabescunt, & quibus alvi humectantur, 301. sec. 2. l. 2. coac.

Quibus elata hypochondria murmurant, lumborum superveniente dolore, alvus humectatur, nisi infernè flatas erumpant, aut urinæ multitudo prodeat, atque hæc in febribus, aph. 73. sec. 4.

Præcordia verò sine ullo doloris sensu æqualiter mollia esse oportet, ac inflammatione tentata, aut inæqualiter affecta, aut dolore vexata, non contemnendæ agnitionis notas præ se ferunt, 279. sec. 2. l. 2. coac.

Præcordia verò tumida, dura ac dolentia, si in univèrsum sint afflcta, maximum quidem malum portendunt; si verò altera parte duntaxat, ex sinistra minùs periculum impendet, ceterùm per exordia quidem mortem prope affore ista denunciant, ubi verò 10. diem superarint, & febris detinuerit, in pus vertuntur, atque intrà primum circuitum istud contingit, ac sanguis è naribus fluxus plurimum conducit, etenim plerumque his caput dolet, & oculorum acies habescit, atque tunc sanguinis eruptio magis expectari debet, idque circa quintum & trigèsimum ætatis annum. In senioribus verò non item. 280. sec. 2. l. 2. co.

Præcordia sublata subsistente alvo, malum denunciant; præcipuè verò in his qui ex longo intervallo contabescunt, & quibus alvi defluunt, 287. sec. 2. l. 2. co.

Quibus præcordia inflammatione tentantur & pus colligant, si sub mortem nigra dejiciunt, 288. sec. 2. l. 2. co.

Præcordiorum contentio cum sopore & incontinenti corporis jactatione, capitis dolore vexato, tubercula ad aures excitat, 289. l. 2. co.

Præcordia

Præcordia non mollia & facies bene habita non nisi liberali sanguinis ex naribus profusio, aut convulsione, aut coxendicum dolore solutionem accipiunt, 296. sec. 2. l. 2. co.

Ex præcordiorum tumore, biliosis spiratio magna & febris acuta, tubercula ad aures suscitât, 290. sec. 2. co.

In præcordiis ex longo intervallo afflctis & gravolente alvo, subnatum ad aures tuberculum mortem adfert, 292.

In præcordiorum dolore cum aliquo murmure, succedens lumborum dolor in febribus, alvos plerumque humectat, nisi status eruperit, aut urinæ copia prodierit, 291.

Quos derepente absque febre præcordiorum aut oris ventriculi dolor, aut crurum, & inferiorum partium affligit, alvûsque intumescit, venæ sectio, aut alvi fluxus solutionem adfert, iis febricitare noxium est. Nam & longæ & vehementes febres subnascuntur, ac tussis, & spirandi difficultas atque singultus fiunt. Quibus in solutionem spectantibus, vehemens coxarum dolor, aut crurum, aut purulenta spontatio, aut oculorum orbitas succedit, 294. sec. 2. co.

Quibus ardore confictis, satietate & alto stupore (quem catochô dicunt) detentis, præcordia variant, & in contrarias subinde affectiones transmutantur, ac venter in tumorem præter naturam sublatus est cum ci-

borum interceptione, & tenui circa caput oborto sudore: in his animadvertendum est, num sit concitatus & magnus spiritus, aut genitura similis excretio accadat, singultum prænuntiet, aut etiam ex alvo spumantia proditura sint; eos splendens quiddam aut coruscans per urinam redditum iuvat; alvus verò in his etiam commovetur, 92. sec. 2. l. 1. præd.

Præcordiorum contentio cum capitis gravitate & surditate, ad hæc quæ oculorum aciem perturbant, sanguinis eruptionem naribus prænuntiant, 147. sec. 2. l. 2.

#### IACERE.

Optimus ille quidem jacentis habitus, quem sanus aliquis usurpare consuevit. Supinum verò jacere cruribus porrectis, probari non potest. Idque deterius ubi subinde deorsum ad pedes protahitur. Exitiosum est ubi hiat, aut assidue dormit. Aut ubi supinus jacet cruribus vehementer contractis ac reductis. Pronum autem jacere ei qui non consuevit, delirium ac circa ventrem dolores portendit. Quod si pedes & manus nudæ, neque vehementer calæ ei subest, & crura dispergit, mali morbi signum est, angorem namque portendit. Vbi verò residere vult æger, malum quidem indicium in acutis morbis, sed longe pessimum in pulmonum, & laterum affectibus. Nocturnum dormiendum, interdum vigilandum, contra verò malum, minimum.

num autem offendit. Si quis matutino tempore ad tertiam diei partem dormiat, qui vero ab hoc tempore somnus est, males. Pessimum tamen est si somnus neque noctu neque interdiu accedit, id enim ob dolorem laboremque accidit, vel delirium fore significatur, 497. sec. 2. l. 2. co.

Ægrum à medico in latus dexterum aut sinistram recumbentem deprehendi oportet, manibusque & cervice, ac cruribus paululum reductis, totoque corpore molliter posito. Hic enim ferè jacentis est habitus. Is autem habetur optimus decubitus, qui bene valentium similis est. Supinum verò jacere, manibus, cervice & cruribus porrectis, minus bonum. Quod si pronus ad pedes delecto delabatur, magis formidandum. Vbi verò pedes nudos, neque admodum calidos habere comperitur, & manus, cervicem, & crura inæqualiter dispersa & nuda, malum. Anxietatem enim indicat. Lethale quoque & hianti ore assidue dormire, & ubi supinus jacet cruribus valde contortis & implexis. At in ventrem jacere ei qui per bonam valitudinem ita dormire minimè consuevit, delirium, aut partium circa ventrem dolorem indicat. Ægrum verò residere velle in ipso morbi imperu, pravam quidem in omnibus morbis acutis & pulmonum inflammatione laborantibus, pessimum, ex l. præd.



## IACTATIO.

Corporis iactationes, & incontinentiæ cum persfrictione, pessima, 2. sec. 2. l. 2. co.

In præcipitibus malis corporis morio, iactatio, ac turbulentus somnus, nonnullis convulsionem portendit, 32. sec. 2. l. 2. co.

Corporis iactationes & incontinentiæ in febre cum persfrictione & superiorum partium tenui sudore, phrenitim denuntiant (quod in Aristagora compertum est) atque etiam perniciem. 27. sec. 2. præn.

Considerandum est in æstuabundis & corporis iactatione citra vomitum, & lumborum dolorem, confictatis ægris, si audacter desuperint, num nigra per feceslium proditura sint, 87. l. 1. præd.

Qui in somniis vexantur cum subita corporis iactatione & inquietudine, iis sanguinem erupturum sperare oportet, idque præsertim si non antea quid proflexerit. Animadvertendum vero num id post horrois sensum contingat, 136. sect. 2. præd.

Corporis iactatione & inquieta iactatione confictati, citra vomitum ingravescentes male habent, atque etiam qui vellicantur citra vomitum, 557. sec. 2. l. 7. co.

Vide febres.

## ICTERVS.

Quibus per febres morbus regius supervenerit ante diem septimum, malum, aph. 62. sec. 4.

Quibus

Quibus per febres morbus regius die 7. aut 9. aut 11. aut 14. supervenerit, bonum, nisi dextrum hypochondrium durum sit: alioquin minimè bonum, aph. 64. sec. 4.

Regio morbo laborantibus jecur durum fieri, malum, aph. 42. sec. 6.

Morbus regius si ante diem 7. accesserit, malum significat, 7. autem 9. 11. ac 14. iudicationem adfert, dum præcordia non inducet. Quod si secus contingat, res in dubium vertitur, 121. sec. 1. 2. co.

In morbo regio affectis, nec admodum sentientibus, quibus singulus adest, iis alvus effunditur, fortè verò etiam supprimitur, atque hi cum virore palleseunt, 490. sec. 2. l. 2. co.

In spirituosus & anhelatoribus morbo regio laborantibus & febre acuta, cum præcordiorum duritie & tumore, si corporis summa præfigerentur, in gnorum circa aures abscessuum exortum fortassis expectare oportet, 164. sec. 2. l. 2. præd.

Vide morbum, colorem.

## I E C V R.

Quibus purulentum jecur adurit, si purum pus effluerit & album, salvi sunt. In tunica enim ipsius pus continetur, si verò qualis amutca profuat, intereunt, aph. 45. sec. 7.

Quibus jecur vehementer dolet, iis febris superveniens solvit dolorem, aph. 52. sec. 7.

Vide dolores jecoris.

### ILEVS:

Quibus à stranguria ileus supervenerit, intra 7. diem moriuntur, nisi febre superveniente copiosa urina fluxerit, aph. 44. se. 6.

Ab ileo vomitus & singultus, & desipientia, & convulsio, mialum, aph. 10. sec. 7.

### INSANIA.

Ex insania, in raucedinem cum tussi sit excessio, 44. sec. 2. l. 2. co.

Insanientibus accedens convulsio oculorum aciem retundit, 48. sec. 1. l. 2. co.

Vehementes mentis emōtiones silentes, absque quiete, oculis quoque versum intuentes, spiritum efflantes, perniciem minantur, diuturnas verò faciunt partium resolutiones. Quin etiam vehementer insaniunt hoc modo affecti. Quibus autem eum ventris perturbatione hujusmodi affectus ingravescunt, iis nigra per alvum ad judicationem prodeunt, 486. sec. 2. l. 2. co.

Desipientiæ cum voce stridula & linguæ convulsione tremula, voces quoque ipsæ tremulæ mentis vehementem alienationem significant, in his durities aut asperitas perniciem minatur, 19. sec. 2. præd. idem repetit, 99. se. 7. co.

Desipientiæ quæ circa necessaria fiunt, pessimæ, & quæ in his ingravescunt, exitium portendunt, 98. sec. 2. co.

Vehementi insania detenti, tremuli, cum crebra

crebra sputatione, metus est ne phrenitici evadant, 94. sec. 2. co.

Desipientiæ quæ jam admodum fractis & debilitatis viribus succedunt, pessimæ sunt, non secus ac Thrasynonti, 8. l. 1. præd.

Dementiæ in quibus tremuli sunt ægri, obscure aut vix quidem desipere videntur, aut aliquid investigantium more sensim contrectant & palpant, miro quodam modo phrenitum prænunciant, non secus ac Didymarcho Coo contigit, 34. sect. 2. l. 2. præd.

Quæ præter vacuationem sunt impotentia, neque vacuatione existente, perniciem intentant, 40. l. 1. præd.

Vide desipientiam, & delirium, dolores capitis, phrenitum.

### INSOMNIA.

Qui insomniis vexantur cum subita corporis jactatione & inquietudine, iis sanguinem è naribus erupturum sperare oportet: inque præsertim si quid antea profluxerit, animadvertendum verò num in modice perfrigeratis id post horroris sensum contingat, 111. sec. 2. l. 2. co.

### INTESTINA.

In tenuibus intestinis si quod dissectum fuerit, non coalescit, 503. sec. 2. l. 2. co.

In tenuioris intestini morbis graveolentibus, cum febre acuta, & ex longo intervallò tumefcentibus præcordiis, qui ad aures

oboriuntur abscessus, mortem afferunt, 15 & lib. 1. præd.

### IMPETIGINES.

Impetigines, lepræ, albicantelque vitiligines, si juvenibus quidem aut pueris horum aliquid contingat, aut sensum prodiens, diuturnitate temporis augetur in iis quidem ex pustulæ abscessus esse minimè existimanda sunt, sed morbi. At quibus ex his aliquid subito multumque contingit, id certe abscessus dici possit. Oriuntur autem albicantes vitiligines, & maximè quidem lethalius morbis, velut quæ tabes dicitur. Lepræ verò & impetigines ex his qui ab atro bile fiunt. Ex quibus quæ valde juvenibus contingunt, & recentissima quæque sunt, & facilius curationem recipiunt, tum quæ in summè mollibus & carnosius corporis partibus nascuntur, in fine lib. 2. præd.

### IUVENTVS.

Vt tradenda juvenute liberalis & speciosa corporis magnitudo, ita senectuti gravis & parvitate deterior, aph. 54. sect. 2.

Quibus alvus est humida juventam quidam agunt facilius quam qui eandem siccam habent, sed senectute difficilius defunguntur. In ipsis siquidem senescentibus ferè resiccatur, aph. 53. sect. 2.

### LABOR.

Vide consuetæ.

LA-

### LABRVM.

Contractum labrum biliosæ alvi perruptionem denunciat, 240. sect. 2. l. 2. co.

Vide oculum.

### LAC.

Si neque prægnans neque puerpera est, & lac habeat, ei menstrua defecerunt, aph. 39. sect. 5.

Mulier partum gerenti si lac è mammis copiosè fluat, foetum imbecillum significat: si verò firmæ solidæque mammæ fuerint, valentiorè conceptum indicant, aph. 52. sect. 5.

Lac præbere capite dolentibus, febriculosis, & quibus hypochondria elata, aut mutantia, & sticulosus, malum; malum item quibus biliosæ dejectiones, febres acutæ, & copiosa sanguinis vacuatio facta est. Convenit verò tabidis non admodum valde febricitantibus, & febribus longis & languidis, si nullam ex supra dictis signis adfit, & præter rationem extenuatis, aph. 64. sect. 5.

### LACRYMÆ.

Vide oculos.

### LATVS.

Quibus læus in tumore sublatus est ac calidius existit, ubi in alterum latus incumbit, pondus quoddam suspensum esse videtur, iis pus vna in parte collectum est, 428. sect. 1. l. 2.

Vide dolorem lateris, pleuritidem.



## LASSITUDO.

Spontaneæ lassitudines, morbos præsentant, aph. s. sec. 2.

Lassitudine laborantes cum horrore, iudicii modò leviter exudantes, celeriter ad calorem revocati, malè habent; tum verò præsertim si ista insuper sanguinem è naribus stillarint. Circa hæc aurugine admodum fœdatis, & largius colorati moriuntur, iisque album alvi recrementum prodit, 36. sect. 2. l. 2. co.

Lassitudine confictati ægri linguæ tuos & alto stupore (quem catochum vocant) detenti, malè habere significatur, 45. sec. 2. co.

Delassati ægri caligine obducti pervigiles, & sopore detenti, cum tenui sudore recalescentes, malè habent, 35. sec. 2. co.

Vide gravitatem, febres.

## LETHARGVS.

Qui lethargo aut veterno confictantur, & manibus tremunt somnolenti, malè colorati, tumidi, pulsus habent tardos & lentos, ac oculorum genas inferiores sublatas, sudores superveniunt, alvi quæ subrumescunt, impotentes sunt, ac biliosa effundunt. Quod si resiccatæ fuerint urinae alvi quæ recrementa clam prodeunt, urinae quales in veterno solo genere redduntur, neque potum, neque aliud quicquam postulant. Mentis verò compotes facti, de cervicis dolore conquiescunt, ac incertus sonitus per aures impetu ferri

ferri sentiunt. 139. sec. 2. l. 2. co.

Qui verò ex lethargo evadunt, magna ex parte pus intus colligunt. 140. sec. 2. l. 2. coac.

## LIEN.

Quibus lienes magni, iis gingivæ vitiantur, & os graveolet. Quibus autem lienes magni, neque sanguinis eruptiones contingunt, neque os graveolet, in tibiis ii mala ulcera habent, & nigras cicatrices, quod si manifestus quispiam adfuerit faciei abscessus, aut vox gravis sit, aut dentium dolor, iis sanguinis eruptionem ex naribus fore spes est. At qui partes eas quæ sub sunt oculis vehementer sublatas habent, magnos habere lienes comperies. Quod si pedum quoque tumores adsint, ex aqua etiam laborare videbuntur. Sed & ventrem & lumbos præter hæc inspicere oportet, 109. l. 2. sec. 2. prædict.

Vide dysenteriam.

## LIENOSVS.

Vide lienteriam.

## LIENTERIA.

Læviter autem intestinorum, assiduæ quidem & multo tempore perseverantes, ac omnibus horis & cum strepitu & sine hoc exturbate, & similiter noctu & interdiu assigentes, si quod excernitur valde crudum est, aut nigrum, & læve ac mali odoris, ex quidem omnes malæ sunt. Nam & sicim exhibent, neque potionem per urinam red-

dunt, quod in vesicam non descendat, os exulcerant, & eorum faciei ruborem, ejusque cutis vitia omni colorum genere distincta (nephelidas vocant) excitant simulque ventrem quasi fermentatam, sordidum, ac rugosum, efficiunt, ex quibus aut cibum capere, aut deambulare, ad res obeundas, nequeunt. Morbus hic seniores gravissime infestat, quin & viros vehementer affligit, ceteras vero ætates multo minus. At qui eas ætates quas ab hoc morbo male affici diximus, non attingit, & paucissima signa habet quæ mala esse scripta sunt, is securissimè constitutus est. Curationem autem postulat hic morbus, quoad & vrina pro potionis modulo feratur, corpusque cibos ingestos sentiat & viriosum cutis dolorem deponat 105. l. 2. sec. 2. co.

Dysenteriam, aqua intercutem aut intestinorum lævitas excipit, & moriuntur, aph. 43. sec. 6.

In intestinorum lævitate laborantibus, cum sævissimis vlceribus, dolores ex intestinorum cruciati soluti, articulorum partes attollunt, ac ex hujusmodi tenues squamæ cum rubore & pustulis fiunt. In post multos ac tenues sudores, velut acceptis ex flagris vicibus, rubescunt, 467. sec. coac.

Intestinorum levitates cum spirandi difficultate, & pectoris morfu, ad tabem tendunt, 469. sec. 2. co.

Loa;

Longis intestinorum lævitatibus laborantes, vna cum sævissimis vlceribus, intestinorum cruciati, & dolore, iis solutis intumescunt. His inuiper exortus rigor, inale est, 468. sec. 2. co.

In diuturna lævitate intestinorum si ructus acidus superveniat, qui prius non extiterit, bonum est signum, aph. 1. sec. 6.

Qui lienosi difficultate intestinorum corripuntur, iis supervenientem longam dysenteriam, aqua intercutem aut intestinorum lævitas excipit, & moriuntur, aph. 43. sec. 6.

Lienosis difficultas intestinorum superveniens bono est. aph. 48. sec. 6.

Vide excrementa, hydropem, alvum, tenebrinum, dysenteriam.

### LINGVA.

Lingua circa initia quidem horrida, in eodem verò colore persistens, procedente verno tempore, ubi exasperatur, livescit, finditur; mortem denunciat, quod si admodum pigrescat, 14. die judicationem promittit: periculi autem maximè plena est nigra ex virore pallescens, 229. sec. 2. l. 2. co.

Linguae bisulcum velut saliva alba obdutum, febris remissionem indicat, eo quidem quod agnotum est crasso existente, eodem die, si verò tenuis fuerit postridie, perinde quoque si adhuc tenuis fuerit, eadem etiam significatio est, si hæc circa summam linguæ contingant, minus tamen firma, 230.

F

sect. 2. l. 2. coac.

Lingua tremula cum narium rubore & alvo humecta, si reliqua quæ sunt circa pulmonem nullam indicationis significationem præ se ferant, malo est, ac celeres perniciosas purgationes denunciat. 231. sectio-  
ne 2. libro 2. coac.

Lingua præter rationem mollis reddita, ac nauseabunda, cum sudore frigido, ab alvo liquida, nigra vomitionis significationem affert, in iis lassitudinis sensus malum denunciat. 232. sec. 2. l. 2. co.

Lingua tremula quibusdam etiam alvum humectam nonnunquam reddunt. In his autem si nigricent, etiam mortem denunciant, ac fortassis lingua tremula instabilem mentem, & à sede constantiæ deturbatam significat, 233. sec. 2. l. 2. co.

Lingua densa & perarida, phrenitidem portendunt, 214. l. 2. co.

Lingua tremula nonnullis proruptæ alvi significationem præbet, 645. sec. 2. l. 2. co.

Lingua ex resiccatione densa & aspera, phrenitidem portendit, 2. l. 1. præd. sec. 2.

Lingua tremula instabilem mentem & à sede constantiæ deturbatam significant, 20. l. 1. præd. sec. 2.

Si derepente lingua incontinens fiat, aut aliqua corporis pars attonita stupeat, signum est melancholiæ, aph. 40. sec. 7.

Vide pleuritidem & pulmones, convulsio-  
nem, vocem. L I

## LIPOTHYMIA.

Qui sæpe & vehementer sine causa manifesta animo linquuntur, ii derepente moriuntur, aph. 41. sec. 2.

## LIPPITVDO.

Lippitudine affecto suborta febris solutio-  
nem affert, sin minus cæcitat, aut mortis,  
aut etiam vtriusque metus est, 222. sect. 2.  
l. 2. co.

Quibus eum lippitudine capitis dolor ac-  
cedit, & longo tempore perseverat, cæcitat  
metus impendit, 223. sec. 2. l. 2. co.

Lippitudine laborantem sponte alvus pro-  
uens juvat, 224. sec. 2. l. 2. co.

Vide febres, oculos.

## LIVOR.

Vbi livores in febre fiunt, propè affore  
mors significatur. 66. sec. 2. l. 2. co.

Propter os ægrotans caro livide, malum,  
aph. 2. sec. 7.

Vide gravitatem.

## LOCHIA.

Vide concipere.

## MAMMÆ.

Quibus in mammis sanguis colligitur,  
furorem significat. aph. 40. sec. 5.

Vide abortum, concipere, dolores mam-  
marum.

## MANVS.

De manuum motione ita censeo. In fe-  
bribus ætatis, aut pulmonum inflammatio-



nibus, aut phrenitide, aut capitis doloribus, quibus ante faciem feruntur, & aliquid frustra venantur, & festucas colligunt, aut floecos de vestibus evellunt, & ex pariete paleas carpunt, ex his omnibus malum & mortem portendi, pag. 45. lib. præno.

## M A R E S.

Vide gravidam.

## M A X I L L Æ.

Vide convulsionem.

## M E D I C V S.

Operæpretium mihi facturus medicus videtur, si ad providentiam sibi comparandam omne studium adhibeat: cum namque præsenferit & prædixerit apud ægros, tum præsentia, tum præterita, tum futura, quæque ægri omittunt exposuerit, res utique ægrorum magis agnoscere credetur, ad id ut majore cum fiducia sese homines medico committere audeant. Curandi verò rationem optimè molietur, si ex præsentibus affectionibus futura prænoverit. Neque enim fieri potest ut omnes ægroti sanitatem allequantur: Hoc verò longè præstantius foret, quàm futurorum consecutionem prænosce-re. Quandoquidem verò quidam vi morbi intereant priusquam medicum accersant, quidam etiam vocato medico confestim partim quidam vixum diem, partim etiam paulò diutius vitam trahentes mortui sint, priusquam arte sua singulis morbis viriliter se op-

ponat;

ponere possit. Proinde ubi talium affectionum naturam quantum scilicet vires corporis superant, cognoverit, simulque & si quid divini in morbis inest, hujus quoque providentiam ediscere oportet. Hæc enim ratione merito sibi admirationem, & boni medici existimationem conciliaverit. Qui namque morbo superiores esse possunt, eos utique longè rectius conservaverit, ex longo antea intervallo ad singula consilium dirigens, tum etiam morituros, tum evasuros ubi præno-verit & prælixerit, extra culpam positus erit. In morbis autem acutis in primis quidem ægroti facies consideranda sitne benevalentium, præcipueque sui ipsius similis, ita enim optima existimanda, quæ verò ab eo plurimum recedit, gravissimum periculum portendit. Initio prænot.

## M E L A N C H O L I A.

Quæ sensim sunt mentis emotiones, in vehementes & melancholicas evadunt. Quod si ex muliebrium suppressione accidat, in ferinos tendunt, qualia sæpius contingunt. Videndum igitur num foeminae hujusmodi convulsionibus sint obnoxie, animadvertendum quin etiam est, num vocis defectiones cum alto sopore convulsionem quoque minentur, quales Cerdonis filia comparantibus muliebribus purgationibus contingere coepit, 123 l. i. præd.

Si merus atque mœstitia longo tempore

perseverent, melancholicum est signum, aph. 23. sect. 6.

Infantis si varices vel hæmorrhoides supervenerint, infantiæ solutio fit, aph. 11. sect. 6.

Ab infania, quam Maniam Græci vocant, difficultas intestinorum aut hydrops aut ecstasis, bonum, aph. 5. sect. 7.

### MELICERIDA.

Vide coxendicum morbos, & dolores coxæ.

### MENSES.

Mulieri menses decolores, nec eodem semper modo & tempore prodeuntes, purgationem indicant esse necessariam, aph. 36. sect. 5.

Mulieri si placeat menstrua sistere, cucurbitulam quam maximam ad mammas appone, aph. 50. sect. 5.

Si muliebri profluvio convulsio, aut animi defectus, superveniat, malo est, aph. 56. sect. 5.

Ex purgamentis muliebribus ad pedes & lumbos pertingentes tensiones, suppurationes indicant, & viscosa graveolentia ex alvo cum dolore prodeuntia, ex præscriptis quoque suffocationes, suppurationes denunciant, 527. sect. 27. co.

Menstruis abundantibus morbi eveniunt, & subsidentibus accidunt ab utero morbi, 57. sect. 5.

Si prægnanti purgationes menstruæ cursum.

sum suum teneant, bene valere fortum est impossibile, aph. 60. sect. 5.

In muliebribus purgamentis quæ ante partus aquosa prodeunt, malum denunciant, 513. sect. 2. l. 2. co.

Muliebria purgamenta non subsistere vitale, ac fortè ex talibus comitiales morbi oriuntur, partim verò diurnæ alvi subductiones, partim etiam sanguinis per ora venarum profluvium, 521. sect. 2. l. 2. co.

Quibus ex muliebribus purgamentis dolores intensi ad superiorem ventris partem & tenue intestinum excitati alvos humectant, & levem anxietatem inducunt, hi ad judicationes in somnum propensiores fiunt, & impotentes ex capitis dolore cum tenuibus sudoribus, & perfrictionibus vexantur. Hujusmodi recidivæ plurimis post remissionem aborti, celeriter interimunt, 518. sect. 2. l. 2. co.

Quibus à partu alba prodeunt, & his subsistentibus surditas cum febre & lateris dolor acutus excitatur, eæ in vehementem & perniciosam mentis emotionem incidunt, 525. sect. 2. l. 2. co. Idem habet sent. 80. l. 1. præd.

Prægnantibus saluginosa post partum, molestias ex albis mordacibus denunciant. Purgationes hujusmodi duritiem afferunt. In his singultus malo est, & uterum procidentia quæ & vna interficit, 526. sect. 2. l. 2. co.

Quæ ex partu & abortu copiosa celeriter cum impetu feruntur, si subsistant moleſtiam exhibent, huiusmodi muliebribus rigor inimicus eſt & alvi perturbatio, præcipue verò ſi præcordiorum dolore vexentur, 516. ſec. 2. l. 2. co.

Horrore ſubinde tentatis, laſſitudine & capitis gravitate conflictatis, muliebres purgationes erumpunt, 541. ſec. 2. l. 2. co.

Vide convulſionem, concipere, prægnantes, partum, gravidam.

### MORBI.

Sed nèque ante pubertatem occupant hi morbi, pulmonum inflammationes, laterum dolores, podagræ, renum vitia, varix in tibia, fluor ſanguineus, cancer non innatus, albicans vitiligo non cognata, deſluxio in ſpinalem medullam, ſanguinis per ora venarum proſtium, tenuioris inteſtini morbus (quem *perſa* vocant) non à natura inſitus. Horum morborum nullus ante pubertatem metuendus eſt, ab ætate autem 14. ad 42. vſque natura omnis generis morborum corporis ferax eſt. Contrà verò ab hac ætate ad annum 60. neque ſtrumæ ſiunt, neque veſicæ calculi, niſi antea occupet, neque in ſpinalem medullam deſluxio, neque renum morbus, niſi ex alia ætate ſequantur, neque ſanguinis per ora venarum proſtium, neque fluor ſanguineus, niſi priùs adſuerit. Atque hi morbi ad ſenectutem vſque abſiunt,

ſiunt, 512. ſec. 2. coac.

Vide ætatem.

In gravibus & præcipitibus malis diſcordari velut qui vomitione conſiſcantur, malum eſt, quin & albæ alvi egeſtiones moleſtæ ſiunt. Quæ ex iis prodeunt non viſcoſa, in vehementem mentis emotionem cum multo ardore agunt, videndumque eſt, num poſtea ſoporati ac torpeſcentes evadant qui ex his conſiſcantur, diutius laborant. In his conſiderandum eſt, num imminente iudicatione areſcentes, difficultate expirandi tententur. 117. ſec. 2. præd.

Quilibet in quibuſvis temporibus morbi fieri poſſunt: nonnulli tamen in quibuſdam magis tam ſiunt tum irritantur, aph. 19. ſec. 3.

Pueris maximam partem morbi iudicantur, alii intra dies 40. nonnulli intra menſes 7. aliis iſtis etiam ad pubertatem accedentibus; qui verò permanſerint, neque pueris circa pubertatem, neque ſceminis cum inenſtrua erumpunt, ſoluti fuerint, inveteraſcere conſueverunt, aph. 28. ſ. 3.

Iuvenibus ſanguinis eruptiones, tabes, febres acutæ, epilepſiæ aliique morbi, ſed præcipue nunc dicti, aph. 29. ſec. 3.

Ultra hanc ætatem proveſti, a ſtagnata pleuritides, peripneumoniæ, lethargi, phrenitides, ardentes febres, diuturna alvi proſuvia cholæræ, dyſenteriar, lenteriar, hæmorrhoides, aph. 30. ſec. 3.



Morbi alii ad alia tempora bene vel male se habent, & quædam ætates ad tempora alia, & loca & aliud victus genus, aph. 3. sec. 3.

Circa initia & finem morborum remissiona sunt omnia, in vigore vehementiora, aph. 30. sec. 2.

Vide tempus, ætatem, medicum, febres, sudores, acutum.

### MORBVS REGIVS.

Vide iæterum.

### MORSVS VENTRICVLI.

Vide excrementum.

### MVTATIO.

Celeres summitatum corporis in vtraque extrema permutationes, perniciem denunciant. Quin & situs huiusmodi (hoc est celeriter in contraria permutata, malo est, 50. sec. 2. l. 2. co. Idem repetit, 43. l. 1. præd.

Vbi toro corpore mutatio, & corpus refrigeratur vicissimque calefit, aut colorem alium ex alio mutat, morbi significatur longitudo, aph. 60. sec. 7.

Vide calorem.

### MVTVS.

Vide febres.

### NATVRA.

Vide tempus.

### NARES.

Narium tubores, alvi liquidæ & diffuensis sunt indicia, 215. sec. 2. l. 2. co.

### NER.

### NERVVS.

Præcisus nervus, aut quod in vena est tenuis, aut præputium non coalescit, 504. sec. 2. coac.

Nervi quicumque crassi vulnus accipiunt, ut plurimum claudos reddunt, præcipueque si obliquum vulnus fuerit ac in musculorum capitibus, præsertim femorum, 508. sec. 2. co.

### NOMÆ.

Nomæ verò maxime sunt lethales, quæ putredines altissimè descendentes habent, suntque nigerrimæ & siccissimæ. Vitiolæ quoque & in periculum præcipitant, quæ saniem nigram reddunt. At albæ & mucosæ putredines, mortem quidem afferunt minus, sed potius recidivas faciunt & eo diutius perseverant. Herpetes autem ex his quæ depascendo serpunt, minus habent periculi. At secundum abditos canculos difficilius tolluntur. Ac his omnibus febrem vno die succedere confert, & pus quam maxime candidum & crassum Prodest quoque in altè conditis & nigris putredinibus, nervi syderati aut ossis, aut anborum, pus enim multum in syderationibus effluit & putredines liberat, ex l. 2. præd.

### NYCTALOPIA.

Quos nyctalopas nuncupamus, qui nocturnum cernunt, hi morbo præhenduntur iuvenes aut pueri, aut etiam adolescentes, & sponte evadunt, partim quidem 40. die, partim ve-

10. 7. mense, quibusdam etiam toto anno perseverat, & tempus quidem aestimari debet, & magnitudinis morbi, & aegri ætatis ratione adhibita. Hos juvant quidem supervenientes abscessus & ad internas partes tendentes, qui tamen per juventutem non admodum contingunt. At neque mulieres, neque virginēs, quibus menses apparent, hoc morbo tentantur. Qui vero ex diuturno lachrymarum fluxu nyctalopes fiunt, eos interrogare oportet, num quis dolor ante istorum indicationem occupaverit, l. 2. præd.

## O C V L I.

Quibus in febribus aut aliis morbis voluntariè illachrymant oculi, absurdum non est, quibus vero præter voluntatem, absurdus, aph. 52. sect. 4.

Oculorum dolores meri potio, aut balneum, aut fomentum, aut pleboromia, aut purgatio solvit, aph. 32. sect. 6.

Dolores oculorum post meracis vini potum & aquæ calentis balneum, venæ sectio-  
ne curato, aph. 46. sect. 7.

Oculorum claritas, ac eorum album ex nigro aut livido clarum fieri, ad judicationem confert. At quo clarius clarescunt, eo celerem judicationem, ac tardius tardiorē significat, 217. sec. 2. l. 2. eo.

In febre ortus oculorum rubor, diuturnam alvi malignitatem præ se fert, 219. sec. 2. co.

Caligi-

Caligine oblecti oculi aut eorum albumi rubescens, aut livescens, aut nigris venis refertum, nihil probi præ se fert. Malum quoque est lacem refrigerare aut illachrymari, aut perverri, atque ex his alterum minorem esse perniciem annunciat, & oculos crebro deficere, gravis ac parva sordes ipsi adhærescere, avi albescentem humorem concretum & tenuem (ægida nominant) habere, aut eorum album augeri, nigrum autem imminui, aut nigrum à superiore palpebra contegi. Vitiosa quoque est oculorum cavitas, & vehemens oculi foras expressio, ac splendoris elisio, adeo ut pupilla extendi nequeat, & cilia retorta, ac fixi oculi & continenter conniventes, coloris immutatio, aut palpebras per somnum non committere, perniciem ostentat, quin & distortus oculus malo est, 218. sec. 2. l. 2. co.

Quibus dum convelluntur oculi fixi & immoti splendent, iis mens è sede constantia deturbatur, & diutius morbum trahunt, 124. sec. 2. l. 1. præd.

Eruptentes circa oculos eminentiæ, dum aegri ex morbo recreantur, prorumpentis alvi spem faciunt, 220. sec. 2. l. 2. co.

Oculi hebescentes & obrusi, concreti ac caligantes malum portendunt, 225. sect. 2. l. 2. co.

Cum oculorum perversione, febribus & lassitudinis sensu detento rigor perniciem

minatur. Atque in huiusmodi casibus soporari, malum denunciant, 121. sec. 2. l. 2. co.

Oculorum hebetatio cum animi defectio-  
ne, promptam convulsionem denunciat, 206.  
sec. 2. l. 2. co.

In præcipiti malo rectus oculorum obtu-  
tus ac motus pernicious, somnus turbulen-  
tus, pervigilium interdumque sanguinis è  
naribus stillationes nihil boni denunciant,  
227. sec. 2. l. 2. co.

Oculorum caligines crebris apparentibus  
mensibus, solvuntur, 551. sec. 2. l. 2. co.

Hebescientes oculi & obtusi improbandi  
sunt. Quin & fixi ac caligine obducti ma-  
lum portendunt, 146. sec. 2. lib. 1. præd.

Cervicis dolor, oculi prærubri, sanguinis  
eruptionem prænunciant, 137. sec. 2. lib. 1.  
præd.

In præcipitibus malis oculi obseratio, aut  
perfrictio, malo est, 184. sec. 2. l. 1. præd.

Oculi si lucem refugiunt, aut illachry-  
mant præter voluntatem, aut perversuntur,  
aut alter ex his minor fiat, aut quæ in iis  
alba esse debent rubescunt, aut in iisdem  
venulæ livefcunt, aut nigricant, aut lippien-  
tium oculorum sordes circa eorum aciem ap-  
pareant aut etiam assidue mobiles, aut tumi-  
di, aut vehementer cavi fuerint, aut eorum  
aspectus squalidus & minimè lucidus, aut  
totius faciei color immutatus, hæc omnia  
mala perniciosaque existimanda. Quia et-  
iam

iam per somnum, an ex oculis aliquid sub-  
appareat spectare oportet. Vbi namque non  
commisiss palpebris ex albo quid subappa-  
ret, id, si neque alvi profluvium neque me-  
dicamentum purgans expressit, neque ita  
dormire consueverit æger, pravum est indi-  
cium & lethale admodum. Quod si pervers-  
tatur aut corrugetur palpebra, aut livefcatur,  
aut pallefcatur, itemque labrum, aut nasus,  
cum alio aliquo signo, mortem in propin-  
quo esse sciendum est, lethale quoque labra  
resoluta, pendentia, frigida, & exalbida,  
pag. 2. prænot.

Oculi gramiosi optimum habent succe-  
sum, si simul lachryma & gramia & tumor  
cœperint, aut si lachryma gramia permix-  
ta, neque vehementer calida fuerit, gramia  
verò alba & mollis, & tumor levis ac solu-  
tus. His etenim sic se habentibus noctu  
oculus conglutinabitur ut dolorem non sen-  
tiant, idque casus minimè periculofus, mini-  
meque diuturnus fuerit. At si lachryma mul-  
ta & calida, cum paucissima gramia & exi-  
guo tumore, idque ex altero oculo profluat,  
valde diuturnum id quidem, sed sine peri-  
culo fit, idque lippitudinis genus doloris  
expers est. Et in his præcipue iudicatio con-  
sideranda est, quæ prima quidem fit circa  
vigefimum diem. Quod tempus si superet,  
quadragesimus dies expectandus est, aut si  
neque in his desinit, in 60. diebus solvitur.



At toto tempore ad gramiam attentum esse oportet, num in digito misceatur, & alba ac mollis fiat, idque præcipue sub iudicationis tempus, tum namque ubi finitur, id evenire solet. Quod si hæc utrumque oculum invaserunt, majus est ulcerum periculum; sed brevi solvantur. Gramiæ autem sicæ vehementes dolores afferunt, brevi tamen solvantur, nisi oculus vulnus acceperit, tumor vero magnus, doloris expertus & siccus, sine periculo est. Quod si cum dolore est siccus quidem malus metulque est ne oculum exulceret ac palpebræ coeant, formidabilis quoque est, ubi cum lachryma conjunctum dolorem habet, nam si lachryma calida & falsa profluit, in pupilla & palpebris, exulcerationis periculum est. At si tumor quidem constiterit, lachryma vero diutius effunditur, & gramia tenent, viris quidem palpebrarum eversionem rectè prædixeris, at mulieribus & pueris exulcerationem & palpebrarum eversionem. Si vero gramia pallidæ aut lividæ fuerint, lachrymaque multa & calida, caput ardor occupet ex temporibus ad oculum dolor tendat, insomniæque his accesserit, vlcus in oculo factum esse necesse est; ac ut rumpatur metus est. Iuvat autem succedens febris, aut dolor in lumbos firmatus. His vero futurorum prædictionem rectè institues si & temporis & eorum quæ ex oculo fiunt rationem inieris, tum etiam

etiam gravissimorum dolorum, tum vigiliarum. Sed ubi oculum introspicere licet, si quidem ruptum inveneris, & per rimam pupilla extiterit, malum significat, nec facile restituitur. Quod si etiam putredo subsit, nulli amplius est usus. Reliquæ vero ulcerum genera prædicere licet, & locorum putredines, & altitudines intuenti; pro ulcerum magnitudinæ cicatrices fieri necesse est, quibus igitur rumpuntur oculi, posteaque adeo extant ut pupilla loco mota esse videatur, his nec vlllo tempore, neque arte ut videant opem ferre licet. At parvæ pupillarum dimotiones restitui possunt, dum ne quid mali accesserit, & juvenis sit æger. Ulcerum vero cicatrices, si non aliud malum subsit, omnes & à tempore & ab arte juvari posse existimandæ sunt. Ac præcipue quæ recentissimæ & in juvenum corporibus contractæ sunt. Ex locis autem insignem facit noxiam pupillæ acies, si exulceretur secundum eam id quod est supra supercilia, deinde vero quicquid his locis fuerit proximum, pupillæ quoque cæsum aut argenteum, aut ceruleum colorem nactæ, improbandæ sunt. His aliquantulum meliores existimandæ sunt quæ aut minores, aut ampliores apparent, aut angulos habent sive id ex manifesta causa, sive sponte contingat. Caligines & nubeculae, ac subalbicantes cicatrices, ægides dictæ, exterruntur ac evanescent, nisi eo in loco vulnus

aliquid subortum sit, aut illic antea cicatricem, aut vnguem esse contigerit. Quod si in oculi nigro resplendens cicatrix orta sit, nigri aliquid dealbat, ita ut si diutius perseveret, & aspera & crassa, etiam vestigium aliquod postea relinquat. Iudicationes vero non secus ac in febribus scripti, ita & hic se habent. Sed & observatis signis, pro genere quidem lippitudinum, prædictionem instituas licet, nempe diurnas lippitudines forte, ubi pessima signa affuerint velut in singulis descriptum est. Breves vero ubi optima signa comparuerint, easque 7. die aut proximis diebus finiendas prædicere, ac aliqui in toto esse existimare oportet. Quibus autem levamentum adfuerit, si id neque iudicatoriis diebus, neque cum bonis signis contingat, in iis recidivæ metuendæ sunt, imprimis vero in oculorum affectibus vrinæ status in considerationem adhibendus est. Occasio namque præceps est & lubrica, p. 103. l. 2. præd.

Vide convulsionem, dolorem capitis & lumborum, lien, lippitudinem, puerum.

### OPHTHALMIA.

Ophthalmia laborantem alvi profluvio corripit bonum, aph. 17. sec. 6.

### OMENTVM.

Quibus omentum procidit, ut putrescat necesse est, 502. sec. 2. l. 2. co.

OS.

Neque corporis os quodcunque resectum, neque cartilago augetur, 505. sec. 2. l. 2. co.

### OS HIAN S.

Vide jacere.

### PALPITATIO.

Quos palpitaciones in totum occupant plerumque voce defecti pereunt, 30. l. 2. l. 1. præd.

Quæ contingunt in febre circa ventrem palpitaciones, mentis emotiones adferunt. Quin & sanguinis ex naribus profluvium cum horroris sensu interdum accidit, 298. sec. 2. l. 2. co.

Quæ contingunt circa ventrem palpitaciones cum præcordiorum contentione oblonga & intumescence, sanguinis profluvium è naribus denunciant, idque quandoque cum horroris sensu, 144. l. 1. præd.

Vide cervicem.

### PALLOR.

Vide colorem, concipere.

### PALPEBRÆ.

Vide oculos, somnum.

### PARTES.

Vide extenuationem.

### PRÆCORDIA.

Vide hypochondria.

### PRÆGNANS ET PARTVS.

Quæ ventrem ferunt, iis uteri os connivet, aph. 51. sec. 5.

Mulierem gravidam morbo quoque acuto corripit perniciosum, aph. 31. sec. 5.

Mulieri in utero ferens secta vna abortit, eoque magis si sit fortis grandior, aph. 30. sec. 5.

Quæ gestantes uterum febris corripuntur, aut vehementer sine evidenti causa extenuantur, eæ difficulter & cum periculo pariunt, aut abortientes periclitantur. aph. 55. sec. 5.

### PURGAMENTA.

Vide gravidas, menses, concipere.

Si mulieri purgationes non prodeant, neque horrore, neque febre superveniente, cibi que fastidium accidat, prægnantem esse putat, aph. 61. sec. 5.

Spirationes suspiriosæ quæ foras educuntur, ac citra rationem facta colliquatio in uterum gerentibus, abortiones indicant. 519. sec. 2. l. 2. co. idem repetit 540.

Ventris dolor à partu, in his purulenta expurgat, 520. l. 2. l. 2. co.

Quæ torporis sensu afficiuntur, præcipue quæ ad motiones impotentes & perfractæ, circa judicationem vexatæ, anxietate laborantes multo & tenui sudore diffuunt, in his alvus effusa malum denunciat, 521. sec. 2. l. 2. co.

Muliebria purgamenta non subsistere utile, ac fortè ex talibus comitiales morbi oriuntur, partim verò diurnæ alvi subductiones, partim.

partim etiam sanguinis per ora venarum profuvium, 522. sec. 2. l. 2. co.

Quæ ante partionem in modum cholæræ morbi affliguntur, faciles quidem partus edunt. Febre autem tentatæ, malignè habent, tum verò præcipue, si quid fauces vexet, aut in febre aliquid maligni appareat, 535. sec. 2. l. 2. co. 2c.

Eruptientia ante partum aquosa, malo, 536. sec. 2. l. 2. co.

Ante partus subinde rigore corripit, & citra dolorem parere, periculum indicat, 538. sec. 2. l. 2. co.

Quæ ex partu & abortu copiosa celeriter cum impetu feruntur, si subsistant, molestiam exhibent. Hujusmodi mulieribus rigor inimicus est, & alvi perturbatio, præcipue verò si dolore præcordiorum vexentur, 516. sec. 2. l. 2. co.

Quibus à partu alba prodeunt, & his subsistentibus, lurditas cum febre, & lateris dolor acutus excitatur, eæ in vehementem & perniciosam mentis emotionem incidunt, 525. sec. 2. l. 2. co.

Prægnantibus saluginosa post partum, molestias ex albis mordacibus denunciant. Purgationes hujusmodi duritiem adferunt. In his singulis malo est, & vterorum proci-dentia, quæ & vna interficit, 526. sec. 2. co.

Quæ ex partitionibus contingunt exolutiones cum torpore molestiam quidem exhi-



bent & menses movent, nullam tamen perniciem afferunt, verum etiam purgamentorum muliebrium abundantiam denunciant, 546. sec. 1. l. 2. co.

Quæ gestantes utrum febribus corripiuntur, aut vehementer sine evidente causa extenuantur, ex difficulter & cum periculo pariunt, aut abortientes periclitantur, aph. 55. sec. 5.

Si muliebri profluvio convulsio aut animi defectus superveniat, malo est, aph. 56. sect. 5.

### PODAGRA.

At de his qui podagra tentantur ista vobis dicenda videntur; qui in senectute callos aut totos in articulis induratos habent, aut laboriose vitam tolerant, cum alvò sicca, ii sanè omnes (ut sentio) humana arte sanari nequeunt. His certè succedentes difficultates intestinorum optimè medentur, quin & quæcunque aliæ colliquationes infernæ, eos valde juvant. Juvenis v. cui topi nondum circum articulos induruerunt, cuiusque victus ratio curæ est, ad laborem est impiger, alvumque habens vitæ instituto probe cedentem, is sanè prudentem nactus medicum, sanus evadet, ex lib. 2. sec. 2. præd.

Mulier podagra non laborat, nisi ipsam menstrua defecerint, aph. 29. sec. 6.

Puer podagra non laborat ante veneris usum, aph. 30. sec. 6.

De

Dolores podagrici vere & autumnno ferè moventur, aph. 55. sec. 6.

Vide eunuchum.

### P V S T U L A.

Pustularum eruptiones velut summa cute leviter lacerata, aut vellicata, totius habitus tabem, & corruptionem denunciant, 444. sec. 2. l. 2. co.

Quibus ad articulos prærubræ pustulæ superficiales enatæ sunt, ac subinde rigent, iis velut ex acceptis plagis cum dolore venter, & inguina rubescunt & pereunt, 489. sec. 2. l. 2. co.

Quibus per febres assiduas pustulæ toto corpore enascuntur, lethale est, nisi quid purulentum abscedat, in his verò præcipuè adnasci ad aures tubercula solent, 114. sec. 2. l. 2. co.

Lata pustulæ non admodum pruriginosæ, aph. 9. sec. 6. Vide æratem.

### P R U R I T U S.

Quibus inferiores partes malè afficiuntur, vehementibus pruribus prius obortis, iis vrina fabulosa fit, & subsistit. At qui perniciosè habent, iis mens obtorpescit, 488. sec. 2. l. 2. co.

In corporis perfrictione cum torporis sensu, sanguinis detractio mala est, 343. sec. 2. l. 2. co.

Quibus autem torpores & pruriges pungentes per caput, interdum quidem totum,

interdum etiam aliquam partem percurrunt, sæpius verò frigoris alicuius sensus caput pervagari videtur, ab iis sciscitari oportet, num etiam ad summam linguam pungens ille pruritus pertingat. Sic enim magnus morbus est, & qui ægrè solvatur, alioqui verò facilis. Auxilium autem consequuntur ex abfcessibus, velut antea conscripsum est. Qui tamen his morbis quàm illis contingunt: mulieres autem pungentes pruriginis, & atrabilis vitia minùs quàm viri sentiunt, nisi menses penitus evanuerint, ex l. 2. sect. 2. prædic.

### PURGATIO.

Corpora quæcunque quis purgare velit, ea fluxilia facere oportet, aph. 9. sec. 2.

Si qualia oportet purgentur, confert & facilè ferunt, si contraria, difficultet, aph. 25. sec. 1. idem repetit, aph. 3. sec. 4.

In morbis acutis rarè & per initia medicamento purgante utendum est. Idque diligentibus cum præmeditatione facere oportet, aph. 24. sec. 1.

Concocta maturaque medicari ac movere non cruda: nec per initia, nisi suoque dicantur impetu, id quod perraro fieri solet, aph. 22. sec. 1.

Quæ decernuntur decretæ sunt iustè, nec movere, nec aliud quicquam novare, seu medicamentis, seu aliis irritamentis fiat, sed omittere, aph. 20. sec. 1.

Q82

Quæ educere oportet, quoquo maxime vergere videbuntur, ducere, viis ac locis vitè liter còferentibus, 21. sect. 1.

Qui corporum salubritate sunt præditi, purgante hausto medicamine statim deficiunt, ut qui pravo alimento utuntur, aph. 36. sect. 2.

Qui integra sunt corporis valetudine meditationes ægrè molesteque ferunt, aph. 37. sec. 2.

Prægnantes purgabis, si materia urgeat quadrimestres, & usque ad 7. mensem, sed has parcius, minore verò & grandiore conceptu, cautius religiosiusque agendum, aph. 1. sec. 4.

Purgantium medicamentorum usu talia à corpore educenda, qualia sponte etiam prodeuntia, juvant; contrario verò modo ex-euntia, sistenda, aph. 2. sec. 4.

Æstate superiorem potius, hyeme inferiorem purgare convenit, aph. 4. sec. 4.

Sub canicula, & ante caniculam difficiles sunt purgationes, aph. 5. sec. 4.

Graciles & ad vomendum faciles per superna purgato, nisi hiems addit, aph. 6. sec. 4.

Ægrè vomentes & modicè carnosos, quos eufarcos appellant Græci, infernè purgato, devitans æstatem, aph. 7. sec. 4.

Obnoxios phthisi suprà ne purgato, aph. 3. sec. 4.

Melancholicos infra vehementius purga-

G

bis, eadem ratione contraria iniens vacuandi viam, aph. 9. sec. 4.

Purgandum in valde acutis; si inciter materia, eadem ipsa die, differre enim in talibus malum, aph. 10. sec. 4.

Quibus propter levitatem ventris cibi sunt incontinentes, hyeme supra purgare malum, aph. 12. sec. 4.

Qui ad veratrum non facile supra purgantur, eorum corpora ante portionem copiosiore alimento, & quiete præhumectanda, aph. 13. sec. 4.

Poto elleboro corpus movendum potius quam somno tradendum aut quieti, nam vel navigatio indicat motione turbari corpora, aph. 14. sec. 4.

Cum elleborum ditare voles, move corpus: cum verò sistere, somnum concilia, nec move, aph. 15. sec. 4.

Non febricitanti cibi fastidium, cordis dolor, vertigo tenebrosa, & oris amaritudo purgatione per superna opus esse significant, aph. 17. sec. 4. Idem repetit aph. 70. sec. 7.

Supra septum transversum dolores quinque egent purgatione, per superna purgandum esse significat, qui verò infra sunt, per inferna, aph. 18. sec. 4.

Qui portione medica dum purgantur non siciunt, ipsorum purgandi finis non sit donec fuerint, aph. 19. sec. 4.

Si

Si citra febrem tormina adfusi, & genuum gravitas & dolor lumborum, inferna purgatione opus esse significant, aph. 20. sec. 4.

Prægnantes purgabis, si materia inciter, quadrimestres, & usque ad 7. mensem, sed has minus, minore verò aut grandiore fortu religiosius cunctantiusque agendum, aph. 29. sec. 5.

Corpora quæ quis purgare volet, fluxilia faciat oportet, & siquidem supra valet, alvus sistenda: si verò infra laxanda, aph. 70. sec. 7.

Recta ratione facienti omnia si secundum eam minus succedat, protinus non est ad aliud transeundum, dummodo id constet quod ab initio visum fuit, aph. 52. sec. 2.

In omni superflua purgatione, frigus cum sudore exitiale. Et inter hæc qui subinde evomunt, & fiticulosi sunt, malè habent, qui verò anxietate laborant cum lumborum dolore, iis alvus humectatur, 568. sect. 2. l. 2. co.

Ex epoto veratro prærubrorum, & nigrorum purgatione vitiofa, virium exolutio cum talibus mala est, 569. l. 2. co.

#### PLEVRITIS.

Qui pleuritide laborant nisi intra dies 14. superne repurgentur, iis in empyema fit mali translatio, aph. 8. sec. 5. Idem repetit, aph. 15.

Pleuritide aut peripneumonia descende

G 2



diarrhœa interveniens malum, aph. 16. sec. 6.

A pleuritide peripneumonia malum, aph. 11. sec. 7.

Lateris dolore circa inflammationem affecti, cum turbulentis, tenuibus, moderatis, in phrenitidem labuntur, 411. sec. 2. l. 2. co.

Lateris dolor cum diuturna febre, puris educationes fore denotat, 421. sec. 2. l. 2. co.

Qui subinde horrore corripuntur, ad suppurationes deveniunt. Quin etiam febris ad talem suppurationem ducit, 422. f. 1. l. 2. c.

Quos ex lateris dolore cibi fastidia comitantur, iis os ventriculi aliquantulum dolet, & sudoribus diffiunt. Vbi autem facies ruboribus velut efflorescit, & alvus est liquidior, pus in pulmonibus collectum habent, 423. sec. 2. l. 2. co.

Lateris dolores in febribus leviter firmatos, & absque ulla significatione, venæ sectio lædit, sive aversum à cibis animum, sive sublata præcordia ager habeat. Quin etiam in corporis perfractione torpescunt non sine febre, sanguinis detractio lædit, & cum videantur levius habere, moriuntur, 431. sec. 2. l. 2. co.

Ad lateris dolorem insuper accedente strangulatu, suppurationis futuræ spes est, 413. sec. 2. l. 2. co.

Morbi laterales fœci, & in quibus nihil expuitur gravissimi sunt, metuendi quoque in quibus dolores ad superiora tendunt.

181. sec. 2. l. 2. co.

Morbi laterales graviore sine divulsionibus quàm cum divulsionibus contingunt, 382. sec. 2. l. 2. co.

Quibus in morbo laterali lingua circa initia biliosa est, hi intra septimum judicantur, quibus verò 3. aut 4. die, circa nonum, 383. sec. 2. l. 2. co.

Quod si bulla aliquantulum livescens in lingua appareat initio, qualis excitatur ferro candenti in oleum intincto, diffusior sit solutio, & judicatio quidem ad 14. diem deducitur, sanguinem autem ut plurimum expunt, 384. sec. 2. l. 2. co.

In morbo laterali affectis, dolores & alvum emolliiri vile est. Sputa colorari, nulos in pectore strepitus fieri, urinam rectè procedere. Quibus contraria molesta sunt, sputumque dulcescere, 386. sec. 2. l. 2. co.

Quibus ex morbo laterali suppurantur in quadraginta diebus post ruptionem, pus per ruptionem rejiciunt, 385. sec. 2. l. 2. co.

At vero biliosi simul & sanguinei morbi laterales ferè 9. die aut 11. judicantur, ac maxime senescunt. Quibus autem in morbo laterali initio quidem dolores leves sunt, 5. verò aut 6. die ingravescunt, ferè ad 12. perveniunt. Raroque servantur, sed præcipuè 7. ac 12. die periculum subeunt: quod si bis 7. evaserint, servantur, 387. sec. 2. l. 2. co.

Quibus in morbo laterali plurimus ex-

sputo strepitus in pectore sonat, & vultus demissus est, oculisque aurigine suffusus, & caligine obductus, in his mors expectanda est, 388. sec. 2. l. 2. co.

Densa & exercitationi dedita corpora, citius ex morbo laterali & pulmonis inflammatione intereunt, quam quæ sine exercitatione degunt, 398. sec. 2. l. 2. co.

Lateris dolor cum bilioso sputo præter rationem evanescens, ægros in vehementem & furiosam mentis emotionem agit, 418. sec. 2. l. 2. co.

In dolore lateris, sanguinis è naribus stilatio mala est, 405. sec. 2. l. 2. co.

In morbo laterali quibus circa initia in totum purulentæ sunt sputationes, in 3. die, aut 5. moriuntur, quos si superent, nec longè melius habuerint 7. aut 9. aut 11. suppurati fiunt, 379. l. 2. l. 1. co.

Quibus autem rubor contingit neque aliter quàm morbo laterali affecti incallescunt, alvusque biliosa, & graveolentia exturbat, in 20. & 40. die periculum subeunt, quos si superaverint servantur, 380. sec. 2. l. 2. co.

Vide dolorem lateris & pulmonis.

#### PULMONES ET PULMONUM INFLAMMATIO.

Ex lateris morbo præcipuè aut pulmonis inflammatione purulentos calores interditi quidem tennes, noctu verò intentiores consequuntur, neque quicquam efflatu dignum expuunt,

expuunt, circa cervices & claviculari sudores occupant, oculi cavantur, mala verò rubent, digiti quidem manuum summè calenti & scabri redduntur, vngues autem vnei fiunt, & perfrigescunt, in pedibus tumores & pustulas toto tempore habent, ac cibos refugiant. Atque hæc sunt diuturnarum vomitarum notæ. Quæ verò celerem eruptionem habent, tum ex notis quæ ad eas consequuntur, comprehenduntur, tum etiam ex doloribus qui circa initia fiunt; simulque si spiritus aliquando majori cum difficultate trahitur. Rumpuntur autem magna ex parte sputationes, partim quidem 20. die, partim 40. partim etiam 60. quibus igitur inter initia intensus dolor instat, nec non spirandi difficultas & tussis, cum frequenti sputatione, circa vigesimum diem aut celerius ruptio expectanda est. Quibus autem hæc leviora insunt, pro ratione, serior eruptio futura est. Sed & dolores & spirandi difficultates ac crebram respirationem, eruptionem ipsam præcedere necesse est. Temporis autem ratio ineunda est, ex quo primum quis dolorem aut gravitatem sensit; aut febricitavit aliquis, aut si quando etiam rigorprehendit. Ut plurimum igitur brevi servantur, quos febris statim atque eruptio facta est, dimittit, & cibos appetunt & quibus pus facile educitur album odoris expers, læve ejusdemque coloris, sine pituita ac alvus exigua

& cocta reddit. At verò ii moriuntur quos febres consequuntur, & sitis & cibi fastidium, si pus lividum, aut ex pallido virescens, aut puitosum, aut spumans, aut insuper si alvus est liquida. Quibus autem ex prædictis partim quædam adsunt; partim verò abstant, hi quidem moriuntur. 402. sec. 2. l. 2. co.

Qui pus intro collecturi sunt, iis primum quidem saluginosum sputum expuitur, deinde dulcius, 403. sec. 2. l. 2. co.

In morbis pulmonis gravedines, & stercutamenta tum præcedere, tum verò succedere, malo est, in reliquis verò morbis stercutamentum utilitate non vacat, 399. sec. 2. l. 2. co.

In pulmonis inflammationibus, si lingua tota alba fiat aspera, ambæ pulmonis partes inflammatione vexantur, quibus verò dimidiata lingua, qua parte id apparet, inflammatio affligit. At quibus quidem ad vnam claviculam dolor subit, iis vna superior pulmonis ala laborat, quibus verò ad ambas claviculas dolor extenditur, ambæ superiores pulmonis alæ laborant, quibus ad mediam costam, quibus verò ad quam partem pulmo extenditur dolor permeat, interna ala laborat, quibus vna tota pars laborat, quæ ei parti respondent omnia ægrotant. Si quidem igitur suspensæ vtrinque pulmonis partes aortæ dictæ tanta inflam-

matio-

matione tententur vt ad latus adhæreat, illa corporis parte resolutionem sentiunt, & ad costam livores foris fiunt, quos veteres ictos aut sydere percussos vocabant. Quod si tanta non est inflammatio vt adhæreant, dolor quidem totum occupat neque tamen resolutionem sentiunt, neque livores habent. 400. sec. 2. co.

Quibus autem vna cum corde pulmo totus inflammatur, ita vt in latus incumbat, ii toto corpore nervorum resolutionem sentiunt, & sine sensu jacet æger frigidus, 2. autem aut 3. die interit. Quod si contingat vt cor nihil tale quiddam, aut etiam minus patiatur, diutius vivunt, nonnulli verò etiam servantur, 401. sec. 2. l. 2. co.

Pulmonis inflammationes quæ ex morbo laterali permutationem accipiunt, iis quæ ab initio sunt securiores sunt, 397. sec. 2. l. 2. co.

At verò in pulmonis inflammationibus quæ periculum creant, abscessus in crutibus non inutiliter fiunt; quibus nec potest quicquam melius accidere, quam si sputum pro flavo purulentum existat. At si neque sputum pro ratione excernitur, neque in vrina bonum apparet sedimentum, periculum est ne elaudicat æger, ac ne res multum negotii sit exhibitura. Quod si abscessus intro recurrant perseverante febre neque prodeunte sputo, periculum aut mortis aut delirium.

G 5



minet. Quicumque verò pulmonis inflammatione laborant, neque diebus iudicatoriis repurgantur, verùm cum delirio 14. dies superarunt, iis suppurationis metus impender, 396. sect. 2. l. 2. co.

Quibus ex pulmonis inflammatione abscessus ad aures aut inferiores partes fiunt, tum suppurant, tumper fistulam via aperta effunduntur. His autem secunda valetudo contingit, quos febris & dolor consequitur, si sputum non satis pro ratione ejicitur, neque biliosæ fuerint alvi dejectiones, sed solutu faciles, ac synceræ, neque vrina admodum crassa, aut multum habens sedimentum, ac in reliquis omnia securitatem polliceantur. Fiunt autem, aliis quidem in partibus inferioribus quos circa præcordia inflammatio fatigat, aliis in superioribus partibus, quibus præcordia tumoris & doloris sunt expertia, spirandi autem difficultas pro tempore accesserit, quæ deinde sine vlla occasione evidenti quiescat, 395. sec. 2. l. 2. co.

In his igitur omnibus qui pulmones affligunt morbis, bonum quidem est facillè morbum sustinere, dolore defungi, sputum promptè expuere, facillè spirare, sibi esse vacuum, reliquum corpus æqualiter incallescere, ac molle esse, ad hæc somnos, sudores, vrinarum educationem laudabiliter fieri: quibus contrà malo sunt, quandoque ergo bona

bona hæc omnia huic sputo aderunt, poterit secunda valetudo contingere, quod si quædam adfuerint, quædam etiam absuerint, non vltra 14. diem vita producitur. At verò si contraria signa accesserint, celerius mors continget, 393. sec. 2. lib. 2. co.

In pulmonum virilis supra modum rubre sanguinis stillæ matum denuntiant, 412. sec. 2. l. 2. co.

In pulmonis inflammationibus siccis, qui pauca concocta educunt, metuendi sunt, 416. sec. 2. l. 2. co.

His aliquantulum extensi in pectoribus rubores fiunt, & perniciem denuntiant, 417. sec. 2. l. 2. co.

In pulmone pus colligentibus per alvum pus fecedere mortiferum, 419. sec. 2. l. 2. co.

Ex suppuratis autem quos pulmonum morbi concitarunt, sæd seniores moriuntur. At ex cæteris suppurationibus juniores potius intereunt. At lumborum & inferiorum partium dolores qui cum febre affligunt, si relietis inferioribus ad septum transversum transcant, exitiales sunt admodum. Ad alia signa igitur animum adhibere oportet. Si quidem ex pravis signis quippiam apparuerit omni spe destitutus est æger, cum verò suppurati videntur, quibus purum quidem pus est, & album, & minimè foetidum, si servantur. At quibus suberuentum & coagulatum, moriuntur. Quod si irruente ad

septum transversum morbo: reliqua signa minimè prava se ostenderint, hunc suppurationum fore magna spes est. At vesicæ tum graves, tum duræ, tum dolentes, grave prius & exitiale periculum minantur.

Vide anginam, dolores, pulmones, sputa, pus.

## P V S.

Dum pus sit dolores ac febres fiunt magis quam confecto, aph. 147. sec. 2.

Quibus in corpore pus nullam spi dat significationem, ob crassitudinem sui aut loci non se prodit, aph. sec. 6.

Quæ ob paris intro collectionem febris intermitit, in his magna ex parte ægri tenuibus sudoribus diffiunt, 419. sec. 2. l. 2. co.

Quibus purulentis ab humeris concussis, multus editur strepitus, ii minùs habent puris quàm quibus paulo difficilior inest spiratio, lique melius colorati videntur. Quibus verò nullus intrus sit strepitus, difficultas tamen spirandi vehemens adest, & livescunt ungues, ii pure pleni sunt & perniciosè habent, 432. sec. 2. co.

At sanè ex suppurationibus quas pulmonum morbi excitantur se è senes moriuntur, ex cæteris verò juniores, 431. l. 2. co.

Quibus ex hepatis æstione, pus amurcæ simile prodit, lethale, 431. sec. 2. l. 2. co.

Qui-

Quibus tubercula in pulmone oriuntur, iis pus intra dies 40. ex quo fit ruptio, expuunt, quos si superent, ut plurimum tabidi fiunt, 404. sec. 2. l. 2. co.

Quibus si concutiuntur, pus lutulentum & graveolens prodit, ut plurimum moriuntur, 409. sec. 2. l. 2. co.

Quibus specillum à pure velut ab igne coloratur, ii ferè moriuntur, 410. sec. 2. l. 2. co.

Quibus ad palatum humor colligitur, plerumque in pus convertitur, 138. sec. 2. l. 2. co.

Vide dolorem capitis, jecur, pleuritidem, pulmonem, urinam.

## PHRENITIS.

In phreniticis cum omnia circa initia moderatè & sederatè se habeant, ac subinde permutantur, malum denunciatur, 92. sec. 2. l. 2. co.

In vehementi & furiosa mentis emotione accedentes tremores, exitio sunt, 93. sec. 2. l. 2. co.

Vehementi infanzia detenti, tremuli cum crebra sputatione, merus est ne phrenitici evadant, 94. sec. 2. l. 2. co.

Vehementer & acuta mente emoti, si febris iterum repetat, phrenitici evadunt, 95. sec. 2. co.

Phrenitici parum bibunt, ex levibus strepitibus faciliè irritantur, tremuli sunt, aut

convulsionibus tentantur, 96. sec. 2. lib. 2. coac.

In intensa phrenitide tremores lethales sunt, 95. sec. 2. l. 2. co.

Desipientiæ quæ circa necessaria sunt pessimæ, & quæ ex his ingravescent, exitium portendunt, 98. sec. 2. l. 2. co.

In phrenitide albicans dejectio ac torpor malum denunciant, his succedens rigor, pessimus, 91. sec. 2. l. 2. co.

Quæ in phreniticis manifesta apparent insomnia probanda sunt, 90. sec. 2. l. 2. co.

Quibus adsunt superiorum partium tenues sudores cum perfrictionibus nec sine febre, ii corporis incontinentia & phrenitide vexati præceps periculum denunciant, 69. sec. 2. l. 2. co.

Desipientiæ cum voce stridula, linguæ revulsione, ac ipsi quoque tremuli vehementem mentis alienationem significant, in his durities, aut asperitas, perniciem minatur, 99. sec. 2. l. 2. co.

Desipientiæ quæ jam admodum fractis viribus & debilitatis succedunt, pessimæ sunt, 100. sec. 2. l. 2. co.

Crebræ in phreniticis permutationes, convulsionem denunciant, ac prava sunt, 101. sec. 2. co. idem repetit, 28. sec. 2. præd.

Qui inter initia sopore detenti, capitis, humborum, præcordiorum cervicis dolore, ac insomnia consistantur, eos considerare oportet

oportet num sint phrenitici, in his narium stillatio perniciem ostendunt, idque præcipue si 4. inter initia die contingat, 1. sec. 2. l. 1. præd.

Vehementes phrenitides in tremores desinunt, 9. sec. 2. l. 1. præd.

Quæ paucio tempore furiosiores sunt mentis emotiones, in ferinas evadunt, 26. sec. 2. l. 1. præd.

In furiosa & vehementi emotione succedentes tremores, malignitatem denunciant, 14. sec. 2. præd.

Crebræ in phreniticis sputationes cum perfrictione, non longè postea nigrorum vomitum futurum indicant, 31. sec. 2. l. 1. præd.

A peripneumonia phrenitidis malum, aphæ 12. sec. 7.

In phreniticis initio moderatum esse, sedatum & facilem, erebro verò permutari malum est, quin & sputatio frequens mala est, 12. sec. 2. præd.

Vide dementia, insaniam, jactationem, tempus, ætatem.

## PHLEBOTOMIA.

Vide sanguinem, evacuationem, oculos, partum, vinam, spinam.

## P V E R I.

Pueris maximam partem morbi judicantur, alii intra dies 40, nonnulli intra 7. mens.



ses quidam intra annos 7. aliis ipsis etiam ad pubertatem accedentibus. Qui verò permanserint, neque pueris circa pubertatem, neque foeminis cum menstrua erumpunt, soluti fuerint, inveterascere consueverunt, aph. 18. sec. 3.

Pueri verò quibus oculi derepente pervertuntur, aut pectus affecti sunt, aut tubercula sub cervicem enascuntur, aut aliquantulum lingua hæsitant, aut ruses sicca trahentes permanent, aut ubi adoleverint, adventrem dolor contendit, neque conturbatur, aut iis latera distorquentur, aut venæ crassæ circa ventrem in varices convertuntur, aut omentum descendit, aut testis intumuit, aut manus extenuatur, & impotens redditur, aut pes & tibia tota citra aliam occasionem claudicat. In his omnibus animadvertendum est morbum ista omnia præcessisse. Id quod plerique eorum qui pueros educunt, interrogari fatebuntur, quidam etiam, quod eos lateat, tale quid accidisse se scire negant, ex 1. 2. prædict.

### RATIO.

In quovis morbo valere rationem, rectè se habere ad ea quæ assumuntur bonum; contra verò se habere, malum, aph. 33. sec. 2.

### RAUCITAS.

Raucitas cum tussi, & alvo liquida pus educit, 114. l. 2. l. 2. co.

RE

### RECIDIVÆ.

Quibus sæpius recidivæ contingunt, si sextum mensem superaverint, in tabem coxariam ferè incidunt, 144. sec. 2. l. 2. co.

Crebræ iisdem perseverantibus morborum reversiones, impendente judicatione, sanguinem profundentes, nigram vomitionem excitant, quin etiam tremulos ægros faciunt, 122. sec. 2. co.

Vide febres.

### REMEDIUM.

Ad extremos morbos extrema exquisitè remedia comparata optima sunt, aph. 6. sec. 2.

### RESPIRATIO.

Respiratio frequens quidem & parva, aut inflammationem, aut dolorem principalium partium indicat, magna verò ex longis intervallis delirium & convulsionem. Et frigidus quidem spiritus lethalis est, mortem quoque affert, febriculosus & fuliginosus, frigidus tamen minus. Et magnus foras quoque expiratus, parvus verò intrò & parvus foras, magnus verò intrò, pessimus quidem ad mortemque proximè accedit & protensus est, ac virgens, & obscurus, duplicataque intrò revocatio, qualis inspirationem reduplicantibus, facilis autem. expiratio in omnibus morbis, qui cum febre acuta infestant & in 40. diebus indicantur, magnum habere ad salutem momentum existimandæ est,

260. sect. 2. l. 2. coac.

Cervicis ac dorſi perfrictiones, quæ etiam totum corpus pervadere videntur, convulſiones denuntiant, in quibus vrinæ hordei non exactè moliti craſſioribus fruſtulis ſimilia continent, 193. ſec. 2. l. 2. co.

Spirationes quæ non niſi erecta cervice ducuntur, hydropem ſiccum faciunt, 424. ſec. 2. l. 2. co.

Spirationes ſuſpirioſæ quæ foras educuntur, ac citra rationem facta colliquatio, in utrum gerentibus abortiones indicant. 516. ſec. 2. l. 2. co. Idem repetit. 540. co.

Quæ puellæ erectæ cervicis ſpiratione verxantur, iis videtur ferentibus mammae pus colligat. Mulier enim purgamenta circa initia apparere, malum. 549. ſec. 2. l. 2. co.

In febribus ſpiritus offeſſens malo eſt, & convulſionem ſignificat, aph. 68. ſec. 4.

Spiritus frequens dolorem aut inflammationem, in loco ſepto tranſverſo ſuperioribus indicat; qui verò magnus inſpiratur, & ex magno intervallo delirium & frigidus ex naribus & ore expiratus exitialis admodum eſt. Facile autem ſpirare valde magnum ad ſalutem momentum exiſtimandum, cum in omnibus morbis acutis in quibus febris conjuncta eſt, tum in iis qui intra dies 40. judicantur, ex 1. præ.

Quibus ſpiritus retrahitur & vox ſtranguilabunda eſt in cervicis vertebra initio deſidet,

det, & ad exitum velut ex convulſione quædam reſpiratione ducitur, 266. ſec. 2. co.

Vide ſenes.

## RESPONSIO.

Ab homine moderato ferox & audax reſponſio, malum portendit, 44. l. 1. præ.

## RIGOR.

Vbi ſanguinis eruptioni rigores ſuccedunt, diuturni ſiunt, 151. l. 1. præ.

Propter dolorem vehementem partium ad ventrem attinentium extremorum perfrigeratio, malum, aph. 20. ſec. 7.

In iis quibus rigores imminet vrina reſtitat, & in convulſionis affectionibus velut huic mulieri contigit, quæ vbi reſtauruit; ſudore correpta eſt, 110. ſec. 2. l. 1. præ.

Quin etiam nonnihil metuendus eſt cum judicatione rigor, 101. l. 1. ſec. 2. præ.

Summi totius corporis perfrictiones in diebus judicatoriis cum angore & corporis inquietudine ſi ſine ſudore ſiunt damno ſunt; præcipue verò damnatur qui ex his ſuperveniunt rigores, 61. ſec. 2. l. 1. præ.

Ex rigore perfrictiones quæ ad calorem non revocantur, malæ ſunt, 63. prædict.

In rigore familiares non agnoſcere, & eorum quæ geſta ſunt obliſci, malum indicat, 94. ſec. 2. l. 1. præ. Idem repetit 65. ſec. 2. co.

Ex perfrictione exudantes ad calorem in re-

vocari periculum denuntiant, præsertim verò si accedat lateris æstus, cum dolore & subinde rigeant, malum impendit, 66. sec. 2. præd.

Rigores cum æstu nonnihil periculi denuntiant, & facies incensa cum sudore in iis malum significat, super posteriorum partium frigus convulsionem provocat, 97. sec. 2. l. 2. præd.

Ex sanguinis eruptionibus vehementes die iudicatorio perfrictiones, pessimæ, 329. l. 2. l. 2. co.

Rigores incipiunt mulieribus ex lumbis magis & per dorsum perveniunt in caput; sed & viris parte corporis posteriore magis quam anteriore veluti ex femoribus & cubitis, inditio est cutis raritas, quam ipsam pilus ostendit, aph. 69. sec. 5.

A multa potatione rigor & delirium, malum, aph. 7. sec. 7.

Vbi corpus ita perficitur, ut obrigeat, perniciem affert, 3. sec. 2. l. 2. co.

Crebri ex dorso horrores subinde locum commutantes graves sunt & difficiles, laboriosam quippe urinae suppressionem minantur, his tenuiter exudare pessimum, 8. sec. 2. coac.

Continenter & assidue vexans rigor, imbecillo jam corpore, lethalis est, 9. sec. 2. coac.

Qui crebro tenuiter exsudent & subinde rigent,

rigent, ii perniciosè habent, & tandem sub mortem suppurati & alvum conturbatam habere deprehenduntur 10. sec. 2. co.

Qui rigores ex dorso proficiuntur graviores sunt & molestiores, ubi verò quis 17. die rigore correptus, 4. ac 20. die insuper rigerit, difficulter habet, 11. sec. 2. coac.

Qui subinde inhorrescunt, sæpe tenui sudore corrumpuntur, & difficili morbo laborant, 13. l. 2. co.

Qui subinde inhorrescunt & capite laborantes tenuiter exudantes, ii malignè habent, 12. sec. 2. co.

Rigores multi cum torpore malignum quiddam denunciant, 14. sec. 2. co.

Rigores qui in sextam diem incidunt difficile iudicium ferunt, 15. sec. 2. co.

Qui per sanitatem crebro inhorrescunt, ii ex sanguinis fluxu purulenti evadunt, 16. sec. 2. co.

Vbi horror in malis subinde incidit, cum difficultate spirandi, tabes denunciatur, 17. sec. 2. co.

Qui subinde inhorrescunt ac incontinenti corporis jactatione cum lassitudinis sensu, & lumborum dolore consistantur, iis alvi effunduntur, 19. sec. 2. co.

Qui subinde rigore prehendantur, & sub noctem aliquanto gravius habent, pervigiles in somnis nugantes ac delirantes, interdum sese lotio perfundentes, ii in convulsio-



nem tendunt, 19. sec. 2. co.

Continentes in malis præcipitibus rigores, malo sunt, 21. sec. 2. co.

Rigor cum posteriorum partium distentione mortem adfert, 21. s. 2. co.

Vitium exolutiones ex rigore, cum capitis dolore perniciem denunciant, cruentæ in iis urinæ malo sunt, 22. sec. 2. co.

Quibus ubi inhorruerint, judicatorii simul sudores contingunt, postmodum verò si horror repetierit, & temerè pervigilent, iis fortè sanguinem erupturum sperare oportet, 23. sec. 2. co.

Rigores velut in febribus, quæ propriè ad tertianarum naturam accedunt, si in medio ingravescent, febre nullum ordinem servante, maligni valde sunt, quæ verò contrà ingravescent in convulsione vexatis, cum rigore & febre perniciem denuntiant, 26. sec. 2. co.

Quæ ex rigore finit vocis defectiones tremore solvuntur, atque eos qui subinde novo rigore corripuntur, succedentes tremores indicant, 27. sec. 2. co.

Qui ex rigore vitium exolutiones aut capitis dolores sentiunt, ii in dubium de vita veniunt, in iis cruenta urina malum denunciat, 28. sec. 2. co.

Quibus rigor adest iis urina restitit, 29. sec. 2. co.

Qui in diebus judicatoriis cum angore aut  
incont.

incontinenti corporis jactatione absque sudore perfrigerantur, circa indicationem male habent, 38. s. 2. co.

Quin & qui subinde friguerunt, post hæc syncera vomitione refuderunt, anxietate vexati, tremuli in febre, malum portendunt quin etiam ex rigore vox intercepta perniciem denunciat, 39. sec. 2. co.

Qui verò post sanguinis ex naribus eruptionem ex tenuibus sudoribus perfrigescunt, male habent, 40. sec. 2. co.

Cervicis & dorsi perfrictiones, & quæ totum corpus videntur pertingere, insuper & spumantes mictiones, cum animi deliquio, & oculorum hebetatio convulsionem in proximo esse significant, 113. sec. 2. l. 1. præd.

Subabsurdus est qui cum judicatione rigor fit, 321. sec. 2. co.

Qui ex rigore perfrictione detinentur, cum capitis ac cervicis dolore, vocis defectione, ac tenui sudore, ii ubi vires resumserint ac sese velut recollegerint, moriuntur, 1. sec. 2. co.

Rigores cum sopore nonnihil periculi denunciant, & facies incensa cum sudore malignitatem significat, insuper posteriorum partium frigus, convulsionem provocat. Ac omnino posteriorum partium refrigeratio, convulsionem minatur, 7. sec. 2. co.

Febrem ardentem succedens rigor solvit, 135. sec. 2. co.

Ex his qui cum peracicie consumpti sunt, nonnulli ante mortem subinde rigoribus corripuntur, 44. sec. 2. co.

Vide febres, abscessum, abortum, hæmorrhagiam.

### R V B O R.

In febribus ex prægresso dolore rubores ad aures subnascentes, ignis sacri in facie spem faciunt, quin & convulsiones cum vocis privatione & vitium exolutione ad hæc consequi par est, 200. sec. 2. co. Vide anginam, cerebrum, tumores, testiculos.

### R V C T V S.

Vide lienteriam.

### S A L I V A.

Vide Linguam, tussim.

### S A N G V I S.

Sanguinem supernè quidem efferri qualiscunque sit, malum: infernè verò niger, si deiciatur bonum, aph. 25. sec. 4.

Sanguinem spuitione rejicientibus sine febre esse conducit, ac tussi & dolore leviter consistari, sputumque ad dies 14. tenuari. Intense autem febricitare, ac tussire, sanguinemque recentem semper spuere, minimè conducibile, 427. sec. 2. l. 2. co.

Sanguinis eruptiones vehementes cum totius corporis perfrictionibus judicatoriis pessimæ sunt, 134. sec. 2. co.

Sanguinis ex parte adversa profluvium malum

malum est: veluti si in lienis tumore ex dextra nare effluat, & circa præcordia idem spectari oportere existimandum est, 327. sec. 2. l. 2. co.

Quibus sanguinis eruptiones diu perseverant, in iis temporis progressu alvus male afficitur, nisi urina concocta prodierit, ac fortassis tale aliquid diluta urina denunciat, 332. sec. 2. l. 2. co.

Quibus ex larga & frequenti sanguinis eruptione copiosa sit nigrosum dejectio, cum alvi vero suppressione sanguinem profundunt iis alvus dolore conficitur, una autem cum quibusdam flatibus tolerabilius ferant, ac fortè si copiosis, frigidis, & tenuibus sudoribus diffuunt, in iis returbata urina mala non est, neque quod in ea insidet genitali semini simile, ut plurimum autem, hi dilutas urinas reddunt, 333. sec. 2. l. 2. co.

Perpusillæ sanguinis è naribus stillæ damno sunt, 57. sec. 2. l. 2. co.

Si in ventrem sanguis præter naturam effusus fuerit, is suppuret necesse est, aph. 20. sec. 6.

Spinæ perversionem, & spirandi difficultatem sanguinis fluxus liberat, 311. sec. 2. l. 2. co.

In corporis perfrictione cum corporis sensu, sanguinis extractio mala, 343.

Sanguinis fluxus si 4. die oriatur, diurnitatem indicat, & alvus effunditur crura-

que intumescunt, 533. sec. 1. lib. 2. co.

Vide excrementa, hæmorrhagiam.

### SANGVIS GINGIVARVM.

Vide excrementum.

### SATIETAS.

Vbi præter naturam copiosior cibus ingestus est, morbum inde creati indicat sanatio, aph. 17. sec. 2.

Vide cibum.

### SECESSVS.

Vide excrementa.

### SEDES.

Vide dolorem.

### SENES.

Senes magnam partem iuvenibus minis agrotant: semel autem diurnis morbis correpti ferè vnà moriuntur, aph. 39. sec. 2.

Senibus spirandi difficultates, destillationes cum rursi, stranguriæ, dysuriæ, articulorum dolores, nephritides, vertigines, apoplexiæ, malus corporis habitus, cachexiæ Græcis dictus, pruritus totius corporis, rigiliæ, alvi, oculorum & aurium humiditates, visus obtusior, glaucomata, auditus hebetior, aph. 37. sec. 3.

Vide victum.

### SECUNDINA.

Ad secundinas deturbandas sternutatio immisso nates & os, manu oborta, aph. 49. sec. 3.

### SEC.

### SECTIO.

Perfectum os, aut cartilago, aut nervus, aut genæ tenuis particula, aut præputium, neque augetur, neque coalescit.

Pertula perfectæ vesicæ, cerebro, corde, septo transverso, tenui quopiam intestino, ventriculo, jecore, lethale est, aph. 18. sec. 6. Sive os, sive cartilago, sive nervus sectus fuerit in corpore, neque augetur, neque coalescit, aph. 8. sec. 7.

Vide nervum.

### SINGULTVS.

Propter inflammationem singultus, malum, aph. 17. sect. 7.

Si senibus supra modum purgatis singultus accidat, non bonum, aph. 41. sec. 7.

Singultu fatigante sternutatio superveniens liberat, aphor. 13. sec. 6.

Ex synceris vomitionibus singultus malus est, mala quoque convulsio, quin etiam idem existimandum est in immodicis purgationibus quæ ex medicamentorum potionibus fiunt, 565. sec. 2. l. 2. co.

A vomitu singultus & oculorum rubor malum, aph. 3. sec. 7.

Vide hæmorrhagiam, ileum, tus.

### SITIS.

Sitis si remerè ac præter rationem cesset in præcipitibus malis, malo est, 57. sec. 2. l. 1. præd.

H 2



In gravi morbo sitim temerè ac præter naturam cessare penitus malum est, 52. sec. 2. l. 2. co.

Vide dolores capitis.

Quibus noctu bibendi est aviditas, iis admodum sitientibus obdormiscere bono est, aph. 17. sec. 5.

### SICCITAS.

Vide tempus.

### SOLVITIO.

Vide sectio.

### SOMNVS.

Vbi somnus delirationem sedat, bonum, aph. 2. sec. 2.

Somnus & vigilia si modum exceßerint, malum, aph. 3. sec. 2. Idem repetit, aph. 71. sec. 7.

Profundi somni neque turbulenti, iudicii firmitatem denunciant, turbulenti verò non sine corporis offensione instabiles sunt, & infirmi, 151. sec. 2. co.

Somni quales sopore oppressis, & totius corporis perfrictiones, perniciem ostendant, 181. s. 2. co.

Sec in somnis etiam num de oculis aliquid subappareat, spectare oportet. Nam si quid non coactè commissis palpebris de albo appareat, modò non ex alvi profluvio, aut medicamenti portione accadat, malum signum est, & valde perniciosum, aph. 52. sec. 6.

Quod ad somni rationem attinet, quemadmo-

admodum à natura nobis est consuetum, interdum quidem vigilandum, noctu vero dormiendum. Quod si istud immutatum fuerit, deterius existimandum. At minimè offenditur æger si prima luce dormiat ad tertiam diei partem. Qui verò postea somnus contingit deterior est. Pessimum autem, si neque noctu, neque interdum dormiat, nam aut ob dolorem insania adest, aut delirii adfuturi nota est, 47. præm. Idem repetit, 497. sec. 2. co.

Vide furorem, insomnia, soporem, oculos, convulsionem.

### SONITVS.

Vide cerebrum, tinnitum.

### SOPOR, & SYDERATIO.

In syderatis succedentes hæmorrhoides viles: refrigerationes verò ac torpores malum denunciant, 478. sec. 2. co.

In syderatis ex magna spirandi molestia subortus sudor, mortem adfert, in his rursus si febris accedat, solutio contingit, 479. sec. 2. co.

Syderationes quæ repente fiunt, si insuper febris in modum exolutionis contingat quæ diutius trahat, perniciem minantur, 480. sec. 2. l. 2. co.

Qui sopore decumbant cum incontinentiæ corporis iactatione, præcordiorum dolore, & parva vomitione, si tubercula ad aures

H 3

habent, sed & antea circa faciem tumores apparent cum sopore, 183. sec. 2. l. 2. co. Idem repetit, 165. lib. 1. præd.

Sopor profundus & alius omnino damnandus est, 178. sec. 2. l. 2. co.

Qui inter initia sopore detenti, capitis, lumborum, cervicis, præcordiorum dolore ac infirmis conficiantur, considerandi num nephritici evadant, in his narium stillatio perniciem ostendit, tum verò vel maxime si 4. die aut inter initia contingat, alvi quoque prærubra proluvis, malo est, 179. sec. 2. co.

Qui sopore oppressi circa initia tenuiter exudantes concoctas urinas emittunt cum magna corporis æstuatione, citra judicationem verò perfrigescunt, & rursus ex brevibus intervallis peruruntur, torpore, sopore, aut convulsione tentati perniciosè affecti sunt, 180. sec. 2. co.

Sopore, lassitudine & sorditate tentatos alvus erumpens & ad indicationem rubra demittens juvat, 181. sec. 2. l. 2. co.

Quibus in morbis subita fit mentis perclusio cum inquieta corporis jactatione, iis sanguinis eruptionem fore spes est. 184. sec. 2. l. 2. co.

Qui sopore, corporis inquietudine, præcordiorum dolore affliguntur, cum frequentibus, & pauca sputatione, iis tubercula ad aures exoriuntur, ac fortassis sopore tentati ad aliquam convulsionem deveniunt, 185. sec. 2. co.

Qui-

Quibus sopore confictis fatigatè & alio stupore (quem catochum vocant) detentis præcordia variant, ac venter in tumorem præter naturam sublatu est cum ciborum fastidio, ac alvi interceptione, tenui circa caput & thoracem oborto sudore, in his animadvertendum est, num concitatus magnus spiritus, aut genituræ similis excretio prodians singulæ demittat, eos splendet, etiam biliosa demittat, eos splendet, quiddam per urinam redditum juvat, alvus verò in his etiam commoveretur, 186. sec. 2. l. 2. co. Idem repetit, 92. l. 1. præd.

Vbi cerebrum syderatione periclitatur, quidam tribus diebus, quidam etiam sæpe moriuntur, quos si evaserint servantur, ex quorum numero pereunt quibus per sectionem os disparatum apparuerit, 187. sec. 2. co.

Ex capite dolentes & alio stupore (quem catochum dicunt) detenti ac delirantes cum alvi interceptione, ac ferociente intuitu, floridi, in scapulas rigescunt, ac posteriorum partium distentione tentantur, 162. sec. 2. co. Idem repetit, 83. l. 1. præd.

Syderationes quæ repente contingunt si insuper febris mediocris accedat, quæ diu trahat perneciem minatur, quale quid Namentii filio contigit, 82. sec. 2. l. 1. præd.

In sopore affectis ægris spumantibus produntibus dejectionibus, febris acuta ingra-  
vescit, 93. sec. 2. l. 1. præd.

Qui sopore detineatur cum incontinenti corporis iactatione, præcordiorum dolore, & parva vomitione, ii tubercula ad aures habent, sed & antea circa faciem tumores apparent cum sopore, 183. sec. 2. co.

Animadvertendum est diligenter num profundus & altus sopor omnino damnari debeat, 63. sec. 2. l. i. præd.

Vocis effectiones cum virium exolutione alto sopore (catochum vocant) detentis perniciem minantur, 96. l. i. præd.

Quæ ex lumbis in cervicem & caput redundant, & levis syderationis more resolutionis sensum inducunt, convulsionem ac mentis emotionem minantur. Videndumque est num talia convulsione solvantur, qui huiusmodi conflantur, variè morbum trahunt, atque eadem diutius perseverant, 118. sec. 2. l. i. præd.

In his qui quodam sopore aut morbo regio detineatur nec admodum sentiunt, & quibus singulus adeit, alvus assatim prorumpit, fortassis etiam supprimitur, atque ii exolvuntur, videndum num abscessus ad aures in his spectare oportet, 154. l. i. præd.

In leviter syderatis abscessus qui ad aures contingunt malo sunt, 160. l. i. præd. Quibus cerebrum syderatum est intra tres dies intereunt, si verò hos superaverint salvi sunt, aph. 50. sec. 7.

SPI-

## SPINALIS MEDULLA.

Aut verò si spinalis medulla aut ex casu, aut aliqua quapiam externa causa, aut sua sponte laborarit, & erurum impotentiam facit, ut ne tactum quidem percipiat æger & ventris, & vesicæ, adeò ut ne primis quidem diebus stercoꝝ aut urina nisi coactè reddatur. Quod si morbus inveteraverit & stercoꝝ, & urina ægro inscio prodit, tandemque non longo post intervallo perit, ex l. 2. sec. 2. præd.

Spinæ perverſionem & spirandi difficultatem sanguinis fluxus liberat, 311. sec. 2. co.

## SPIRATIO.

Vide respirationem.

## SPUTA &amp; SVPPVRATIO.

A sanguinis sputo puris spuitio, malum, aph. 15. sec. 7.

A puris sputo phthisis & fluxio, cum verò sputum retentum fuerit, moriuntur, aphor. 16. sect. 7.

Sputa ex angina viscida, & crassa, ex alvida, vi educta malum denunciant, omniſque ejusmodi maturatio mala est: In his aulæ deorsum purgatio levis syderationis modo mortem adfert, 377. sec. 2. lib. 1. co.

Sputa ex angina subarida, crebra, per tussim & cum lateris dolore educta perniciem minantur. Atque ea quæ inter potandum per tussim rejiciuntur, quæque difficulter deglu-

H 3



itur, malum portendunt, 378. sec.2. l.2. co.

In morbo laterali, quibus circa initia interum purulentæ sunt spuitiones, ii 3. die aut 5. moriuntur: quod si superent nec longè melius habuerint 7. aut 9. aut 11. suppurationes sunt, 379. sec.2. l.2. co.

Sputum vero in morbo laterali ubi maturare & expui 3. die cœperit, celeriores solutiones facit, quod si posterius cardiores, 386. sec.2. l.2. co.

Sputum autem quodcumque dolorem non tollit, malum significat; quod verò solvit bonum, 394. sec.2. co.

In omnibus autem laterum & pulmonum morbis sputum promptè, ac citò excreari necesse est, flavumque sputo permixtum esse. Quod si multo post dolorem flavum aut non commixtum rejicitur, nec non sine multo tussi, vitiosum censetur, omnino autem pravam, flavum si syncerum est, & glutinosum, & candidum, & rotundum, itemque multum ex virore pallescens, quodque spumofum & syncerum, & lividum, & æruginosum. Aliquanto verò deterius quod sic est syncerum, aut nigrum quoque videatur. Aut flavum cui paulum sanguinis admixtum est, initio quidem salutem pollicetur, quod verò 7. die aut longiore spatio tale apparet, non aded tutum. Admodum autem sanguinolentum, aut quod statim initio lysesit perniciem præ-

se.

se fert, pravitate etiam indicant & spumantia, & flava, & nigra, & æruginosa, viscosaque, & quæcumque celeriter colorantur. Mucosa autem & fuliginosa tum celeriter colorantur, tum securiora sunt; quæ verò intra quintum diem, dum coctionem accipiunt, colorantur, meliora censentur, 390. sec.2. l.2. co.

Quibus cum biliosa purulentum sputum, aut serosum, aut simul permixtum educitur, ii ut plurimum 14. die intereunt, nisi bonum aut malum aliquod ex his quæ superius dicta sunt, contingat. Alioqui certè pro ratione mors expectanda est, atque in his præcipue quibus 7. die sputum hujusmodi procedere cœpit, 392. sec.2. l.2. co.

Purulentos moderatius habentes, si sputa graveolentia consequantur, recidiva interimit, 406. sec.2. l.2. co.

Qui in morbo laterali sputa rejiciunt purulenta aliquantulum biliosa, rotunda, aut purulenta aliquantulum cruenta, iis temporis progressu periculum creatura, perniciem autem denunciant sputa nigra, fuliginosa, aut quibus qualia ex vino nigro fiunt, 407. sec.2. co.

Qui spumantem sanguinem spuitione rejiciunt cum præcordiorum dextrorum dolore, iis ex jecinore prodit, & plerumque pereunt, 408. sec.2. co.

Sputa viscida fuliginosa cum raucitate

malo sunt. Quod si ad hæc aliquid etiam in pectore sublatum sit, malum significat, in his extenuatis cervicis dolores perniciem denotant, 413. sec. 2. co.

Hepaticis spurum multum cruentum sive intus subputridum, sive sinderè biliosum fuerit, statim perniciem denotat, 446. sec. 2. coac.

Quicumque spumantem sanguinem expuunt cum præcordiorum dextrorum dolore, iis ex jecinore spuitur, & pereunt, 450. sec. 2. co.

In febre sputi excreationes lividæ, nigrae, biliosæ, subsistentes quidem malæ sunt, si vero pro ratione excreantur, viles, 242. sec. 2. coac.

Quibus falsa sputa cum tussi subsistunt, iis corpus velut efflorescentibus pustulis rubescit, antè verò exasperatur, 243. sec. 2. co.

Excreatio frequens & irrita, si quidem etiam aliud quoddam signum affuerit, phrenitidem, portendit, 244. sec. 2. co. Idem repetit, 6. sec. 2. præd.

At de sputo & tussi eorum quos tabes male habet, eadem mihi dicenda sunt, quæ de purulentis scripsi. Eum namque qui probe levati volet, convenit spurum faciliè tussi rejicere, esseque album & æquale, vni us coloris, & sine pituita, quod à capite defluit ad nares vertatur, neque febris prehendat, ut nec cibos impediatur, neque sitim faciat,

alyus

alvus autem quotidie deiciatur, & quod fecerit durum esto, & iis quæ assumuntur conveniens, hominem quam minimè tenuem, esse convenit, pectus verò laudandum, quadratum & hispidum cujusque cartilago exigua & admodum carnosa est. In quo namque hæc omnia inerunt, is maxime superstes futurus est. At qui nihil horum habuerit, exitio maxime est affinis. Juvenes verò qui in pectore pus colligunt ex humorum decubitu, aut fistula, aut alio quopiam id genus, aut ex abscessus reversione, ii nisi multa admodum bona signa affecti sint, minime evadunt. Moriantur verò hujusmodi homines sub autumnum, valdeque & ex aliis morbis longis plerisque sub hoc tempore pereunt. Ex reliquis verò minimè evadunt tum virgines, tum mulieres, quibus ex menstruorum suppressione tabes contigit. Quod si ex his aliqua superesse volet, cum multa laudabilia signa accedere, tum verò menses luculenter & manifestè comparere oportet, alioqui nihil spei relictum est. At qui ex sanguinis eruptione in pectore pus colligunt, tum viri tum mulieres ac virgines, ii certe laudè minus supersunt. Cæterum omnia signa tam suppuratorum quam tabescentium animo reputantem tum superfuturum, tum etiam periturum prædicere oportet. Ex sanguinis autem eruptione maxime supersunt, quibus in dorso & pectore dolores

ad sunt melancholici; & sanguinis eruptione ac colore quodammodo levantur. Neque enim tussis admodum neque febres succedunt, ac plerique sitim ad extremum usque facile tolerant, sed recurrunt ferè sanguinis eruptiones nisi abscessus succedant, ex quibus si sunt optimi, qui maximè eruenti. Qui verò in pectore dolores sentiunt, & temporis tractu extenuantur tussi & spirandi difficultate conficiantur, si neque febres prehendant, neque suppurationes succedant, ex iis percontari oportet si quando tussint, & difficulter spirant, num etiam concretum quoddam & modicè olens per tussim rejiciant, ex lib. 2. præd.

In omnibus pulmonis & laterum doloribus, sputum celeriter, promptèque expui, convenit, sputoque flavum valde permixtum apparere; etenim si multo post doloris initium, quod flavum est, aut fulvum, aut multam tussim exhibeat, neque valde permixtum expuat, deterius est. Flavum quippe si sincerum fuerit periculum subesse restatur, album autem, & viscidum, & rotundum inutile. Malum quoque valde viride, aut pallidum, itemque spumans. At si adeò sincerum fuerit; ut etiam nigrum appareat, id illis deterius est. Malum quoque ubi nihil expurgatur, neque ipsum projicit pulmo sed propter multitudinem fervet in gutture. In omnibus pulmonis morbis gravedines, &

ster-

stermurationes, tum præire, tum subsequi, malum. Verùm in aliis maximè lethalius morbis sternumenta virilitate non carent. At in pulmonis inflammationibus, si inter initia morbi sputum extenuatur flavum, non multo permixtum sanguine, salutare est, & confert admodum. 7. vero die, ac tardius non adeò securum: omnia autem sputa mala sunt, quæ dolorem non sedant. Pessima etiam nigra, ut prius scriptum est. At omnium quæ exerceantur optima quæ dolorem sedant. Horum verò locorum dolores, qui neque per venæ sectionem, aut medicamentis purgantibus, & victus rationem sedantur, eos ad suppurationem tendere sciendum est. Ex suppurationibus autem admodum exitiales sunt, quæ sputo adhuc bilioso existente suppurantur, idque potissimum si ab huiusmodi sputo suppuratio procedere cœperit cum morbus ad diem septimum pervenerit. Qui verò talia sputa, ne 14. die moriatur metus est, nisi quid boni accesserit. At in bonis quidem signis hæc numerantur, facile morbum sustinere, bene spirare, dolore levati, sputum sine difficultate rejicere; corpus æqualiter calidum & molle videri, sine siti esse, urinas etiam & alvi excrementa, & somnos & sudores, velut descriptum est, singula supervenire bona existimanda sunt. His enim omnibus sic contingentibus haudquaquam æger morietur, quod si ex his quædam quid-

dem



dem contingant, quædam minimè; non ultra 14. diem æger vitam produceret. Contra verò ægrè morbum sustinere, spirationem magnam & densam esse, dolorem minimè sedari, sputum ægrè rejicere, vehementem sitim esse, corpus à febre inæqualiter detineri, alvum quidem & latera vehementer calere, fronte, manibus & pedibus frigidis, vitæ verò & alvi excrementa & somnos & sudores vnaquæque qualia descripta sunt mala esse non convenit. Si quid enim ex his sputo supervenit morietur æger priusquam ad 14. diem perveniat, aut 9. aut 11. die: sic igitur conjicere oportet, quod cum sputum istud valde lethale sit, neque etiam ad 14. diem perducit, ex his verò tum bonorum, tum malorum subducta ratione prædictiones facere oportet. Sic enim quis potissimum verum assequatur. Reliquæ verò suppurationes magna ex parte rumpuntur, partim quidem 20. die, partim etiam 30. quædam quoque 40. aliquæ etiam ad 60. perveniunt. Suppurationis autem initium fore ratione comprehendere oportet, ab eo die quo primum æger febricitavit, aut etiam primum vigor prehendit, & si pro dolore sibi pondus inesse in eo loco qui dolore affligebatur dixerit, ista namque circa suppurationis initia fieri solent. Ex hoc igitur tempore suppurationum ruptionem fore intra prædicta tempora expectandum est. Quod

si in

si in altero tantum latere suppuratio fuerit, tum ventere, tum ediscere ad hæc convenit, num dolor aliquis alterum latus detineat, & num altero calidius fuerit, atque ubi in latus sanum decubuerit, interrogare si quod ei pondus desuper impendere videatur. Sic enim altero latere in quo pondus existerit suppuratio est. At pusulentos omnes his signis dignoscere oportet. Primum quidem si febris non dimiserit. Verum interdum levior quidem, noctu verò major detinet, & sudores multi oboriuntur, tusselque & tussendi cupiditas ipsis inest, nihil tamen effectum dignum expuunt, oculique cavi redduntur, malæ ruborem contrahunt, & vngues quidem in manibus adunci fiunt, digitum verò maximeque summi incallescunt, & in pedibus tumores fiunt, cibos minimè appetunt & pustule toto corpore oriuntur. Diuturnæ igitur suppurationes his indicantur signis, quibus multa fides habenda est. Quæ verò breve habent spatium sic indicantur, si quid eorum appareat quæ inter initia fiunt. Simulque si etiam aliquanto difficilius æger spiret. At ex his quæ citius aut tardius rumpuntur sic deprehendere licet, si quidem dolor inter initia oriatur, & spirandi difficultas, ac tussis sputatioque perseverant, & ad 20. diem extenduntur intra hoc tempus, aut adhuc prius ruptionem expectato. Quod si minor dolor fuerit, iisque cætera omnia

pro hujus ratione respondeant, tardius ruptionem expectato. At ante puris eruptionem dolores oboriri, & spirandi difficultatem, & sputi excreationem necesse est. Superfunt autem ex morbo hi potissimum quo febris eodem post ruptionem die dimittit, quique cibos celeriter expetiverint & siti liberantur, venterque tum exigua tum cocta deficit, & si pus album & læve, ejusdemque coloris fuerit, & à pituita liberum, circaque dolore aut tussim vehementem educatur. Sic quidem optimè ac celerimè liberantur, sin minus, qui ad ista, proximè accedent. Moriuntur verò quos febris non dimiserit, iterum accenditur & siti quidem vexantur, cibos verò non expetiverint, & si alvus livida dejecerit, pusque ex viridi pallidum & lividum aut pituita permixtum & spumosum expuerint. Si hæc omnia contigerint, partim quædam contigerint, moriuntur. At quibus eorum partim quædam contigerint partim minimè, ex his nonnulli quidem intereunt, quidam etiam ex longo temporis intervallo supersunt, sed ex omnibus his signis existentibus, tum in his, tum in reliquis omnibus conjecturam facio. Quibus ex morbis pulmonis ad aures abscessus oboriuntur, & ad inferiores sedes suppurant, & fistula facta aperiantur, iis secunda valetudo contingere solet. Ista verò hunc in modum consideranda sunt, si febris decinet, neque dolor

dolor conquiescit, neque sputum ex ratione procedit, neque biliosæ sunt alvi dejectiones, neque bene solutæ ac synceræ, neque vrina admodum multa & copiosum habet sedimentum, suffragantur verò ad salutem reliqua omnia salutaria signa, in his hujusmodi fore abscessus expectato. Ac hi oriuntur quidem in locis inferioribus circa præcordia inflammationis aliquid subest, illi autem in superioribus. Quibus præcordia mollia & doloris expertia perseverant, cumque difficultate spirandi aliquandiu vexatus fuerit, quæ citra ullam aliam evidentem occasionem quieverit, invehementibus & periculo proximis pulmonum inflammationibus, abscessus ad curas omnes sanè vtilis. Optimi verò qui fiunt sputo mutationem subeunte. Si namque tumor & dolor suboriantur sputo pro flavo in pus verso & foras prodeunte, hoc modo tum securissimè æger superstes futurus est, tum citissimè citra dolorem abscessus conquiescet, quòd si neque sputum rectè excernatur, neque vrina bonam subsidentiā habere videatur, periculum est ne articulo claudicat æger aut ei multum negotii exhibeatur. Si verò dispareant abscessus & intrò recurrant, sputo non prodeunte, & detinente febre, gravis morbi periculum, & delirii & mortis ægro imminet. Ex suppuratis autem quos pulmonum morbi concitarunt, ferè seniores moriuntur,

at ex cæteris suppurationibus juniores potius intereunt. At lumborum & inferiorum partium dolores qui cum febre affligunt, si relictis inferioribus ad septum transversum transeunt, exitiales sunt admodum. Ad alia igitur signa animum adhibere oportet, siquidem ex pravis signis quidpiam appareat, omni spe destitutus est æger. Cum verò suppurati videntur, quibus quidam putum pus est & album, & minimè fœtidum, si servantur, at quibus suberuentum & cœnosum, moriuntur. Quòd si irrumpente ad septum transversum morbo reliqua signa minimè prava se ostenderint, hunc suppuratum fore magna spes est, ex l. præn.

Vide dolores capitis, excretiones, pleuritidem, pus, tabem.

### STRANGURIA.

Ad recti intestini & vteri inflammationem purulentosque renes accedit stranguria, iecore inflammatione laborante intervenit singultus, aph. 58. sect. 5.

Vide ileum, dysuriam.

### STATVS.

Vide jacere.

### STERNUTAMENTVM.

Sternutamentum cietur ex capite cerebro excalesceto, perhumectato spatio in capite inani, aer enim intus contentus foràs erumpit, strepit autem quia per angustum ipsi est exitus, aph. 51. sec. 7.

Vide

Vide pulmonem, hysterica pluritidem.

### STRIDOR.

Vide dentes.

### SVDOR.

Sudores febricitantibus boni qui manare cœperint die 3. 5. 7. 9. 11. 14. 17. 21. 27. 31. 34. hi enim sudores morbos indicant, qui secus evenierint laborem & morbi longitudinem aut ejusdem reditum significant, aph. 36. sec. 4.

Frigidi sudores cum febre acuta, mortem, cum mitiore verò morbi longitudinem significant, aph. 37. sec. 4.

Qua corporis parte sudor, ibi morbus, aph. 38. sec. 4.

Sudor multus & per somnum factus, copiosiore cibo corpus uti significat; quòd si parcius epulanti hoc accadat, vacuatione indigere sciendum est, aph. 41. sec. 4.

Sudor multus frigidus calidusve semper fluens, frigidus graviores, calidus minorem morbum significat, aph. 42. sec. 4.

Febricitanti sudor superveniens febre ægrotum non deficiente, malum, prorogatur enim morbus, & plus humiditatis inesse significat, aph. 56. sec. 4.

Sudor optimus sanè qui febrem die judicatorio tollit, utilis autem & qui allevat. Malus verò frigidus, & ubi caput duntaxat & cervix insudat, nam & temporis diuturnitatem, & periculum denuntiat, 572. sec. 2. co.



Sudor autem frigidus, cum acuta quidem febre exitium, cum mitiore verò diuturnum fore morbum significat, 573. sec. 2. co.

Sudor unà cum febre, acuto morbo virgente, malus, 574. sec. 2. co.

Sudores autem partium seorsim quidem procedentes juvant, partim verò uniuersim effusi, & quæ affatim fiunt sanguinis detractiones, nocent, 560. sec. 2. l. 2. co.

Qui crebrò tenuiter exudant & subinde rigent, ii perniciosè habent, & tandem sub mortem suppurati & alvum conturbatam habereprehenduntur, 10. sec. 2. co.

Ex tenuibus sudoribus pervigiles, ad calorem revocati, malè habent, 41. sec. 2. co.

In febre tenuiter exudantes, malignè habent, 42. sec. 2. co.

In præcipitibus malis tenues cica caput maximè suboriri sudores, & corporis incontinentia quadam jactari, malum indicat, cum verò præcipue perniciēs intenditur, si ista cum vrinis nigris congeriant, & spiritus magnus & concitatus adfuerit, 49. sec. 2. co.

Qui ex sudoribus perfrigerantur, ac celeriter recalescunt, malè habere iudicantur, 52. sec. 2. co.

Qui in gravibus malis tenuiter exudant, & quadam corporis incontinentia jactantur, malè habent, 53. sec. 2. co.

Qui per febres tenuiter exudant cum capitis

pitis dolore & alvo intercepta, ad convulsiones proni sunt, 154. sec. 2. co. Idem repetit, 115. l. 1. præd.

Tenuiter exudantes cum capitis dolore & alvo intercepta, ad convulsiones proni sunt, 177. sec. 2. co.

Sudor in febribus acutis multus & copiosus, damno est, 38. sec. 2. l. 1. præd.

Quibus circa initia tenues suboriuntur sudores & vrina coctæ emittuntur cum magna totius æstuatione, si præter rationem perfrigescant, & rursus celeriter peruruntur, & torpore, sopore, aut convulsione tenentur, ii perniciosè affecti sunt, 102. sec. 2. l. 1. præd.

Sudores optimi quidem per omnes morbos acutos qui diebus iudicatoriis contingunt, & penitus febre liberant: boni verò quicunque toto corpore oriuntur, faciuntque ut ager morbum facilius ferre videatur. At qui nihil tale efficiunt, minimè sunt vitales, pessimi autem frigidi, quique circa caput tantummodo, faciem & cervicem exoriuntur. Hi namque cum acuta febre mortem, cum mitiore verò morbi longitudinem præstant, quique per totum corpus eodem modo atque ex capite fiunt. Qui verò nulli formam referunt, & circa cervicem tantum oboriantur pravi, boni autem qui guttatim & cum exhalatione fiunt. Atque hoc in totum de sudoribus animadvertere oportet.

ter, quod nonnulli quidem ex corporis dissolutione, quidam etiam ex inflammationis vehementia contingunt, 45. prænot.

Vide febres, horrorem, rigorem:

### SVFFITVS.

Suffitus aromatum muliebris educit, ad alia verò multa utilis esset, nisi capitis ingereret gravitatem, aph. 28. sec. 5.

### SVFFOCATIO.

Si febre detento suffocatio derepente supervenerit, nullo in faucibus apparente tumore, est mortiferum, aph. 34. sec. 4.

Per febrem strangulati, & devorare non posse extra tumorem, malum est, 277. sec. 2. coac.

### SVRDITAS.

Qui surditate cum capitis gravitate ac præcordiorum contentione vexatur, si oculorum acies perturbatur in iis sanguinis & natis fluxum sperare oportet, 195. sec. 2. co.

In acuta febre aures obrute vehementem insaniam portendunt, 197. sec. 2. co.

In surditate ac torpore ex natis stillatio molestiam quandam exhibet, iis vomitio ac alvi perturbatio conveniet, 208. sec. 2. coac.

Surditatem in febribus, enatum sanguinis & natis profluvium, ac alvi perturbatio tollit, 210. sec. 2. coac.

In præcipitibus & turbulentis morbis obve-

obveniens surditas malo est, quin & in longis morbis malum portendit, ac in his ad cœdices labores convexit, 190. sec. 2. co.

In febribus enata surditas alvum romoratur & sistit, 191. sec. 2. co.

Surditas cum urinis prærubris, non subsideat & sublimamentis, mentis emotionem minatur. In his morbo regio corripit malum est. Quin etiam malo est, ex morbo regio fatuitas, aut stupiditas. His quidem vox deficere solet absque sensuum læsione, quin & alvus nunquam affatim prorumpit: quale quid Herminippo contigit & mortuus est, 32. sec. 2. l. i. præd.

In præcipitibus & turbulentis morbis obveniens surditas perniciem minatur, 33. l. i. præd.

Ex surditate abscessus ad aures contingere consentaneum est, præsertim verò si implacitas quedam aut inquietas corporis iactatio succedat. Ac inter hos in iis qui sopore detinentur, ista magis sperare oportet, 199. sec. 2. l. i. præd.

Surditas pus intro colligentibus suborta sanguinolentam dejectionem denuntiat. His sub mortem nigra egeruntur, 420. sec. 2. coac.

Vide, dolores capitis, excrementa, febres.

### SVSPIRIA.

In morbis acutis cum febre quasi gementium suspiria, mala, aph. 54. sec. 6.

## TABES &amp; TABIDI.

Tabes iis maximè ætatibus fit quæ à 18. adfunt ad 34. aph. 9. f. 5.

Qui tabe vexantur, si sputum quod extrufiunt carbonibus injectum olet graviter & capilli diffuunt, perniciosum signum, aph. 11. sec. 5.

Quibus per tabem capilli defluunt, iis fluxione alvi superveniente, in propinquo mors, aph. 12. sec. 5.

Si tabe detento profluvium alvi superveniat, perniciosum, aph. 14. sec. 5.

Tabidi quorum sputum igni impositum gravem nidorem redolet, & capilli è capite diffuunt, moriuntur, 434. sec. 2. l. 2. co.

Tabidis in aquam marinam expuentibus, si pus fundum petis, celerem perniciem denunciat, sit autem marina aqua in æneo vase, 43. sec. 2. co.

Sputorum retentiones in tabescentibus mentem ad deliria verba commovent, in his sanguinis profluvium per ora venatum in ano sanguinem fundere solita existere posse spes est, 437. sec. 2. l. 2. co.

Tabes maximè periculose sunt, quæ ex eruptione venarum crassarum & ex capitis distillatione contingunt, 438. sec. 2. co.

Tabes maximè periclitantur ætates ab anno 18. ad 35. 439. sec. 2. co.

In tabidis pruritum sentientia corpora alvi suppressione, malo sunt, 440. sec. 2.

sect. 2. l. 2. coac.

In naturis ad tabem promptè comparatis si fluxiones ad gingivas & dentes cum febre compareant, malum denuntiant, 441. sect. 2. coac.

Præcordia in tumorem sublata omnibus quidem mala sunt, præferrim verò his qui à longo intervallo tabidi sunt, 422. sect. 2. l. 2. coac.

Vide gravidam respirationem, sputum, ætempus.

## TEMPVS &amp; TEMPESTAS.

Quotidianæ tempestates Aquiloniæ cogunt corpora firmanque, mobilia, item expeditioraque, & coloratiora & auditu valentiora reddunt, alvum siccant, oculos mordent, & si pectus dolor aliquis priùs habuerit, exasperant, contrà austrinæ eadem solvunt & humectant, auditum hebetant, caput gravant, vertigines oculis, tarditatem & languorem corporibus adfuerunt, alvum humectant, aph. 17. sec. 3.

Affiduis imbris morbi ferè sunt, febres longæ, fluxiones alvi, putredines, epilepsie, apoplexiæ, anginæ, siccitatibus autem, morbi tabifici, ophthalmiæ, articulorum dolores, urinæ & intestinorum difficulrates, aph. 16. sec. 5.

Auster auditum hebetat, caligines visui obducit, caput gravat, corpori tarditatem & languorem conciliat, cum itaque is incre-



breſcit, talia invalidis accidunt. Contrà Aquilo tuſſes exaſperat, alvum indurat, vrinam ſupprimi, horrores excitat, lateris & pectoris dolores facit; hoc itaque dominante, talia infirmos expectare oportet, aph. 5. ſec. 3.

Cum æſtas ſit ſimilis veri, ſudores in febris multos expectare oportet, aph. 6. ſec. 3.

Æſtate verò ſuperiorum quoque nonnulli, & febres & continuæ, & ardentes, & tertianæ, plurimæ, quartanæ item & vomitiones, alvi profluvia, ophthalmiæ, aurium dolores, oris ulcerationes, genitalium putredines & lutationes, aph. 21. ſec. 3.

Autumno æſtivi etiam multi morbi & febres quartanæ & incertæ, lienes tumor, aqua inter cutem, tabes, vrinæ difficultas, inteſtinorum tum lævitas tum difficultas, coxæ dolores, angina, anhelatio, inteſtinorum parte quapiam coarctatio, epilepſia, iſania, melancholia, aph. 22. ſ. 3. Hyeme pleuritides, peripneumoniæ, lethargi, gravedines, raucitates, tuſſes, pectoris laterum & lumborum dolores, cephalalgia, vertigines, apoplexiæ, aph. 23. ſ. 3.

Vere iſania, melancholia, epilepſia, fluxiones ſanguinis, angina, gravedines, deſtillationes, tuſſes, lepra, impetigines, vitiligines & puſtulæ ulcerofæ, plurima tubercula, articularum dolores, aph. 20. ſec. 3.

Muta-

Mutationes temporum, potiffimum pariunt morbos, & in ipſis temporibus magnæ mutationes frigoris aut caloris cæteraquæ ad proportionem his ſimiliter, aph. 1. ſec. 3.

Naturarum quædam ad æſtatem, aliæ ad hiemem bene aut malè ſe habent, aph. 2. ſec. 3.

In temporibus cum eodem die, modò calor, modò frigus, autumnales morbi expectandi, aph. 4. ſec. 3.

Certis temporibus & ſuam tempeſtatem ſervantibus certi & tempeſtivi ac judicati faciles morbi ſunt, incertis autem & alienis incertæ quoque ægrotationes ſunt & ad judicandum difficiles, aph. 9. ſec. 3.

Magnis ſiccitatibus febres ſunt acutæ, quòd ſi annus talis eſſe pergat, qualem temporis ſtatim effecerit, tales ferè morbos expectare oportet, aph. 7. ſec. 3.

Autumno in univerſum morbi acutiſſimi & pernicioſiſſimi: verò autem ſaluberriſſimum & minimè exitioſum, aph. 6. ſec. 3.

Autumnus tabidis nocuus, aph. 30. ſec. 3.

Inter anni partes ſi hyems ſicca & aquilonia, verò pluvioſum & australe fuerit, æſtate necelle eſt febres acutas fieri, ophthalmias & dysenterias, mulieribus præſertim & vitis natura humilioribus, aph. 11. ſec. 3.

Contrà verò ſi australis hyems & pluvioſa & tepens fuerit, verò ſiccum & aquilonium, mulieres quibus partus in verò incidit

quavis occasione abortiunt: aut si pariant tam infimos & morbosos partus edunt ut vel statim ipsi intereant vel tenuis & valedudinarii vivunt. Ceteris dysenteriae & ophthalmiae siccae si int & senibus catarrhi perniciem brevi allaturi, aph. 12. sec. 3.

Aestate vero sicca & aquilonia, autumnopluvioso & australi, vehementes capitis dolores in hyeme & tussies, & raucitates, & gravedines, nonnullis etiam tabes expectanda, aphor. 13. sec. 3.

Aquilonio vero & sicco autumnopluvioso, hominibus natura humidis & mulieribus commoditas parabitur, alios ophthalmiae siccae, & febres partim acutae, partim longae, quosdam etiam melancholiae male habent, 14. sect. 3.

Ex tempestatibus anni, in universum siccitates assiduis imbris salubriores, & minime mortiferae, aph. 15. sec. 3.

Vide morbum, frigidum, febres, aetatem.

### TENESMVS.

Si praegnant tenesmus supervenerit, abortus est causa, aph. 27. sec. 7.

Vide excrementum.

### TESTICVL.

Testiculi pudendumque retractum, malum denuntiant, 494. sec. 2. co.

Quibus in tumorem sublato ventre, pudendum rubor occupavit, mulieribus, purgamentum.

mentis albis humidis subito procedentibus, diuturnis febribus, intereunt, 530. sec. 2. co.

### TORPOR.

Torpor in contraria celeriter permixtus perniciem denuntiat, 56. sec. 2 l. 2. co.

Torpores & stupores praeter consuetudinem evenientes, adfuturam syderationem denuntiant, 47. sec. 2. co.

Vbi rigori torpor succedit, mentis alienatio significatur, 35. l. 1. praed.

### TVMOR.

Manuum ac pedum tumores cum rubore, perniciem denuntiant, 63. f. 2. l. 2. co.

Parvi in longis morbis aurium tumores, si subinde sanguis e naribus profluat, & tenebriosa vertigo excutetur, exitio sunt, 104. sec. 1. co.

Molles & doloris expertes tumores longiore spatio finiuntur, nec ita grave periculum afferunt. Quod si neque intra 60. dies desinunt ac febris detinet, suppurationem expectare oportet. Idem vero haud secus quam in praecordiis perpenditur in tumoribus qui circa ventrem sunt, nisi quod hi quam illi minus suppurant, minimum vero qui sub umbilico constituuntur. Atque hi quidem in tunica concluduntur, illi autem sursum diffunduntur. Ex quibus etiam mortem magis afferunt, quicumque intro rumuntur. Reliquas autem suppurationes quae

quidem foràs erumpunt, maximè sanè con-  
ducit in quam exiguum & acutissimum lo-  
cum colligi, quæ autem intrò vergunt, ut  
neque tumore, neque dolore, neque colore,  
manifestas foris notas præbent, quod verò con-  
trà fit, pessimum est. Harum autem quæ-  
dam propter puris crassitudinem nullam de  
se significationem ostendunt. At recentes  
præcordiorum tumores, inflammationis ex-  
pertes, ac dolores qui in ipsis fiunt, murmur  
circa præcordia exortum solvit, sed potissi-  
mum quidem ubi per urinas ac dejectiones  
elapsum fuerit, sin minus ubi etiam hoc ip-  
sum transmissum fuerit, quin etiam ad in-  
fernas sedes devolutum juvat, 281. sec. 2. co.

Ex præcordiorum tumore, biliosis spiratio  
magna, & febris acuta, tubercula ad aures  
fulsciat, 290. sec. 2. co.

Temerati ventris tumores in morbis son-  
gis convulsiones afferunt, 86. sec. 2. co.

Molles autem tumores & doloris expertes  
dijunctique cedentes, longiores judicationes  
accipiunt, illisque minimè graves sunt. Quod  
si intra dies sexaginta neque febris cesserit, ne-  
que tumor sublevis, fore suppurationem hoc  
loco reliquo ventre eodem modo significat.  
Itaque tumores dolentes, duri & magni peri-  
culum mortis intra paucos dies affore signifi-  
cant. Molles verò & minimè dolentes qui-  
que digito pressi cedunt, illis diuturniores  
esse solent. At ventris tumores minus abscen-  
dere

dere nati sunt, quæ in præcordia erumpunt,  
tumor, minimè verò in præcordia erumpunt. In-  
pus vertuntur. Sed ex tumore præcordiorum  
sanguinis eruptio maximè in præcordia erumpit.  
Longorum verò omnium in his præcordiorum  
tumorum suppurationes in coniectura sunt.  
adhuc bene suppurationem an ostendat, de  
proveniunt observatio facienda est. Quæ  
quidem foràs vertuntur, optimæ sunt ubi  
parvæ sunt, & quam maximè foràs sefuntur.  
& in acutum tendunt. Pessimæ verò quæ  
magnæ sunt & late, minimeque in mucro-  
nem attolluntur. At quæ intrò rumpuntur,  
optimæ, ubi nihil cum externa sede commu-  
nicant, in sese contrahuntur, nullo dolore  
afficiunt, totaque regio externa unius colo-  
ris apparer, ex lib. præh. 1. 1. 1. 1. 1.

Tumores humefcente alvo, sublati in ali-  
tum cum doloribus, malo sunt. Alvo verò  
suppressa, dum ne quid aliud innovetur, cole-  
riter rumpuntur, maligniores sunt, in his  
vomitus prævi & maligni, 623. sec. 2. co.

Articulorum tumores & colores absque  
ulcere & podagricas convulsiones magna ex  
parte, frigida largè affusa levat, & extenuat,  
solvitque dolorem, nam medicus torpor do-  
loris solvendi vim habet, aph. 25. sec. 5.

Quibus sunt cum ulceribus tumores cons-  
picui, si non admodum convelluntur, nec  
insaniunt: quibus verò repente evanescunt,  
si quidem postica parte affectum se, conv.



fiones & tetani accidunt, si verò à fronte, insania lateris dolor acutus, empyema & dysenteria, si rubicundi fuerit tumores, aphor. 65. sec. 5.

Si in magnis vulneribus & pravis tumor non appareat, ingens malum, aph. 69. sec. 5.

Incontenta bona, contenta verò cruda mala, aph. 67. sec. 5.

In diuturnis morbis suppurati ad aures tumores nisi pus admodum album ac sine odore reddant exitium, præcipueque mulieribus adferunt, 206. sec. 2. 1. 2. co.

Vide anginam, febres, oculos, hypocondr. hydropem.

### TVBERCVLA.

A tuberculi introrsum eruptione, oxolusio, vomitio, & animi defectio fit, aph. 8. sec. 7.

Quos febres longæ exercent, iis tubercula ad articulos vel labores fiunt, aph. 44. sect. 4. Idem repetit, aphor. 53. & 64. sec. 7.

Quibus tubercula ad articulos, vel labores post febres fiunt, si cibariis pluribus utuntur, aph. 45. sec. 4.

Quibus in meatu urinario generatur tuberculum, ubi suppuraverit, & eruperit, doloris fit solutio, aph. 57. sec. 7. Idem repetit, aph. 82. sec. 4.

Quæ cum dolore exoriuntur ad aures tubercula

bercula, perniciem minantur, 199. sec. 2. co.

Tubercula ad aures excitata in leviter syderatis, malo sunt, 202. sec. 2. co.

In diuturnis morbis non suppurantia guttum tubercula mortem adferunt, iis autem alvi ferè demittuntur, quin & in his considerandum in quibus speramus abscessus circa aures futuros, num ex capite doleant, num superiorum partium tenuibus sudoribus dissoluant, nunquid etiam subinde novum rigorem sentiant, an fortè etiam alvi assatim perumpant, aut aliquo sopore detineantur. Videndum quoque num & in his vrina diluta cum sublimibus quibusdam in medio suspensis albidis & aliquantulum variantia exalbiantia, aut graveolentia appareant, 203. sec. 2. co.

In prætoridiis jam longo intervallo afflictis & graveolente alvo, subnatum ad aures tuberculum mortem adfert, 292. sec. 2. co.

Quibus tuberculum ad vesicam adnascitur, urinæ difficultatem adferens, iis quivis corporis habitus negotium facessit, cujus quidem solutio contingit per puris eruptionem, 473. sec. 2. co.

Vide anginam, ætatem, dolorem præcordiorum.

### TVSSIS.

Tusses cum crebra salivatiqne, abscessum

circa aures emolliunt, 167. sec. 2. l. 2. præd.  
Idem repetit. 204. sec. 2. l. 2. co.

Quibus siccae tussiles paululum irritantes in febris ardentibus perseverant, si non admodum siticulosi sunt, aph. 54. sec. 4.

Qui spumantem sanguinem exussunt, iis ex pulmone educitur, aph. 13. sec. 5.

Vide hydropem, tabem, sputum.

### TREMOR.

Qui cum furiosa mentis emotione tremuli evadunt, malignè habent, 88. sec. 2. co.

Quibus capitis ac cervicis dolor & totius corporis impotentia cum tremore adest, ab iis sanguinis eruptio liberat, quin etiam ista tempore dissolvuntur, 152. sec. 2. l. 1. præd.

Timores senioribus in febre contingunt, atque ubi apparent calculi, fortasse per vias excluduntur, 90. sec. 2. co.

Vide dementia, rigorem, frigus.

### TINNITVS.

Aurium sonitus cum visus hebetudine & ad aures gravitatis sensus, mentis excessum aut sanguis ex naribus profluvium præfigunt, 194. sec. 2. co.

In præcipitibus morbis murmur edentes ac tintientes aures, mortem prænuntiant, 193. sec. 2. co.

Aures frigida, pellucida, contractæque perniciem minantur, 192. sec. 2. co.

Vide

Vide dolorem auris & capitis.

### TORMINA.

Tormina ea quidem omnia mala sunt, si cum febre quidem incidunt, aut variis alvicrementis, aut jecoris inflammatione, aut præcordiorum, aut ventris aut quæcunque doloribus eruciant, aut cibis cohærent, si timique inferunt. At celerrimè is perit, quem maxima pars horum malorum occupat. Hinc verò plurimum inest spei, cui horum paucissima adfunt. Itaque morbus præcipue pueros à quinto anno perimit, & qui eum superant ad decimum usque, cætera ætates tutiores sunt. Utilia autem tormina sunt quæ his malis, non affligunt. At ubi sanguis & frigmenta per alvum rejecta fuerint 7. die desinunt, aut 14. aut 20. aut 40. aut intra hoc tempus. Hujusmodi namque dejectiones etiam eos qui ante fuerunt in corporibus morbos tollunt. Inveteratos quidem spatio temporis majore, recentes verò etiam paucis diebus levare possunt: Siquidem & prægnantes ipsæ etiam plerumque ad partum supersunt, & ex parte; foetumque conservant, etiam si per multos menses sanguis & frigmenta per alvum secedunt, nisi si dolore affligantur, aut aliquod ex malis signis quæ in difficultatibus intestinorum adesse scripta sunt, accesserit. Quod si horum aliquod adesse visum fuerit, & foetui perniciem ac

prægnanti periculum denunciat, nisi post factus absolutionem, aut secundarum dimissionem, ipsa tormina, eodem die, non multum post cessaverint; ex l. 2. præd.

### VARICES.

Vide calvum.

### VENTER.

Vide excrementa.

### VERTIGO.

Tenebricosas vertigines circa initia sanguinis ex naribus fluxio solvit, 341. sec. 2. coac.

Ex venis in ano fundere solitis aliquantulum apparentibus, tenebricosæ vertigines obortæ, parvam, ac sensum factam partium resolutionem indicant, ex quo liberat venæ sectio, & quicquid huiusmodi apparere solet, mali aliquid denuntiat, 346. sec. 2. co.

Febres vertiginosæ, & cum tenuis intestini morbo, & sine hoc, perniciem intentant, 106. sec. 2. co.

### VMBILICVM.

Vide dolorem vmbilici.

### VERMES.

Lumbricis tenuibus, & longis qui ascari-des dicuntur in capitis dolore vexatis consequente surditate, & sopore, tubercula ad aures excitantur, 165. sec. 2. co.

### VEN-

### VENTRICVLI MORSVS.

Vide febres, hæmorrhagiam.

### VICTVS.

Victus tenuis & exquisitus, & in morbis longis semper, & in acutis, ubi non convenit, parum tutus, rursusque victus qui ad summam pervenerit tenuitatem, molestus. Siquidem quæ ad summam plenitudinem perductæ sunt repletiones, molestæ, aph. 4. sec. 1.

In tenui victu peccant ægroti, quo fit ut magis lædantur. Siquidem quodvis peccatum gravius hic quam in paulo pleniori victu solet esse. Eadem de causa sanis etiam valde tenuis staturaque & exquisita victus ratio parum tuta, quia errata gravius ferunt, quare tenuis exactusque victus paulo pleniori existit maxima ex parte periculosior, aph. 5. sec. 8.

Cum itaque morbus peracutus est, extremos protinus labores habet summeque tenuissimo victu est vtendum; quum verò non est, sed pleniorum victum licet exhibere, tantum de extrema victus tenuis ratione remittendum, quanto extremis morbus fuit remissior, aph. 7. sec. 1.

Cum morbi vis est maxima tunc vel tenuissimo victu est vtendum, aph. 8. sec. 1.

Sed ex ægroti conjecturam facere oportet, an cum præscripto victu persistet ad



morbi usque rigorem, an prius deficiat, imparque cum tali victu succumbat, quam cedat morbus & obtundatur, aph. 9. sec. 1.

Quibus itaque vigor statim futurus est, tenuiter statim alere oportet: quibus autem posterius, & in ipso vigoris tempore, & paulo sub ipsum de victu demendum, antea vero plenius alendum ut agrotus perferre queat, aph. 10. si. 1.

In ipsis tamen exacerbationibus cibum admittere oportet; nam præbere noxium, & cum per circuitus redeunt morbi, in ipsis accessionibus abstinendum, aph. 11. sec. 1.

Accessiones vero, & constitutiones morborum indicabunt, tum morbi ipsi, tum tempora anni, tum periodorum proportionis inter se observatio, sive ex quoridie, sive alternis, sive maiore intervallo fiant. Sed ex iis quæ postea apparent, indicia sumuntur, velut in pleuritide, sputum si statim initio appareat, brevem fore denuntiat, si vero posterius conspiciatur, longam, quin etiam urinx, alvi feces, sudores, & iudicatu faciles, aut difficiles, & breves, aut longos morbos fore, quum superveniunt, demonstrant, aph. 12. sec. 1.

Ieiunium senes non decrepiti ferunt facillime, secundum hos qui constantem ætatem agunt, minus adolescentes, minime omnium pueri, atque inter eos maxime qui ætiore sunt, & vividioris ingenio præditi, aph. 13.

aph. 13. sec. 1.

Qui crescunt nativum calidum habent plurimum, copioso itaque cum egeant alimento abunde ipsis suppeditare oportet, alioqui corpus consumitur. In senibus vero inest calidi parum, paucis propterea succendiculis egent; siquidem multis extinguitur. Ob eandem causam, nec senibus febres perinde acutæ sunt, frigidum enim eorum corpus, aph. 14. sec. 1.

Ventres hieme, ac vere natura calidissimi & somni longissimi. Per ea igitur tempora plus cibi dare oportet, siquidem plus nativi caloris habent, quo fit ut copiosiore alimento egeant. Argumento sunt ætates & athletæ, aph. 15. sect. 1.

Victus humidus cum febricitantibus omnibus utilis, tum pueris maxime, atque aliis qui tali victu uti consueverunt, aphor. 16. sect. 1.

Quibus etiam semelne an bis & plus, minusve & gradatim præbere cibum conveniat, spectandum. Dandum etenim aliquid temporis, regioni, ætati, & consuetudini, aph. 17. sect. 1.

Æstate & autumno cibi copiam ferunt difficillime, hyeme facillime, vere minus, aph. 18. sect. 1.

Quibus per statos circuitus accessiones sunt, nihil dare, nec cogere, sed demere ante iudicationes, aph. 19. sec. 1.

Quæ longo tempore extenuata sunt corpora sensim reficere oportet, quæ verò brevi, breviter, aph. 7. sec.

Impura corpora quo magis nutriveris, eo magis læseris, aph. 10. sec. 2.

Facilius est potu refici quam cibo, aph. 11. Vide cibum

## VISVS.

Vide odorem.

## VITILIGINES.

Vide impetigines.

## VIGILIA.

Vide convulsionem.

## VITA.

Vide crism.

## VER.

Vide tempus.

## VOX.

Quibus voces cum dolore deficiunt, et tandem non sine summo cruciatu vitam cum morte commutant, 149. sec. 2. co.

Vocis defectiones cum virium exolutione ac alto sopore, quem catochon vocant, perniciem minantur, 150. sec. 2. co.

Contractæ voces post medicamento purgantis potum considerandæ num pravæ sint. Horum plerisque tenues sudores disfluunt, & alvi humectantur, 151. sec. 2. co.

In vocis defectione respiratio veluti iis qui suffocantur conspicuè elata, & visui exposita, perniciem minatur: animadvertendum

dum etiam est num delirium prænuntiet, 152. sec. 2. co. Idem repetit, 15. lib. 1. præd.

Vocis defectiones rigore subinde correptis lethales, sereque in capitis dolores consistari solent, 155. sec. 2. co.

Vocis defectiones cum virium exolutione in acuta febre sine sudore, sunt quidem lethales, cum sudore verò, minùs, ac temporis diurnitas significatur. Ac fortasse quidem quibus ex morbi reversione tale quid contingit securissimè habent, ex iis autem maximè in periculo versantur quibus sanguis ex naribus profuit, & alvi effunduntur, 156. sec. 2. co.

Vox acuta ejulabunda ac oculorum hebetudo convulsionem minatur, his dolores ad inferiores partes demissi, toleratu sunt faciles, 157. sec. 2. co.

Crebræ, & quæ cum sopore quodam consistunt vocis defectiones, tabem denuntiant, 159. sec. 2. co.

Quos vox cum febre, & absque ulla iudicatione deficit, et tremuli, 147. sec. 2. co.

Vocis defectiones in febre quæ convulsionis speciem præ se ferunt, & in mentis emotionem cum silentio desinunt, perniciem ostendant, 148. sec. 2. co. Idem repetit, 54. lib. 1. præd.

Quæ ex rigore fiunt vocis defectiones, tremore solvantur atque eos qui subinde novo rigore corripiuntur succedentes tremor-

res judicant. 27. sec. 2. co.

Quibus vox in morbis acuta redditur, iis præcordia intrò trahuntur, & tendunt, 45. l. 1. prædict.

Vox acuta & stridula, malo est, 47. l. 1. præd.

Vbi post vomitum anxiosum vox stridula est, oculi squalidi, & pulvere obfusi, insania portenditur, non secus ac Hermorygæ conjugii accidit, quæ vehementi insania correpta, voce defecta interiit, 17. sec. 1. præd.

Vocis defectiones cum singultu pessimæ, 23. sec. 2. l. 1. præd.

Vocis defectiones cum virium exolutione pessimæ, 24. l. 1. præd.

Vide convulsionem.

### VOMITVS.

Qui sanguinem vomunt, si sine febre accidat, salutare est; si cum febre malum, curatio verò refrigerandi, & abstergerendi vitiis habentibus perficitur, aph. 37. sec. 7.

Vomitus virulenti, & æruginosi in capitis doloribus cum surditate, & insomnia, promptam insaniam significant, 169. sec. 2. co. Idem reperit. 10. l. 1. præd.

Vomitio maximè est innoxia, quæ pituita & bile permixta est, dum ne admodum copiosa sit. At synceriores vomitiones deteriores sunt. Viridis quoque vomitus & niger, & lividus, vitiosus est; quod si omnes colores idem vomat, exitiale est. Colerri-

um

um autem exitium indicat lividus, & mali odoris: mortem quoque adfert ruber vomitus, adque præcipuè si cum majore conatu, & dolore contingat, 556. sec. 2. co.

Vomitiones exiguæ, biliosæ; malum denuntiant, cum verò præcipuè si pervigilio conflentur ægri, 558. sec. 2. co.

Vomitus parvi, & frequenter repetentes, beliosi, synceri, mali sunt in copiosa ventris subductione, & intenso lumborum dolore, 560. sec. 2. co.

Vbi ex vomitu anxietudo occupat, vox stridula est, oculi pulvere obfusi, insania portenditur, ac tales vehementi insania correpti voce defecti intereunt, 561. sec. 2. co.

In vomitu cum qui siti prematur sitis experiri esse, malum est, 562. sec. 2. co.

Crebrò repetentes iisdem perseverantibus casibus vomitiones, ad judicationem nigra vomitione refundunt, quin etiam tremulos ægros faciunt, 571. l. 2. co.

Vomitiones variz malæ sunt, præsertim si continentes, & assiduæ prodierint, 60. l. 2. l. 1. præd.

Vomitiones synceræ, & cum angore aut incontinenti corporis jactatione, dammandæ sunt, 62. sec. 2. l. 1. præd.

Vomitiones exiguæ, biliosæ malæ sunt, cum verò potissimum si pervigilio conflentur ægri, in quibus stillans nasus perniciem minatur, 79. sec. 2. l. 1. prædict.



A sanguinis vomitione tabes & puris superne purgatio, aph. 78. sec. 2.

Vomitus perquam est utilis qui bilem pituita, quam maximè permixtam habet, ac neque admodum crassus est, neque multus. Qui enim synceriores, pejores sunt. Si verò quod vomitione rejicitur porrum colore referat, aut lividum aut nigrum fuerit, quisquis horum colorum adfuerit, praeus existimandus est. Quod si eodem vomitu omnes hi colores rejiciantur, id exitiale est admodum. At lividus vomitus si graviter olet, celerrimam mortem denuntiat ex l. praenotionum.

Bilis vomitus vulnere succedens malum denuntiat, praecipueque in capitis vulneribus, 507. sec. 2. co.

Qui spumantem sanguinem evomunt partibus infra septum transversum dolorem nequaquam sentientibus, iis ex pulmone vomitio. At quibus quidem insignis in eo venae ruptio fit, copiosius vomitione rejicitur periculumque imminet. Quibus verò minor, minus rejiciunt, & majorem sanitatem promittunt, 433. sec. 2. co.

Qui sanguinem evomunt cum febre multa, dolorem ad mamam, thoracem, & dorsum, quibus, inquam, haec insunt omnia, ii brevi moriuntur, quibus autem non omnia, neque intense adsunt, tardius, ad summum autem diebus 14. inflammationem concipiunt,

piunt, 426. sect. 2. co.

Mulier sanguinem evoment mensstruis erumpentibus solutio fit, aph. 32. sec. 5.

Vide alvum, dysenteriam, excrementa, haemorrhagiam, tabem, sanguinem.

### VVLNVS & VLCVS.

Vbi febricitanti fauces exulcerantur, si aliunde quoque ex grauioribus signis aliquod affuerit, periculum denuntiandum est, 276. sec. 2. co.

Qui ex vulnere subinde rigentes sanguinem profundunt, ii malignè habent ac inter loquendum derepente moriuntur, 328. sec. 2. l. 2. co.

In tenuibus intestinis si quod dissectum fuerit, non coalescit, 502. sec. 2. co.

Serpentia oris ulcera in praegnantibus bono non sunt, ac fortè etiam alvi humectantur, 514. sec. 2. co. Idem repetit, 544.

In uterum jam gerentibus, fluxiones serpentia oris ulcera cum dolore excitantes malum denunciant, in iis sanguinis per ora venarum profluvium pessimum. 529. sec. 2. co.

Si in magnis vulneribus & pravis, tumor non appareat, ingens malum, aph. 66. sec. 5.

Circumglabra ulcera, maligna, aph. 4. sec. 6.

Aqua inter cutem laborantibus exorta in corpore ulcera non faciliè sanantur, aph. 8. sec. 6.

Si vlcera annua, aut etiam diuturniora fiant, os abscedere necesse est, & cicatrices cavas fieri, aph. 45. sec. 6.

Vulnere in thorace accepto, siquidem externa vulneris pars sanitatem receperit, interna verò nequaquam, suppurationis periculum impendit, quibus autem interni vulneris cicatrix debilis effecta est, promptè rescinditur. 430. sec. 2. co.

Quibus ex vulnere corporis impotentia accidit, si quidem febre citra rigorem oborta fani evadunt, alioqui dextra aut sinistra parte syderantur, 477. sec. 2. l. 2. co.

Vlcus lividum, & aridum aut pallidum effectum, mortem indicat, 496. sec. 2. co.

Ex cerebri vulnere febris ut plurimum ac bilis vomitus succedit, & corporis resolutio, itque perniciosè habent, 500. sec. 2. l. 2. co.

Serpentia vlcera supra inguina ad laterum inanitatem, ad pubem enata, male affectam alvum denuntiant, 628. sec. 2. co.

Ex vulnere autem ferè mors contingit, si cui vulneratum fuerit cerebrum aut spinalis medulla, aut jecur, aut septum transversum, vel cor, aut vesica aut quædam grandis vena. Mors quoque subit, si in arteriam & pulmones insignes valde plagæ confictæ sunt, ita ut percussio pulmone minor sit qui per os prodit spiritus quàm qui per venas excidit. Intereunt verò quibus nervi interiores, sive tenuis

tenuis aliquis sive crassus vulnus acceperit. Si plaga transversa fuerit, & magna; quòd si parva, & recta, nonnulli periculo eximuntur. Minimè verò ab his vulneribus mors impendit quæ in corporis partes, in quibus hæc non sunt, aut ab his quàm longissimè absum, infligentur. 509. sec. 2. co.

At in vulneribus quæ in supercilium, aut paulo altius inferuntur, visus acies obtunditur; at quo vulnus recentius est, eo magis vident, inveterascente autem aut tardare cicatrice magis obtundi solent, 510. sec. 2. co.

Ab ossis vulnere desipientia, si in vacuum usque penetraverit, aph. 24. sec. 7.

Vlcera qui nosse volet qualem quæque exitum habitura sint, is imprimis quidem hominum naturas animadvertere debet, quænam ad viscera melius, quænam etiam deterius affectæ sunt, deinde ætates in quibus sua cuiusque generis vlcera non faciliè proficiantur. Locos etiam corporis in considerationem adhibere, quantum alii aliis præstent. At præcipuè quænam horum quique bona, malæ accedunt nosse debet. His siquidem omnibus cognitis, quænam cuiusque eventu futura sint faciliè assequetur, neque existimandum est enim qui hæc non cognoverit quinam futuri sint vlcerum exitus perspicere posse, corporis autem naturæ probandæ sunt, leves moderatæ, firmis vis-

ceribus, præditæ, neque admodum carnosæ, neque duræ, tum quæ colore sunt albo, aut nigro, aut rubro, hæ etenim omnes probantur si puræ sunt. Deterius est, si ex pallido mixtum, aut lividum, aut pallidum colorem habeant. Quæ verò naturæ supra positis adversantur, eas deteriores esse constat, ex l. 2. præd.

Vlcus sive ante morbum, sive in morbo natum sit, nosse oportet. Nam si periturus æger est, ante mortem, lividum & siccum, aut pallidum & siccum erit, ex l. prænot.

Vide convulsionem.

### VMBILICVM.

Vide dolores vmbilici.

### VRINA.

Quibus non sine febre vrinæ sunt crassæ, grumosæ, & paucae, si ab his tenues & copiosæ meantur, prosunt; maximè verò tales redduntur in quibus statim ab initio, vel non ita multo post sedimentum apparuerit, aph. 69. sect. 4.

Vrinæ tenues nubeculam quandam in medio assumentes rigorem denuntiant, 532. sec. 2. co.

Quibus per febres vrinæ turbatæ quales iumentorum, iis dolor capitis, vel adest, vel aderit, aph. 70. sec. 4.

Quibus die 7. futura crisis est. iis vrina rubram die 4. nubeculam habet cæteraque præ-

ratio-

ratione, aph. 71. sec. 4.

Quibus pellucidæ & albæ sunt urinæ malæ, maximè verò si in phreniticis appareant, aph. 72. sec. 4.

Vbi spes est ad articulos abscessum iri, abscessu liberat urina crassa, & alba reddita, quales in febribus laboriosis 4. die quibusdam exire incipit, quòd si ex naribus etiam sanguis proflexerit, brevi admodum solutio fit, aph. 74. sec. 4.

Quibus cum urina crassa exiguae carunculae aut veluti pili exeunt, his à renibus excernitur, aph. 76. sect. 4.

Quibus cum urina crassa surfaracea quædam exeunt, his vesica scabie laborat, aph. 77. sect. 4.

Si quis sanguinem aut grumos meiat, aut urinam guttatim emitrat, dolore ad hypogastrium & perinæum pertinente, ad vesicam loca laborant, aphor. 80. sect. 4.

Si quis sanguinem aut pus, aut squamulas meiat, & gravis odor adit, vesicæ exulceratio significatur, aph. 81. sec. 4.

Mictus noctu plurimus parvam dejectionem significat, aph. 83. sec. 4.

Difficultatem urinæ phlebotomia solvit, secare verò interiores, aph. 36. sec. 6.

Quibus per febres in urinis sedimenta crassiorem farinam referunt, longam in valetudinem fore significat, aph. 31. sect. 7.

Quibus in urinis biliosa sedimenta, sed su-



pra tenuia apparuerint, acutum morbum significat, aphor. 32. sec. 7.

Quibus diversæ sunt urinæ, iis vehementes fit in corpore turbatio, aph. 33. sec. 7.

Quibus in urinis bullæ inpatant, nephritim & longam fore invaletudinem significant, aph. 34. sec. 7.

Si quis sanguinem & grumos meiat, & stranguria laboret, dolore ad hypogastrium, & perinæum pertinente, ad vesicam loca laborant, apho. 80. sec. 4.

Urinæ quæ cum rigore restitunt, malum & convulsionem prænunciant, tum verò præcipuè si antea alto sopore æger detentus fuerit, in his autem abscessus ad aures sperare oportet, 25. sec. 2. co.

In tumoribus ad aures urinæ celeriter ac paulo tempore concoctæ damno sunt, & perfrigerari, itidem malum, 205. sect. 2. coac. Idem repetit, 153. lib. 1. sec. 2. prædict. Idem repetit, 587. sec. 2. l. 2. co.

Si quis sanguinem, aut pus meiat, renum aut vesicæ exulceratio significatur, apho. 75. sect. 4.

Urinarum in præcipitibus malis ex perfrictione interceptiones pessimæ, 51. sect. 2. lib. 1. prædict.

Quin & laboriosæ urinæ damnantur, atque ab his detentæ rubræ quædam efflorescentiæ, & æruginosæ, parvæque veluti quædam stillæ apparentes, 59. sec. 2. lib. 2. præd.

Quibus

Quibus manus sunt tremulæ cum capitis & cervicis dolore, levi aliqua surditate affectu nigricantes reddunt urinas, & densas, in his casibus nigrorum progressum expectare, & suspectum habere oportet, 95. sect. 2. l. 1. præd.

Urinæ quæ cum rigore restitunt, damno sunt, idque præsertim, si altus sopor prægressus, animadvertendum est, num in his abcessus ad aures sperare oporteat, 155. sect. 2. libro 1. prædict.

Si quibus urinæ non recordantibus, nec admonitis effluunt, perniciēs portenditur: animadvertendum etiam est, num & ab his tales redduntur, quales sunt, ubi subsidentiam conturbaveris, 19. sect. 2. l. 1. prædict.

Urinam autem copia potui respondentem reddere oportet, & semper æqualem, & quàm maximè effusam, & ad paulo crassius inclinantem, quàm quod potu sumptum est. Quod si diluta fuerit, & copia major quàm quod potui sit assignatum, hominem dicto non audientem significat, sed abundantiore uti potu, aut non posse nutritionem accipere quandiu talis urina reddetur. Si verò paulatim cum stridore urina mittatur, aut medicamenti potione hominem indigere, aut vesicam quodammodo malè affectam denuntiat. At sanguinis mixtus rarus quidem & sine febre ac dolore nihil mali indicat; verum lassitudinum sensus solvitur. Quod si

K

sæpius mictu reddatur, aut horum aliquid accesserit, periculum minatur. At prædicendum est, siue cum dolore, siue cum febre, mictu reddatur, pus insuper per urinam effluxurum, atq; eo pacto dolores tolli: urina verò crassa in qua quod subsidet album est, articulorum dolorem aut tumorem denunciat. Quæ autem sunt reliquæ sedimenta in urinis eorum qui exercentur, ea omnia à morbis sunt qui circa vesicam affligunt; quod manifestum facit dolores qui aderunt, & à quibus vix liberari queant, ex lib. 2. prædict.

Urina optima est in qua per omne tempus quoad morbus iudicatus fuerit, subsidet album, læve & æquale. Securitatē enim brevemque morbum fore significat, quod si intermittat & interdum quidem pura meiatur, interdum etiam subsidet album, & læve, diuturnior, & minus securus morbus evadit. At urina subrubra, simulque quod subsidet, & læve, hæc longè quidem diuturnior quàm prima sit, valde tamen salutaris. Sedimenta autem in urinis crassiora hordei tosti non exactè moliti partes referentia, prava sunt, hisque pejora lammis similia; alba verò, & tenuia valde prava, atque his etiam deteriora suffuracea. Nubeculæ quæ per urinas feruntur, albæ quidem bonæ, nigre verò malæ sunt: quod autem urina fulva fuerit, & tenuis, erudum esse morbum indicat. Quod si diutius talis urina perseveret, periculum

culum est ne non possit æger sufficere quoad urina coquatur. At exitiosiores sunt urinae foetidæ, & aquosæ, & nigrae & crassæ. Ad hæc in viris quidem & mulieribus urine nigrae in pueris aquosæ deterrimæ. Quibus tenues, & crudæ multo tempore redduntur, si reliqua signa salutaria sunt, in his abscessus ad loca infra septum transversum expectari debet. Quin etiam pinguedines supra innatantes araneorum telas referentes, damnare oportet, colliquationem namque significant. In urinis autem quæ nubeculas habent, considerandum venit, an supernæ, an infernæ ferantur, & quomodo habeant colores, & quæ quidem deorsum feruntur, cum dictis coloribus bonæ censendæ, & commendandæ: at quæ feruntur sursum malæ, & vituperandæ. Neque verò tibi imponat vesica quoque modo affecta si huiusmodi urinas reddiderit, non etiam totius corporis, sed ipsius per se indicium est, ex lib. 2. prænot.

Quibus incogitantibus urina decidit, ac pudendum contrahitur, ii desperati sunt, 474. sec. 2. co.

Quibus in urina adipalis superficies est & conferta, iis nephritim & acutum morbum adesse significat, aph. 35. sec. 7.

Urinarum ex perfictione interceptiones, pessimæ, 5. sec. 2. l. 2. co.

Procedente morbo surditas, ac urina subrubra cum nullo sedimento, sed cum sublima-

mentis in medio innatantibus, mentis emotionem prænuntiant. In his morbo regio corripì malum est, quin etiam malo est, ex morbo regio fatuitas. Hos voce defectos absque sensuum læsione præfocari contingit, ac fortassis etiam in his alvus male afficitur, 198. sec. 2. co.

Tenuioris intestini morbus urinæ stillicidio succedens intra 7. diem interimit, nisi suborta febre urina affatim prodierit, 475. sec. 2. l. 2. co.

Urina in febre album & læve depositum habens sedimentum, celerem liberationem denuntiat. Celerem quoque quæ diluta indifferetam quandam habent pinguedinem. Quæ verò aliquantulum rubet, subrubrum habet sedimentum, & læve, siquidem ante 7. diem appareat, 7. die solutionem fieri designat, post septimum autem tardiores aut planè diuturnam. Et quæ quarta die subrubram nubeculam capit, 7. liberat, dum reliqua pro ratione habeant: tenuis autem & biliosa, & ægrè lentum habens sedimentum, & quæ in melius ac deterius commutatur, temporis diuturnitatem postulat. Quòd si istud diutius perseverat, aut ad judicationem temporis longinquitas requiratur, periculo non vacat, 575. l. 2. co.

Diluta verò & alba in diuturnis morbis perseverans difficilem & non securam judicationem facit, 576. sec. 2. co.

In urinis nubeculæ, albæ quidem, & quæ infimum locum tenent, utiles sunt, rubræ verò nigrae, ac livide molestiam exhibent, 577. sec. 2. co.

In præcipitibus morbis periculum denuntiat urina biliosa, neque aliquantulum rubra, & quæ hordei tosti, non exactè moliti crassioribus frustulis similia habet sedimenta alba, & quæ colore, ac sedimento variat, præcipueque in iis quæ ex capite sunt defluxionibus, perniciem etiam præ se fert, quæ ex nigra in biliosam tenuem transit, & quæ sedimentum habet divulsam, quæque ex his quæ densata per urinam feruntur, quod subsidet habet aliquantulum livescens & limosum. Ac fortasse ex his quidem præcordia dextra dolor occupat, aut ex virore pallescent, aut abscessus ad aures cum dolore excitantur, in his paulo post effusa alvus periculum denuntiat, 578.

Urinæ derepente præter rationem parum concoctæ, vitiosæ sunt, ac in totum quæ in morbo acuto urina præter rationem cocta est vitium denotat. In his quoque est prærubra efflorescentia contenta atque æruginosa. Alba verò effusa, & perspicua urina mala est, præcipue in phreniticis apparens, mala quoque quæ post potionem celeriter meitur, præsertimque in lateris doloribus, & pulmonis inflammationibus. Mala etiam quæ ante rigorem oleosa redditur. Mala



quoque & in acutis morbis & quæ ex viridi pallescunt, nec in colore persistunt, 579. sec. 2. co.

Perniciem verò indicat vrina, in qua nigrum est quod subsidet & quæ nigra est. In pueris etiam potius tenuis quam crassa, (in tenuibus autem contrà quàm in commutatis vrinis accidit) & quæ grandinem refert, & genitura similis effunditur, itemque dolorem exhibet. Perniciosa quoque est quæcunque ægro inscio redditur. At in pulmonum inflammationibus periculum indicat, quæ initio concoctionem habet, verum post quartum diem tenuis evadit, 580. sec. 2. co.

In laterum doloribus vrina cruenta, obscura, cum eo quod subsidet vario & indifcreto, vt plurimum in quatuordecim diebus mortem adfert. Laterum quoque dolore affectis in propinquo mortem esse significat. Quæ viridis nigrum habet sedimentum; aut fuscis simile: febre verò ardente cum alto stupore (quem catochon dicunt) detentis, ex albida vrina pessima est, 581. sec. 2. co.

Vrina cruda quæ sic diu perseverat vt reliqua signa salubria sunt, abscessum & dolorem, præcipueque infra septum transversum denuntiat. Doloribus verò ad lumbos oberrantibus, ad coxam idque in febre, & sine febre. At quæ emittitur vrina in qua quod subsidet pinguedinem habet, febrem significat.

significat. Cruenta verò circa initia reddita, morbi diuturnitatem. Returbida quoque, cum sudore morbi reversionem. Aibâ autem qualis in vterino genere redditur, capitis dolorem, membranosa convulsionem. Quæ verò sputo similia habet sedimenta, aut limosa, rigorem denuntiat, quæ araneorum telis similia quædam habet, colliquationem. At in errantibus febribus, nigra nubeculæ quantanæ denuntiant. Decolores autem vrinæ suspensæ quædam in medio nigra habentes, cum pervigilio, & perturbatione phrenitidem, cineritiæ verò cum spirandi difficultate, aquam intercutem, 582. sect. 2. co.

Vrina diluta, aut arenida, & facilè dissolubili asperitate returbata, liquidam fore alvum denuntiat, quæ verò admodum tenuis, spissa evadit, fortasse erupturum sudorem indicat, jam autem erupisse quæ spumam in seipsam insidentem habet, 583. sec. 2. co.

In tertianis, cum horrore nubeculis nigris similia, inconstantem horrorem indicant. Membranosa quoque mictiones, & quæ cum horrore subsidunt, convulsionem prædicant, 584. sec. 2. l. 2. co.

Vrina in qua quod subsidet bonum est, & repente evanescit, dolorem ac mutationem denuntiat. At quæ sedimentum habet returbida residens, rigorem circa indicationem, fortè etiam & in tertianam aut quarta-

nam transitum, 585. sec. 2. l. 2. co.

Laterum dolore affectis vrina/aliquantulum rubra lavem habens subsidentiam, securam judicationem prænuntiat, quæ verò aliquantulum pallida, bene florulenta est, & albam habet subsidentiam, celerem quoque. At quæ admodum rubra, & bene florulenta sedimentum pallidum, læve ac purum habet, diurnum, valdeque turbulentum morbum fore, & in alium transitum, non tamen perniciosum. Alba verò diluta hordei tosti non exacte moliti crassioribus frustulis simile habens sedimentum fulvum, dolorem & periculum denuntiat. At quæ pallida fulvum habet sedimentum hordei tosti non exacte moliti crassioribus frustulis simile, diurnitatem ac periculum indicat, 586. sec. 2. co.

Febricitanti vrina densitatem habens, divulsam morbi reversionem aut sudorem portendit, 593. sec. 2. co.

In febribus longis, parvis, vagis, tenuium vrinarum ejectiones, lienis affectionem denuntiant, 594. sec. 2. co.

In febre variarum interdum vrinarum mictiones, morbum producant, 595. sect. 2. coac.

Vrinæ quæ non sentientibus effluunt aliàs perniciem denuntiant. Animadvertendum tales his reddantur quales sunt vbi subsidentiam conturbaveris, 596. sec. 2. co.

Qui-

Quibus vrinæ paucæ, grumosæ, non sine febre, si ab iis tenues & copiosæ prodierint, juvat, talibus autem circa initia procedunt, aut non multo post sedimentum habent, 597. sec. 2. co.

Quibus in vrinis citò aliquid subsidet hi brevi judicantur, 598. sec. 2. co.

Vrinæ præter consuetudinem tenues, & crudæ, absque repletionem in morbo comitiali obnoxiiis, morbi insultum denuntiant, idque præcipue si in summum humerum, aut cervicem, aut dorsum dolor, aut convulsio incidat, aut torpor totum corpus occupet, aut turbulentum insomnium visum fuerit, 599. sec. 2. co.

Quæ parva copia apparent, velut stillæ sanguinis vrinæ vomitiones & dejectiones, malum quidem penitus denuntiant, pessimum verò si exiguis intervallis sese consequantur, 600. sec. 2. l. 2. co.

Vrina intercepta, & ad imum ventrem pondus, vt plurimum futurum vrinæ stillidium denuntiat, si minus, alvum aliquem morbum ex consuetudine affigentem, 591. sec. 2. co.

Vide abscessum, convulsionem, dolorem, surditatem, alvi excrementa, hydropem.

## VESICA.

Vesica intercepta maxime quæ cum capitis dolore convulsionem quandam minatur,



quæ in his cum torporis sensu exolvuntur, molestiam, non perniciem afferunt, ac fortè aliquantulum desipiunt, §28. sec. 2. co.

Vesica, & graviter dolens omnino quidem mala est, pessima verò si febris continua accesserit (vesicæ namque dolores interrimendi vim obrinent) & alvus his nihil admodum reddit, hos autem metu liberat yri-na purulenta procedens, in qua album & læve subsidet: Quod si neque hæc lavata fuerint, neque vesica mollior reddatur, intra primos circuitus laborantem moriturum expectandum est. Hoc verò pueris à 7. anno ad 15. præcipuè contingere solet, 471. sect. 2. coac.

Vesica intercepta cum capitis dolore convulsionem minatur, quæ in his cum torporis sensu exolvuntur, molestiam exhibent, non tamen perniciem adferunt, videndumque est, num tale quid etiam mentem excutit, 220. l. 2. prædict.

Vide sectionem.

#### VISVS.

Vide dolorem.

#### VITILIGINES.

Vide impetigines.

#### VITA.

Vide crism.

VTE.

#### VTERVS.

Quibus vteri os durum est, iis ardetur necesse est, aphor. §4. sec. 5.

Vterinæ ventris duritates cum dolore celerem perniciem denuntiant, §28. sect. 2. coac.

Vide dolores vteri.

#### FINIS.





